

COLLECTION MALACOLOGIQUE

T. LETOURNEUX

CATALOGUE

COLLECTION MALACOLOGIQUE
T. LETOURNEUX

OFFERTE

au Musée d'Histoire Naturelle de la ville d'Angers

PAR

M. LE COMMANDANT E. LETOURNEUX

CATALOGUE

PAR MM.

O. COUFFON

Préparateur à la Faculté des Sciences
de Paris
Secrétaire de *Palaeontologia universalis*
Membre de la Commission
du Musée d'Histoire naturelle d'Angers

(Coquilles marines)

TH. SURRAULT

Professeur à l'École Normale d'Instituteurs
Vice-président
de la Société d'Études Scientifiques
Membre de la Commission
du Musée d'Histoire naturelle d'Angers

(Coquilles terrestres et fluviatiles)

*Ouvrage honoré d'une subvention
de M. le Ministre de l'Instruction publique*




ANGERS

GERMAIN ET G. GRASSIN, IMPRIMEURS-ÉDITEURS

G. GRASSIN, SUCCESSEUR

40, rue du Cornet et rue Saint-Laud

1909



LE PRÉSIDENT T. LETOURNEUX

Né à Rennes (Ille & Vilaine) le 9 Juillet 1804

Tacite et Aristide Letourneux

NOTES BIOGRAPHIQUES

La collection malacologique offerte au Musée d'Angers est due à la collaboration des deux naturalistes Letourneux, l'oncle et le neveu. La notice qui suit fera ressortir la part qui revient à chacun d'eux dans la formation de cette collection.

Tacite Letourneux, né à Rennes en 1804 (1), fut d'abord élève du collège de Nantes, puis de celui de Rennes ; c'est dans cette dernière ville qu'il fit ses études de droit et fut reçu licencié. Dès sa jeunesse, il manifesta le goût le plus vif pour l'histoire naturelle et la botanique l'attira tout d'abord. Lorsque, par suite de son mariage, il vint se fixer à Nantes, il y apporta le modeste herbier, résultat de ses premières recherches, et ne tarda pas à entrer en relations avec les botanistes nantais de cette époque : Hectot, l'abbé Delalande et surtout James Lloyd. Ce fut l'origine de cette longue et constante amitié qui l'unit au savant botaniste anglais, dont il fut le zélé et dévoué collaborateur, ainsi que se plaît à le reconnaître l'auteur de la *Flore de la Loire-Inférieure*, dans la dédicace de sa première édition.

Après s'être occupé quelque temps d'entomologie, il dut y renoncer, en raison de la fatigue que lui causaient les études microscopiques. Ce fut alors que, concurremment avec la botanique, il entreprit l'étude de la malacologie et en réunit les pre-

(1) Tacite Letourneux était fils de François-Sébastien Letourneux qui fut successivement, pendant la Révolution, procureur général syndic du département de la Loire-Inférieure, commissaire du pouvoir exécutif du même département puis, en 1797, ministre de l'Intérieur, membre du Conseil des Anciens. Il mourut conseiller à la Cour de Rennes. Par sa mère, il était le petit-fils d'Etienne Chaillon, membre de la Constituante, de la Convention et du Conseil des Anciens.

miers spécimens. En 1843, nommé juge de paix du canton de Lusignan, dans la Vienne, il parcourut avec ardeur ce nouveau champ d'exploration qui lui fournit de nombreuses acquisitions pour les deux collections que, dès lors, il ne cessa de mener de front.

En 1848, il fut appelé à Fontenay-le-Comte comme juge au Tribunal civil, dont il devint président quelques années plus tard. Dans sa nouvelle résidence, Tacite Letourneux continua ses études et ses travaux dans les deux branches d'histoire naturelle auxquelles il s'était consacré, et ses collections prirent un développement important, par suite de ses propres recherches et d'échanges avec de nombreux correspondants de tous les pays, et surtout en raison des envois que lui adressait de ses résidences lointaines et au cours de ses voyages, son neveu, Aristide Letourneux, dont nous retracerons ci-après la carrière scientifique.

Membre de la Société botanique, de la Société malacologique de France et de la Société pour l'avancement des sciences, il publia, pendant son séjour à Fontenay, un *Catalogue des mollusques terrestres et fluviatiles du département de la Vendée et particulièrement de l'arrondissement de Fontenay-le-Comte*, opuscule très apprécié pour sa rigoureuse exactitude.

C'est à Nantes qu'il prit sa retraite, en 1874. Toujours dévoué à ses deux sciences de prédilection, il continua, dans la mesure que lui permettait le déclin de sa santé, à s'occuper de ses collections et à en parfaire la classification, entretenant jusqu'à la fin une correspondance active avec de nombreux spécialistes. Il mourut à Nantes le 8 mars 1880.

Aristide-Horace Letourneux, neveu de Tacite, naquit le 21 février 1820, à Rennes, où son père était avocat général. Après de brillantes études, il entra dans la magistrature, dont il parcourut les divers échelons ; nommé procureur à Bône en 1851, il était conseiller à la Cour d'appel d'Alger lorsqu'il fut désigné, en 1876, pour représenter la France à la Cour internationale d'Alexandrie (Égypte), dont il devint vice-président par le suffrage de ses collègues ; sa connaissance de l'arabe et de ses dialectes l'avait signalé pour cette haute situation, qu'il occupa jusqu'en 1881, époque à laquelle il fut nommé conseiller honoraire à Alger. Doué de facultés éminentes, il s'était fait connaître par des travaux de linguistique, qui l'avaient mis en relation avec les plus grands savants d'Europe. Il s'était initié à toutes les langues sémitiques, ainsi qu'au

sanscrit, au déchiffrement des hiéroglyphes et des inscriptions lybico-berbères ; il a produit, dans diverses revues spéciales, des études fort remarquées. Enfin, un ouvrage considérable, en collaboration avec le général Hanoteau : *La Kabylie et les coutumes kabyles* (1), devenu classique en Algérie et qui a nécessité une deuxième édition, lui créa une notoriété consacrée après sa mort par une décision du gouverneur général, donnant son nom à un nouveau centre administratif dans la province d'Alger, près de Teniet-el-Haad.

Malgré les succès obtenus dans ces sciences ardues, la passion dominante d'Aristide Letourneux fut l'histoire naturelle, dont il avait pris le goût avec son oncle. Pour apprécier la valeur et l'importance de ses travaux, nous ne saurions mieux faire que de reproduire le jugement qu'a porté sur lui, en 1886, un savant dont le nom fait autorité dans la malacologie, M. Bourguignat (2) :

« Aristide Letourneux est le membre de la Société qui a le
« plus contribué aux progrès de la science malacologique par ses
« voyages, ses explorations et ses recherches toujours fruc-
« tueuses ; ses découvertes sont incalculables ; c'est incontestable-
« ment un des plus habiles chercheurs du monde entier ; il
« connaît la France entière ; il a parcouru l'Espagne, la Suisse,
« l'Italie, la Bavière, une partie de l'Autriche, de la Hongrie et
« de la Grèce. Pendant trois années consécutives, il a exploré les
« îles Ioniennes et la plupart de celles de l'Archipel, la Dalmatie,
« l'Istrie, la Carniole, les rives du Bosphore, la Syrie, la Pales-
« tine et la vallée du Haut-Nil jusqu'à la deuxième cataracte.
« Mais là où Aristide Letourneux a vraiment voyagé, c'est dans
« le nord de l'Afrique, de Tripoli au Maroc... Le conseiller
« Letourneux est, sans contredit, l'Européen qui connaît le
« mieux l'Algérie et la Tunisie. »

Il a fourni sur ses voyages d'innombrables notes, parmi lesquelles nous citerons, au point de vue purement malacologique : *Excursion malacologique en Kabylie et dans le Tell oriental*, 1870, une brochure in-8° ; *Malacologie terrestre et fluviale de la Kabylie*, 22 pages in-8° ; *Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis en juillet et août 1875 aux environs de Lamalou-les-Bains (Hérault)*, 1877, une brochure in-8° ; *Excursion malacologique dans l'île de Santorin*, 1884, une brochure in-8° ; *Prodrome de la*

(1) Paris, imp. Nat^{le}, 3 vol. in-8°, 1872-73.

(2) *Revue biographique de la Société malacologique de France*, année 1886.

Malacologie terrestre et fluviatile de la Tunisie, 1885, un volume in-8° ; *Étude sur la faune malacologique de la Dalmatie, de la Croatie et des contrées circumvoisines*, 1885-1886, une brochure in-8°. Enfin, après sa retraite, prise en 1881, à Alger, il fit partie de la mission scientifique chargée d'explorer la Tunisie et parcourut la Régence dans tous les sens de 1883 à 1885. Là aussi, ses découvertes furent importantes et, bien que la botanique fût le but officiel de la mission, la malacologie n'y fut point négligée (1).

Savant, on peut dire universel, poète même à ses heures, Aristide Letourneux a fait partie de nombreuses Sociétés savantes : la Société malacologique de France, dont il était l'un des fondateurs, la Société botanique de France, toutes les Sociétés scientifiques d'Algérie, l'Institut d'Égypte l'ont compté parmi leurs membres. Il était, en outre, officier de la Légion d'honneur, officier de l'Instruction publique, chevalier de l'ordre du Sauveur de Grèce et commandeur de l'Osmanie.

Dans son existence mouvementée, A. Letourneux a consacré plus de temps à recueillir qu'à classer le produit de ses recherches, mais il en a fait profiter la collection à laquelle la ville d'Angers a bien voulu accorder une place d'honneur dans son Muséum et que fait heureusement valoir l'installation si bien comprise due au zèle éclairé de M. Bouvet, conservateur du Muséum et de ses dévoués collaborateurs, MM. Couffon et Surrault.

Émile LETOURNEUX,
Chef de Bataillon en retraite.

(1) A. Letourneux, *Voyage botanique en Tunisie, dans le sud de Nefzaoua*. *Bulletin de la Société botanique de France* vol. XXXIII, p. 541.



LE CONSEILLER A. H. LETOURNEUX

Né à Rennes (Ille & Vilaine) le 21 Février 1820.

INTRODUCTION

Dans les premiers jours de mai 1906, M. Bouvet, directeur du Musée d'Histoire Naturelle d'Angers, était informé par M. Letourneux, chef de bataillon en retraite, 10, avenue de l'Épéronnière à Nantes, exécuteur testamentaire de J. Lloyd, de son intention de donner à la ville d'Angers la belle collection de coquilles marines, fluviatiles et terrestres formée par son père, M. Tacite Letourneux, avec le concours de son cousin M. Aristide Letourneux, président de Chambre à Alger, puis à Alexandrie. La seule condition imposée par le donateur était l'exposition aux yeux du public de la collection de son père. La Municipalité pressentie s'engageait d'ailleurs à faire son possible pour donner satisfaction au donataire. Après de nombreuses démarches tant du Directeur que de la Commission du Musée et de la Société d'Études Scientifiques d'Angers, la question du local n'avait pas encore reçu de solution au milieu de septembre 1907. A cette date, la Commission du Musée décidée, avant tout, à ne pas perdre le bénéfice de la générosité de M. Letourneux, prit la résolution de débarrasser de tout ce qu'elle contenait, la salle de malacologie du Logis Barrault et de l'affecter à la collection Letourneux. Le 26 septembre, la collection de minéralogie locale était portée au Musée de Paléontologie et la jolie collection de coquilles formée en grande partie par les soins de Béraud était, à regret, enfermée dans des tiroirs.

Le 27 septembre, l'un de nous se rendit à Nantes, fit part du projet de la Commission à M. Letourneux qui l'approuva et, immédiatement, fut commencé l'emballage de la collection dans les meubles même qui la contenaient; deux jours d'un travail assidu et minutieux suffirent à grand peine à cet ouvrage. Le 27 octobre suivant, la collection de coquilles marines était nettoyée, étiquetée et mise en tubes et en cuvettes. Les étiquettes de M. Letourneux qui comportaient d'intéressantes indications relatives au nom de l'envoyeur, à la synonymie, à l'ouvrage et à la

planche qui avaient servi à la détermination avaient été conservées avec le plus grand soin (1). Par suite du manque de place et des remaniements nécessités dans les anciennes collections du musée, la collection de coquilles terrestres et fluviatiles ne put être exposée aux yeux du public que dans le courant de mars 1908. Cependant, le catalogue des différentes parties était dressé et, à la suite d'une demande de subvention faite collectivement par MM. Bouvet, directeur du Musée d'Histoire Naturelle, et Préaubert, président de la Société d'Études Scientifiques d'Angers, favorisée d'un rapport élogieux de M. le Dr Louis Joubin, professeur au Muséum National, M. le Ministre de l'Instruction publique voulait bien honorer d'une subvention la publication de ce catalogue.

Le catalogue de la collection malacologique T. Letourneux comprend 2.278 espèces réparties comme suit : coquilles marines, 1.620 espèces ; coquilles d'eau saumâtre et d'eau douce, 297 espèces ; coquilles terrestres, 361 espèces. Chaque nom d'espèce est suivi, autant que possible, de la synonymie, de la provenance, du nom du donateur et, pour un grand nombre, de l'ouvrage qui a servi à la détermination. Parmi les donateurs, un grand nombre sont connus dans la science, et nous relevons les suivants :

BÉRILLON.
H. BLANC.
BOURGUIGNAT.
BRONDEL.
CAILLIAUD.
A. CLEMENSON.
COINDE.
DE L'HOTELLERIE.
DUCHÉ.
DUMONT.
DUPUY.
EUEDEL.
FAGOT.
GASSIES.
GUERBETTE.
M^{me} HERMITE.
JOBA.

JOLY.
LECOMTE.
LEPELTIER.
LESOURD.
A. LETOURNEUX.
E. LETOURNEUX.
T. LETOURNEUX.
MARÈS.
MENKE.
MÖRCH.
MOUSSON.
D'ORBIGNY père.
PALADILHE.
PETIT DE LA SAUSSAYE.
STABILE.
VESCO.
WEENKAUFF.

(1) V. *Bull. Soc. Ét. Sc. d'Angers*, XXXVII^e, pp. xxxv-xxxvi.

Tandis que Aristide Letourneux faisait parvenir à son oncle de remarquables spécimens de Suez et rivalisait avec Joly pour lui fournir la faune de la Baie d'Alger, Joba lui envoyait de Marseille, M^{me} Hermite de Saint-Thomas et des Iles Marquises, Lesourd de l'Ile Maurice, Coinde de la Sicile, Mörch du Groënland et surtout Eudel de la Réunion de magnifiques séries.

Mais parmi tant d'espèces, le groupe le plus intéressant, au point de vue scientifique, est, malgré son petit nombre, celui des mollusques terrestres et fluviatiles qui, comme nous l'avons vu plus haut, comprend 658 espèces.

Les espèces terrestres sont au nombre de 361, dont 246 pour le seul genre *Helix* ; la collection renferme 297 espèces d'eau douce et d'eau saumâtre, parmi lesquelles 53 *Neritina*, 82 *Unio*, 24 *Anodonta* ; les genres *Limnæa* et *Planorbis* ne sont presque pas représentés.

Cette partie de l'intéressante collection de M. T. Letourneux contient des échantillons de toutes les parties du monde qui lui ont été procurés par une trentaine de donateurs dont les noms sont bien connus dans les annales de la malacologie.

110 espèces proviennent de la France recueillies par M. T. Letourneux lui-même (42) surtout à Fontenay-le-Comte et à Nantes ou donnés par Dupuy, Paladilhe, Stabile, Gassies, Bérillon et Dumont (Savoie et Dauphiné).

M. Aristide Letourneux a été, pour son oncle, un collaborateur des plus précieux qui a profité de son séjour à Alger et à Alexandrie pour recueillir une belle série de 112 espèces du Nord de l'Afrique et de ses voyages à Corfou et sur les côtes septentrionales de l'Adriatique pour récolter environ 40 espèces, surtout des *Helix* dont il a décrit plusieurs.

Sur les 37 espèces en provenance de l'Italie, 20 portent le nom de H. Blanc ; les étiquettes des espèces d'Asie-Mineure, de Syrie, d'Espagne sont signées Bourguignat, Mousson, M^{me} Hermite ; Fagot et surtout Dupuy ont apporté les 60 coquilles de l'Amérique du Nord (principalement des *Unio*), tandis que Duché introduisait 50 espèces des Philippines (série de 18 *cochlostyla* sur les 23 de la collection) et que Mousson, Duché, Joba, Eudel, M^{me} Hermite, Cailliaud, Lesourd envoyaient une centaine d'espèces de Cuba, Java, Porto-Rico, les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, le Brésil, le Chili, le Pérou, La Réunion, les côtes de l'Afrique Occidentale, etc.

19 espèces terrestres, dont 14 *Helix* et 20 espèces fluviatiles,

dont 9 *Unio*, proviennent des auteurs qui les ont décrites (Bourguignat, 11 ; A. Letourneux, 11 ; Dupuy, 6 ; Mousson, 4 ; Cailliaud, 2 ; Gassies, 2 ; Bérillon, 2 ; Blanc, 1) et 1 espèce terrestre et 8 espèces d'eau douce ont été fournies à M. T. Letourneux par les personnes à qui elles ont été dédiées (A. Letourneux, espèces de Bourguignat, 5 ; Marès, espèce de Bourguignat, 1 ; Gassies, espèce de Dupuy, 1 ; Dupuy, espèce de Normand, 1 ; Cailliaud, espèce de Férussac, 1).

Ce sont donc 48 espèces que l'on peut considérer comme des types qui donnent d'autant plus de valeur à la collection et dont voici la liste :

Espèces données par les auteurs :

Ampullaria scutata MOUSSON. Java.

Ampullaria pyramidalis A. LETOURNEUX. Zanzibar.

Ampullaria pyramidalis var. minor. Zanzibar.

Nanina Wandersiana, MOUSSON. Java.

Hyalinia zonitomæa A. LETOURNEUX. Thabourt, Algérie

Helix Nicaisiana A. LETOURNEUX. Kabylie.

Helix morronica H. BLANC. Monte Corno, Italie.

Helix aurasica A. LETOURNEUX. Algérie.

Helix cattaroensis A. LETOURNEUX. Cattaro, Dalmatie.

Helix subsetigera A. LETOURNEUX. Raguse, Dalmatie.

Helix adriatica A. LETOURNEUX. Sorgenti du Jadro, près Salona, Dalmatie.

Helix istriana BOURGUIGNAT. Carniole.

Helix catodonta BOURGUIGNAT. Prov. d'Oran.

Helix Darolli A. LETOURNEUX. Djar, Algérie.

Helix picenica BOURGUIGNAT. Vrlika, Dalmatie.

Helix pachya BOURGUIGNAT. Nazareth.

Helix cyrtolena BOURGUIGNAT. Épire.

Helix exochotera A. LETOURNEUX. Cattaro, Dalmatie.

Helix Pascalia CAILLIAUD. Brésil.

Melania rustica MOUSSON. Java.

Neritina bahusiensis DUPUY. Le Bahus, Landes.

Neritina corcyrensis A. LETOURNEUX. Corfou.

Neritina squamospina MOUSSON. Sumatra.

Pisidium Jaudouinianum GASSIES. Agen.

Unio bayonnensis De FOLIN et BÉRILLON. Lac de la Négresse à Biarritz.

Unio Baudonianus. DE FOLIN et BÉRILLON. Lac de Garos à Ondres (Basses-Pyrénées).

Unio Moquinianus DUPUY, Var... Gers.

Unio Jacquemini DUPUY. Arles.

Unio Astierianus DUPUY. Arles.

Unio subreniformis BOURGUIGNAT. Étang de Bagnolas, Catalogne (Espagne).

Unio MacCarthyanus BOURGUIGNAT. Algérie.

Unio Penchinatianus BOURGUIGNAT. Étang de Bagnolas, Catalogne (Espagne).

Unio Rothi BOURGUIGNAT. Lac de Tibériade.

Unio niloticus. CAILLIAUD. Égypte.

Margaritana Michonii. BOURGUIGNAT. Lac de Tibériade.

Anodonta Grateloupiana GASSIES. Agenais.

Anodonta Rossmassleriana DUPUY. Le Gers.

Anodonta subponderosa DUPUY. Monferran (Gers).

Anodonta melinia BOURGUIGNAT. Étang d'Albufera, près Valence (Espagne).

Espèces données par les personnes à qui elles ont été dédiées :

Oleacina Letourneuxi BOURGUIGNAT. Cattaro, Dalmatie (A. LETOURNEUX).

Melanopsis Maresi BOURGUIGNAT, Algérie (MARÈS).

Sphærium Letourneuxi BOURGUIGNAT, Giurgivo Valachie (A. LETOURNEUX).

Pisidium Gassiesianum DUPUY, Bordeaux (GASSIES).

— *Dupuyanum* NORMAND, Valenciennes (DUPUY).

Unio Letourneuxi BOURGUIGNAT, Algérie (A. LETOURNEUX).

Anodonta Letourneuxi BOURGUIGNAT, Algérie (A. LETOURNEUX).

Mutela Letourneuxi BOURGUIGNAT, Égypte (A. LETOURNEUX).

Ætheria Cailliaudi FÉRUSAC, Haut-Nil (CAILLIAUD).

La collection Letourneux mérite d'être étudiée par les malacologues, et c'est pour les inciter à venir y jeter un coup d'œil que nous publions aujourd'hui ce catalogue.

PRINCIPALES ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES

pour les noms d'Auteurs

<i>Alb.</i>	Albers.	<i>Desm.</i>	{ Desmoulins.
<i>Agass.</i>	Agassiz.	<i>Desml.</i>	
<i>Ang.</i>	Angas.	<i>Dillw.</i>	{ Dillwyn.
<i>Arad. et Ben.</i>	Aradas et Benoit.	<i>Dll.</i>	
<i>Ascan.</i>	Ascanius.	<i>Dkr.</i>	Dunker.
<i>Auct.</i>	Auctorum.	<i>Dlle</i>	Delle Chiaje.
<i>A. Ad.</i>	A. Adams.	<i>Doll.</i>	Dollfus.
<i>Adans.</i>	Adanson.	<i>Donov.</i>	Donovan.
<i>Ad. et Rv.</i>	Adams et Reeve.	<i>Ducl.</i>	Duclos.
<i>Barc.</i>	Barclay.	<i>Dum.</i>	Duméril.
<i>Bast.</i>	Basterot.	<i>Ehbg</i>	{ Ehrenberg.
<i>Bens.</i>	Benson.	<i>Ehrbg</i>	
<i>Biv.</i>	Bivona.	<i>Enc.</i>	Encyclopédie.
<i>Bk.</i>	Beck.	<i>Eschh.</i>	Eschscholtz.
<i>Blvll.</i>	{ Blainville.	<i>Eyd. et Souleyet</i>	Eydoux et Souleyet.
<i>Bl.</i>		<i>Fabr.</i>	Fabricius.
<i>Bon.</i>	Bonelli.	<i>Fér.</i>	Férussac.
<i>Bolt.</i>	Bolten.	<i>Fl. de B.</i>	Fleury de Bellevue
<i>Brocc.</i>	{ Brocchi.	<i>Flmg</i>	Fleming.
<i>Broch.</i>		<i>Forb.</i>	Forbes.
<i>Brod.</i>	Broderip.	<i>Fschr.</i>	Fischer de Waldheim
<i>Brug.</i>	Bruguière.	<i>Gistl.</i>	Gistel.
<i>Brus.</i>	{ Brusina.	<i>Gld.</i>	Gould.
<i>Brusin.</i>		<i>Gldg.</i>	Guilding.
<i>Brwn.</i>	Brown.	<i>Gmel.</i>	Gmelin.
<i>Bucq.</i>	Bucquoy.	<i>Grat.</i>	Grateloup.
<i>Calc.</i>	Calcara.	<i>Gregor.</i>	Gregori.
<i>Cantr.</i>	Cantraine.	<i>Grffth.</i>	Griffith.
<i>Ch.</i>	Chenu.	<i>Gualt.</i>	Gualtieri
<i>Chem.</i>	Chemnitz.	<i>Guid.</i>	Guilding.
<i>Conr.</i>	Conrad.	<i>Hanl.</i>	Hanley.
<i>Cost.</i>	Costa.	<i>Herms.</i>	Herrmannsen.
<i>Couth.</i>	Couthouy.	<i>Hlbling.</i>	Helbling.
<i>Crist. et Jan</i>	Cristofori et Jan.	<i>Holl.</i>	Hollandre.
<i>Crptr.</i>	Carpenter.	<i>Humph.</i>	Humphrey.
<i>Cuv.</i>	Cuvier.	<i>Hutt.</i>	Hutton.
<i>Daud.</i>	Daudin.	<i>Jeffr.</i>	Jeffreys.
<i>Davids.</i>	Davidson.	<i>Kob.</i>	Kobelt.
<i>Defr.</i>	Defrance.	<i>Krss.</i>	Krauss.
<i>Desh.</i>	Deshayes.	<i>Kryn.</i>	Krynicky.

<i>L.</i>	Linné.	<i>Rclz</i>	Recluz.
<i>Lask.</i>	Laskey.	<i>Ren.</i>	Renieri.
<i>Latrll.</i>	Latreille.	<i>Req.</i>	Requiem.
<i>Lea.</i>	Leach.	<i>Retz.</i>	Retzius.
<i>Less.</i>	Lesson.	<i>Reyn.</i>	Reynies..
<i>Link.</i>	Linek.	<i>Rfq.</i>	Rafinesque.
<i>Lmck.</i>	Lamarck.	<i>Riss.</i>	Risso.
<i>Lwd.</i>	Llhwyd.	<i>Röm.</i>	Römer.
<i>Macgill.</i>	Macgilliorag.	<i>Rond.</i>	Rondelet.
<i>Mart.</i>	Martini.	<i>Rüpp.</i>	Rüppell.
<i>Mat.</i>	Maton.	<i>Scacc.</i>	{ Scacchi.
<i>Mft.</i>	Montfort.	<i>Scach.</i>	
<i>Mhlfld.</i>	{ Megerle von Mühl-	<i>Schinz.</i>	Schiemenz.
<i>Muhlf.</i>		<i>Schm.</i>	{ Schumacher.
<i>Mich.</i>	Michaud.	<i>Schmch.</i>	
<i>Middf.</i>	Middendorff.	<i>Schmidt</i>	Schmidt.
<i>Mitr.</i>	Mittre.	<i>Schröl.</i>	Schröter.
<i>Mke</i>	Menke.	<i>Schwlg.</i>	Schweigger.
<i>Moll.</i>	Mollendorff.	<i>Scop.</i>	Scopoli.
<i>Montag.</i>	{ Montag.	<i>Sell.</i>	Sellius.
<i>Mont.</i>		<i>Sequenz.</i>	Sequenza.
<i>Monsters.</i>	{ Monterosato.	<i>Sh.</i>	Shuttleworth.
<i>Monteros.</i>		<i>Sism.</i>	{ Sismonda.
<i>Mrts.</i>	Monterosato.	<i>Sismond.</i>	
<i>Mtg.</i>	Montagu.	<i>Smth.</i>	E. Smith.
<i>Müll.</i>	Müller.	<i>Sol.</i>	{ Solander.
<i>Oliv.</i>	Olivi.	<i>Soland.</i>	
<i>Orb. (d')</i>	d'Orbigny.	<i>Souvr.</i>	Souverbie.
<i>Pall.</i>	Pallas.	<i>Sow.</i>	Sowerby.
<i>Payr.</i>	Payreaudeau.	<i>Spglr.</i>	Spengler.
<i>Penn.</i>	Pennant.	<i>Tapp.</i>	Tapparone Canefri.
<i>Per.</i>	Péron.	<i>Thomps.</i>	Thompson.
<i>Pet.</i>	Petit.	<i>Toll.</i>	Torell.
<i>Pfr.</i>	Pfeiffer.	<i>Tournf.</i>	Tournefort.
<i>Phl.</i>	{ Philippi.	<i>Turt.</i>	Turton.
<i>Phlp.</i>		<i>Vaill.</i>	Vaillant.
<i>Phlpps.</i>	Phillips.	<i>Val.</i>	Valenciennes.
<i>Pot. et Mich.</i>	Potiez et Michaud.	<i>Wagn.</i>	Wagner.
<i>Ps.</i>	Pease.	<i>Weink</i>	{ Weinkauf.
<i>Pult.</i>	Pulteney.	<i>Wkf.</i>	
<i>Qtrig.</i>	de Quatrefages.	<i>Wood.</i>	Woodward.
<i>Quoy et G.</i>	Quoy et Gaimard.	<i>Zborz.</i>	Zborzewsky.

16 pp. h. précède.
PREMIÈRE PARTIE

MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES

I

COQUILLES TERRESTRES

Embranchement des Mollusques

CLASSE DES GASTROPODES

Ordre des Pulmonés

FAMILLE DES TESTACELLIDÆ

Genre **Oleacina** Bolten.

[Syn. *Polyphemus* Mft.; *Cochlicopa* Fér.; *Cochlycopa* Sw.
Pfaffia Behn.]

SECTIONS

- | | |
|---|----------------------------------|
| (1) <i>Varicella</i> Pfr. | (3) <i>Boltenia</i> Pfr. |
| (2) <i>Turritæ</i> Cless.
Syn. <i>Melia</i> Alb. | (4) <i>Glandina</i> H. et A. Ad. |
| | (5) <i>Salasiella</i> Streb. |
| (4) <i>Oleacina Delesserti</i> Bourguignat. Corfou (A. LETOUR-
NEUX).
[Syn. <i>Glandina Delesserti</i> , Brgt.] | |

- (4) *Oleacina dilatata* Beck. [Bourg. Moll. Alg., II, p. 117-118, pl. VIII, fig. 1-3.] Corfou (A. LETOURNEUX).
- (4) *Oleacina Poireti* Férussac. Cattaro (A. LETOURNEUX).
[Syn. *O. algira* Brug. var. *Poireti* Fér.]
- (4) *Oleacina Letourneuxi* Bourguignat. Cattaro (A. LETOURNEUX).
- Oleacina Forskali* Ehrenberg.

FAMILLE DES STREPTAXIDÆ

Genre **Streptaxis** Gray.

[Syn. *Artemon* Bk.]

SECTIONS

- | | |
|---|------------------------------|
| (1) <i>Artemon</i> Bk. | (4) <i>Eustreptaxis</i> Pfr. |
| Syn. <i>Epistylia</i> Pfr. | (5) <i>Odontartemon</i> Pfr. |
| (2) <i>Scolodonta</i> Döring. | (6) <i>Discartemon</i> Pfr. |
| (3) <i>Ammonoceras</i> Pfr. | |
| (4) <i>Streptaxis Maugeriæ</i> Gray. Sierra Leone (EUDEL). | |
| (5) <i>Streptaxis leonensis</i> Pfeiffer. Sierra Leone (EUDEL). | |
| (6) <i>Streptaxis contusus</i> Férussac. Brésil (DUCHÉ).
[Syn. <i>Helix contusus</i> Fér.] | |

FAMILLE DES ENNÆIDÆ

Genre **Ennea** H. et A. Adams.

SECTIONS

- | | |
|--|-------------------------------|
| (1) <i>Edentulina</i> Pfr. | (5) <i>Enneastrum</i> Pfr. |
| (2) <i>Elma</i> H. Ad. | (6) <i>Gulella</i> Pfr. |
| (3) <i>Passamaëlla</i> Pfr. | (7) <i>Ptychotrema</i> Mörch. |
| (4) <i>Uniplicaria</i> Pfr. | |
| (1) <i>Ennea ovoidea</i> Bruguière. Madagascar (Ex. Pfeiffer).
[Syn. <i>Bulimus ovoideus</i> Brug.] | |

FAMILLE DES VITRINÆ

Genre **Nanina** Gray.

SECTIONS

- | | |
|--|--|
| (1) Medyla Alb.
Syn <i>Vitrinella</i> Gray.
— <i>Otesia</i> H. et A. Ad. | (9) Euplecta Semp. |
| (2) Paryphanta Alb. | (10) Thalassia Alb. |
| (3) Microcystis Bk.
Syn. <i>Helicopsis</i> Bk. | (11) Sophina Bens. |
| (4) Xesta Alb. | (12) Hemiplecta Alb.
Syn. <i>Rhysota</i> Pfr. |
| (5) Bensonia Pfr. | (13) Rhyssota Alb.
Syn. <i>Rhyssota</i> Pfr. |
| (6) Macrochlamys Bens.
Syn. <i>Tachychlamys</i> Bens.
— <i>Orobia</i> Alb. | (14) Pachystyla Mörch. |
| (6 ^a) Durgella Blfd. | (15) Oxytes Pfr. |
| (7) Eurypus Semp. | (16) Ariophanta Desm. |
| (8) Rotularia Mörch. | (17) Thapsia Alb. |
| | (18) Orpiella Gray. |
- (4) *Nanina citrina* Linné. Les Philippines (MOUSSON).
[Syn. *Helix citrina* Lin.]
- (12) *Nanina semirugata* Beck. Pondichéry (JOBA).
[Syn. *Helix semirugata* Bk.]
- (12) *Nanina Waandersiana* Mousson. Java (MOUSSON).
[Syn. *Helix waandersiana* Mss.]
- (12) *Nanina Crossei* Pfeiffer. Saïgon (VESCO).
[Syn. *Helix Crossei* Pfr.]
- (12) *Nanina semigranosa* Sowerby. Les Philippines (JOBA).
[Syn. *Helix semigranosa* Sow.]
- (12) *Nanina bistrialis* Beck. Pondichéry.
[Syn. *Helix bistrialis* Bk.]
- (12) *Nanina Humphreysiana* Lea. Sumatra (DUCHÉ).
- (12) *Nanina Weinkauffiana* Crosse. Cochinchine (LESOURD).
[Syn. *Helix weinkauffiana* Crosse.]
- (13) *Nanina distincta* Pfeiffer. Saïgon (VESCO).
[Syn. *Helix distincta* Pfr.]
- (14) *Nanina inversicolor* Férussac. Algérie (M^{me} HERMITE).
[Syn. *Helix inversicolor* Fér.]

Genre **Zonites** Montfort.

[Syn. *Tragomma* Hldm.; *Helicoides* Dum.; *Verticillus* Moq.-Td.]

SECTIONS

- | | |
|---|----------------------------|
| (1) <i>Aegopis</i> Ftzgr. | (3) <i>Zonyalina</i> Mrts. |
| (2) <i>Moreletia</i> Gray.
Syn. <i>Edusa</i> Alb. | |
| (1) <i>Zonites algirus</i> Linné. Italie (BOURGUIGNAT).
[Syn. <i>Helix algira</i> Lin.; <i>Z. oculus-capri</i> Müll.] | |
| (1) <i>Zonites croaticus</i> Partsch. Épire (MOUSSON). | |
| (1) <i>Zonites albanicus</i> Ziegler. Albanie (POUPILLARD). | |
| (1) <i>Zonites acies</i> Férussac. Raguse, Dalmatie (CAILLIAUD).
[Syn. <i>Helix acutumargo</i> Fér.; <i>Helix antimargo</i> Zglr.] | |
| (1) <i>Zonites gemonensis</i> Férussac. Vénétie (STABILE).
[Syn. <i>Helix gemonensis</i> Fér.; <i>Helix isodoma</i> Jan.] | |
| <i>Zonites morlachicus</i> Rossmässler. Cuzzola. | |

Genre **Hyalinia** Agassiz.

[Syn. *Hyalinæ* Agas.; *Hyalina* Alb.; *Helicella* Bk.;
Zonites A. Schm.]

SECTIONS

- | | |
|--|--|
| (1) <i>Vitrea</i> Ftzgr.
Syn. <i>Crystallus</i> Lowe.
— <i>Crystallinæ</i> Brgt. | (8) <i>Mesomphix</i> Rfq. |
| (2) <i>Polita</i> Held.
Syn. <i>Oxycheilus</i> Ftzgr.
— <i>Lucilla</i> Lowe.
— <i>Aplostoma</i> Moq.-Td.
— <i>Euhyalina</i> Alb. | (9) <i>Conulus</i> Ftzgr.
Syn. <i>Petasia</i> Bk. |
| (3) <i>Zonitoides</i> Lhmr. | (10) <i>Patulopsis</i> Streb. |
| (4) <i>Nautilinus</i> Mss. | (11) <i>Sagdinella</i> Mörch. |
| (5) <i>Guestieria</i> Cross. | (12) <i>Hyalosagda</i> Alb. |
| (6) <i>Dicrasna</i> Pfr. | (13) <i>Gastrodonta</i> Alb. |
| (7) <i>Omphalina</i> Rfq. | (13 ^a) <i>Ventridens</i> Bin. |
| | (13 ^b) <i>Helicodiscus</i> Morse. |
| | (14) <i>Odontosagda</i> Alb. |
| | (15) <i>Proserpinula</i> Alb. |

- (8) *Hyalinia olivetorum* Gmelin. [Dupuy, Hist. Moll., p. 234, pl. x, fig. 2.] Cauterets (T. LETOURNEUX); Lectoure (DUPUY).
[Syn. *Helix incerta* Drap.]
- (8) *Hyalinia zonitomæa* A. Letourneux. Thabourt, Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *Helix zonitomæa* A. Letourn.]

Genre **Anostoma** Fischer.

[Syn. *Angystoma* Schmch.; *Anostomæ* Fér.; *Tomogeres* Blvll.; *Tomogerus* Mft.]

SECTIONS

- (1) *Anostoma* Mft. | (2) *Ringicella* Gray.
- (1) *Anostoma ringens* Linné. Brésil (CAILLIAUD).
[Syn. *A. depressa* Lmck.; *A. resupinatum* Schmch.]
- (2) *Anostoma globulosum* Lamarek. Brésil (LLOYD).
[Syn. *A. ringiculum* Fér.]

Genre **Leucochroa** Beck.

[Syn. *Solarium* Schmch.; *Calcarina* Moq.-Td.; *Iberus* H. et A. Ad.]

Leucochroa candidissima Draparnaud. Algérie (A. LETOURNEUX); Espagne; Saida; Jérusalem (BOURGUIGNAT).
[Syn. *Helix candidissima* Drap.; *Zonites candidissimus* Moq.-Td.]

Leucochroa Otthiana Forbes. Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *Zonites Otthianus* Brgt.]

Leucochroa chionodiscus Pfeiffer. Algérie (A. LETOURNEUX).

Leucochroa Boissieri Charpentier. Mer Morte (BOURGUIGNAT).
[Syn. *Zonites Boissieri* Brgt.]

Leucochroa cariosula Michaud. Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *Zonites cariosulus* Brgt.]

Leucochroa cariosa Olivi. Beyrouth (BOURGUIGNAT).
[Syn. *Zonites cariosus* Brgt.]

Leucochroa piestia Bourguignat. Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *Zonites piestius* Brgt.]

Leucochroa bætica Rossmässler. Oran (A. LETOURNEUX).
[Syn. *Zonites bæticus* Brgt.]

Genre **Trochomorpha** Albers.

SECTIONS

- | | |
|---|-------------------------|
| (1) Nigritella Alb. | (4) Kaliella W. Blfd. |
| (2) Thysanota Alb. | (5) Videna H. et A. Ad. |
| (3) Sitala H. Ad. | Syn. <i>Discus</i> Alb. |
| Syn. <i>Conulema</i> Stoliez. | |
| (5) <i>Trochomorpha Troilus</i> Gould. Ile Samoa (Mousson). | |
| [Syn. <i>Helix Troilus</i> Gld.] | |

FAMILLE DES HELICIDÆ

Genre **Helix** Linné.

SECTIONS

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (1) Glyptostoma Blnd. | 10 ^c Systrophia Pfr. |
| (2) Amphidoxa Alb. | 10 ^a Stegodera Mrts. |
| (3) Microphysa Alb. | (11) Plectopylis Bens. |
| (4) Pelia Alb. | (12) Polygyra Say. |
| (5) Cysticopsis Mörch. | Syn. <i>Ulostoma</i> Alb. |
| (6) Pella Alb. | — <i>Anchistoma</i> H. et A. Ad. |
| (7) Strobila Morse. | 12 ^a Polygra Mörch. |
| (8) Gonostoma Hld. | 12 ^b Daedalochila Bk. |
| Syn. <i>Tridopsis</i> Rfq. | Syn. <i>Stenotrema</i> Hrtm. |
| — <i>Anchistoma</i> Kob. | 12 ^c Polygyrella Blnd. |
| 8 ^a Drepanostoma Porr. | 12 ^d Ammonitella Coop. |
| 8 ^b Trigonostoma Ftzgr. | (13) Stenotrema Rfq. |
| Syn. <i>Helicodonta</i> Riss. | Syn. <i>Stenostoma</i> Rfq. |
| — <i>Vortex</i> Bk. | — <i>Tridopsis</i> Woodw. |
| — <i>Euphemia</i> Leach. | |
| 8 ^c Caracolina Ehbgr. | (14) Triodopsis Rfq. |
| 8 ^d Sculptaria Pfr. | Syn. <i>Tridopsis</i> Bk. |
| (9) Aegista Alb. | — <i>Xolotrema</i> Rfq. |
| | — <i>Metodontia</i> Mlldf. |
| (10) Ophiogyra Alb. | 14 ^a Isognomostoma Ftzgr. |
| 10 ^a Corilla H. et A. Ad. | 14 ^b Triodopsis Tryon. |
| Syn. <i>Polygyra</i> Sw. | (15) Mesodon Rfq. |
| — <i>Atopa</i> Alb. | Syn. <i>Aplodon</i> Rfq. |
| 10 ^b Polygyratia Gray. | — <i>Patera</i> Alb. |
| Syn. <i>Polygyra</i> Woodw. | — <i>Ulostoma</i> Tryon. |

- (16) *Acanthinula* Bk.
 Syn. *Fruticicola* Moq.-Td.
 — *Zoogenites* Morse.
- (17) *Vallonia* Riss.
 Syn. *Zurama* Leach.
 — *Amplexus* Brown.
 — *Chilostoma* Ftzgr.
 — *Circinaria* Bk.
 — *Glaphyra* Alb.
 — *Lucena* Moq.-Td.
- (18) *Petasia* Bk.
 Syn. *Trochiscus* Hld.
 — *Perforatella* Schlütr.
 — *Dibothrion* Pfr.
- (19) *Jeanneretia* Pfr.
- (20) *Acusta* Alb.
- (21) *Satsuma* A. Ad.
- (22) *Hygromia* Riss.
 Syn. *Bradybaena* Bk.
 — *Hygromanes* Fér.
- 22^a *Fruticicola* Hld.
 Syn. *Eulota* Hrtm.
- 22^b *Monacha* Hrtm.
- 22^c *Nummulina* Kob.
- 22^d *Carthusiana* Kob.
 Syn. *Teba* Strob.
 — *Theba* Stab.
- 22^e *Zenobia* Gray.
- 22^f *Trichia* Hrtm.
 Syn. *Petasia* Bk.
 — *Petasina* Mörch.
 — *Zenobia* Moq.-Td.
 — *Monacha* Mörch.
 — *Bradybaena* Stab.
- 22^g *Hispidella* Lowe.
- 22^h *Ciliella* Mss.
- (23) *Xerophila* Hld.
 Syn. *Teba* Leach.
 — *Theba* Kiss.
 — *Jacosta* Mörch.
- 23^a *Euparypha* Hrtm.
 Syn. *Theba* H. et A. Ad.
 — *Polymita* Tryon.
- 23^b *Heliomanes* Fér.
- 23^c *Monilearia* Mss.
- 23^d *Lemniscia* Lowe.
- 23^e *Jacosta* Gray.
 Syn. *Crenea* Alb.
- 23^f *Xeroleuca* Kob.
- 23^g *Helicella* Fér.
 Syn. *Jacosta* Mörch.
 — *Theba* Bk.
- 23^h *Helicopsis* Ftzgr.
 Syn. *Helicella* Moq.-Td.
 — *Candidula* Kob.
- 23ⁱ *Turricula* Bk.
 Syn. *Obelus* Hrtm.
 — *Crenea* Alb.
 — *Irus* H. et A. Ad.
 — *Trochula* Mörch.
- 23^k *Cochlicella* Riss.
 Syn. *Cochlicellus* Bk.
 — *Elisma* Leach.
 — *Longaeva* Mhld.
 — *Trochula* Mörch.
- (24) *Ochtheophila* Bk.
 Syn. *Ochtheophyla* Mss.
 — *Octephila* Paiv.
- 24^a *Hystericella* Lowe.
- 24^b *Geomitra* Sw.
 Syn. *Coronaria* Lowe.
- 24^c *Heterostoma* Hrtm.
 Syn. *Spirorbula* Lowe.
- 24^d *Irus* Lowe.
 Syn. *Placentula* Pfr.
- 24^e *Placentula* Lowe.
- (25) *Actinella* Lowe.
 Syn. *Rimula* Lowe.
 — *Caseolus* Lowe.
- (26) *Tectula* Lowe.
 Syn. *Crenea* Paiv.
- (27) *Craspedaria* Lowe.
- (28) *Discula* Lowe.
- (29) *Gallina* Lowe.
- (30) *Plectotropis* Alb.
 Syn. *Thea* Alb.

- (31) *Odontura* Cross.
Syn. *Aglaja* Alb.
- (32) *Lysinoë* H. et A. Ad.
- (33) *Epiphragmophora* Döring.
Syn. *Lysinoë* Strob.
- (34) *Campylaea* Bk.
Syn. *Helicigona* Riss.
— *Chilostoma* Ftzgr.
— *Corneola* Moq.-Td.
- 34^a *Xerocampylaea* Kob.
- 34^b *Fruticocampylaea* Kob.
- 34^c *Eucampylaea* Bk.
- 34^d *Tacheocampylaea* Pfr.
- 34^e *Elona* A. Ad.
Syn. *Sterna* Alb.
- 34^f *Chilotrema* Leach.
Syn. *Helicigona* Riss.
— *Helicigona* C. Pfr.
— *Latomus* Ftzgr.
— *Lenticula* Hld.
— *Cheilotrema* Lowe.
— *Caracolla* Sw.
- (35) *Eurycampta* Alb.
- (36) *Leptarionta* Cross. et F.
- (37) *Arianta* Leach.
Syn. *Arionta* Alb.
- (38) *Eurystoma* Alb.
- (39) *Eremina* Pfr.
Syn. *Erinna* Mörch.
— *Eremophila* Kob.
- (40) *Rhagada* Alb.
- (41) *Tachea* Leach.
Syn. *Acavus* Blvll.
— *Acave* Kryn.
— *Helicogena* Bk.
— *Cepæa* Hld.
— *Archelix* Alb.
- (42) *Macularia* Alb.
Syn. *Tachea* Pfr.
— *Otala* Moq.-Td.
- (43) *Iberus* Alb.
- 43^a *Iberus* Mft.
- 43^b *Murella* Pfr.
- 43^c *Levantina* Kob.
- (44) *Coryda* Alb.
- 44^a *Coryda* Alb.
- 44^b *Histrio* Pfr.
- 44^c *Dialeuca* Alb.
- (45) *Leptoloma* Alb.
Syn. *Dialeuca* Alb.
- (46) *Hemicycla* Sw.
Syn. *Mycena* Alb.
Cochlea H. et A. Ad.
- (47) *Cœlatura* Pfr.
- (48) *Plebecula* Lowe.
- 48^a *Helicomela* Lowe.
- 48^b *Plebecula* Lowe.
- (49) *Leptaxis* Lowe.
Syn. *Catostoma* Lowe.
— *Cryptaxis* Lowe.
- 49^a *Genuinæ* Cless.
- 49^b *Pseudocampylaea* Pfr.
- 49^c *Carinatæ* Cless.
Syn. *Mitra* Alb.
— *Lampadia* Alb.
- (50) *Pomatia* Bk.
- 50^a *Cantareus* Riss.
Syn. *Lucena* Hrtm.
— *Tapada* Gray.
— *Canthareus* Agas.
- 50^b *Cryptomphalus* Moq.-Td.
- 50^c *Pomatia* Gray.
Syn. *Cœnatoria* Hld.
— *Helicigona* Moq.-Td.
- (51) *Thelidomus* Sw.
- 51^a *Leiocheila* Alb.
Syn. *Leiostoma* Sw.
— *Liochila* Alb.
- 51^b *Pachystoma* Alb.
Syn. *Otala* Mörch.
- (52) *Plagioptycha* Pfr.

- (53) Hemitrochus Sw.
Syn. *Phædra* Alb.
- (54) Polymita Bk.
- (55) Eurycratera Bk.
Syn. *Pomatia* Mörch.
- 55^a Pathena Alb.
- (56) Helicophanta Bk.
Syn. *Eurycratera* H. et
A. Ad.
- (57) Panda Alb.
- (58) Stylodonta Jan.
Syn. *Stylodon* Bk.
— *Columpica* Hrtm.
— *Pachya* Alb.
- (59) Erepta Alb.
- (60) Polydontes Mft.
Syn. *Agalma* Alb.
- (61) Dentellaria Schmch.
Syn. *Lucerna* Sw.
— *Lucidula* Sw.
— *Lucernella* Sw.
— *Cyclodoma* Sw.
- (62) Pleurodonta Fschr.
Syn. *Caprinus* Mft.
— *Lucerna* Sw.
— *Lyrostoma* Mörch.
- (63) Labyrinthus Bk.
Syn. *Lyrostoma* Sw.
- (64) Cepolis Mft.
Syn. *Cepolum* Mft.
- (65) Isomeria Alb.
- (66) Caracolus Mft.
Syn. *Lampadion* Bolt.
— *Carocolla* Schmch.
— *Discodoma* Sw.
— *Serbendulus* Klein.
- (67) Phania Alb.
- (68) Thersites Pfr.
- (69) Merope Alb.
- (70) Obba Bk.
- 70^a Obba Semp.
- 70^b Janira Alb.
- 70^c Philina Alb.
Syn. *Pusiodon* Sw.
— *Obbina* Semp.
— *Philidora* Morg.
- (71) Trachia Alb.
- (72) Angasella A. Ad.
- (73) Phasis Alb.
- (74) Planispira Bk.
- (75) Chloritis Bk.
Syn. *Erigone* Alb.
— *Semicornu* Klein.
— *Planispira* Pfr.
- (76) Pedinogyra Alb.
- (77) Ampelita Bk.
- (78) Solaropsis Bk.
Syn. *Ophidermis* Agas.
— *Helicella* Sw.
- (79) Dorcasia Gray.
Syn. *Galaxias* Bk.
- (80) Camaena Alb.
Syn. *Camena* Alb.
- (81) Hadra Alb.
- (82) Xanthomelon Alb.
- (83) Geotrochus Hasslt.
- 83^a Geotrochus Mrts.
- 83^b Eugenia Alb.
- 83^c Papuina Mrts.
- 83^d Pseudopartula Pfr.
Syn. *Draparnaudia*
Montrz.
- 83^e Oxychona Mörch.
- (84) Acavus Mft.
Syn. *Otala* Schmch.
- (85) Albersia H. Ad.
- (86) Axina Alb.
- (87) Anoglypta Mrts.
- (88) Corasia Alb.
- (89) Chloræa Alb.
Syn. *Thersites* Mörch.

- (8^b) *Helix holosericea* Studer. Jura, Suisse (STABILE).
[Syn. *H. diodonstoma* Brgt.]
- (8^b) *Helix obvoluta* Müller. [Dupuy, Hist. Moll., p. 164, pl. VII, fig. 5.] Fontenay (T. LETOURNEUX); Grasse (STABILE).
- (8^c) *Helix corcyrencis* Partsch. Corfou (A. LETOURNEUX).
[Syn. *H. contorta*, Zglr.]
- (10^b) *Helix polygirata* Born. Brésil.
- (14) *Helix elevata* Say. Cincinnati, Ohio (FAGOT).
- (14^a) *Helix isognomostoma* Gmelin. [Dupuy, p. 168, pl. VII, fig. 7.] Haut-Rhin (DUPUY).
[Syn. *H. personata* Lmck., 1792; *H. isognomostomos* Gmel. 1780; *H. isognomostoma* Brgt. 1862.]
- (15) *Helix albolabris* Say. États-Unis (BERNARDI).
- (15) *Helix exoleta* Binney. Cincinnati, Ohio (FAGOT).
[Syn. *H. zalea* Say.] Géorgie, États-Unis (BERNARDI).
- (15) *Helix profunda* Say. Cincinnati, Ohio (FAGOT).
- (22^a) *Helix fruticum* Müller. Moselle (M^{me} HERMITE); Aube (BOURGUIGNAT); Crimée (EUDEL).
Var. *rubella*, Seine-et-Oise.
- (22^a) *Helix Orsinii* Porro. Les Abruzzes (BLANC).
- (22^a) *Helix apennina* Porro. Fossato, Ombrie (BLANC).
- (22^a) *Helix Nicaisiana* A. Letourneux. Kabylie (A. LETOURNEUX).
- (22^a) *Helix Maacki* Gerstfeld. Sibérie (JOLY).
- (22^b) *Helix limbata* Draparnaud. [Dupuy, p. 210, pl. IX, fig. 9.] Nantes, Fontenay, Lusignan (T. LETOURNEUX).
- (22^b) *Helix incarnata* Müller. [Dupuy, p. 208, pl. IX, fig. 8.] Bonneville (DUMONT).
- (22^e) *Helix Faidherbeana* Bourguignat. [Bourg. Moll. nouv., 9^e déc., n° 82, pl. XXXIX, fig. 1-3.] Algérie, Tenez (A. LETOURNEUX).
- (22^f) *Helix villosa* Draparnaud. [Dupuy, p. 193, pl. VIII, fig. 5.] Lauterbrünnen (LELIÈVRE).

- (23) *Helix microticha* Bourguignat. Algérie, Tenez (A. LETOURNEUX).
- (23) *Helix Henoniana* Bourguignat. [Bourg. Moll. nouv., 12^e déc., p. 48, pl. II, fig. 4-6.] Algérie, Chabet-el-Akra (A. LETOURNEUX).
- (23^a) *Helix pisana* Müller. Fontenay, Le Pouliguen (T. LETOURNEUX) ; Algérie (A. LETOURNEUX).
- (23^a) *Helix erytronichia* Bourguignat. Maroc (JOLY).
[Syn. *H. Dehnei* Rossm.]
- (23^b) *Helix acomptia* Bourguignat. Oran (A. LETOURNEUX).
- (23^b) *Helix Seetzeni* Koch. Jérusalem (BOURGUIGNAT).
- (23^b) *Helix lauta* Lowe. [Dupuy, p. 293, pl. XIII, fig. 9.] Fontenay-le-Comte (T. LETOURNEUX) ; Algérie (A. LETOURNEUX).
- (23^b) *Helix arenarum* Bourguignat. [Bourg., Mal., Alg., pl. XXXVII, fig. 1-9.] Alger (A. LETOURNEUX).
- (23^b) *Helix moësta* Parreys. [Bourg., Mal. Alg., pl. XXV, fig. 1-7.] Kabylie (A. LETOURNEUX).
- (23^b) *Helix mauritanica* Bourguignat. Algérie (A. LETOURNEUX).
- (23^b) *Helix lineata* Olivi. [Dupuy, p. 297, pl. XIV, fig. 1.] Fontenay-le-Comte (T. LETOURNEUX) ; Algérie (A. LETOURNEUX) ; Alicante, Espagne [M^{me} HERMITE].
[Syn. *H. maritima* Drap.]
- (23^b) *Helix variabilis* Draparnaud. [Dup., p. 294, pl. XIV, fig. 2.] Fontenay-le-Comte (T. LETOURNEUX).
- (23^b) *Helix candidula* Studer. Poitiers (MAUDUYT) ; Agen (GASSIES) ; Bonneville (DUMONT) ; Lyon.
[Syn. *H. unifasciata* Poir.]
- (23^b) *Helix subrostrata* Férussac. [Bourg., Mal. Alg., pl. XXVII, fig. 10.] Oran (A. LETOURNEUX).
- (23^b) *Helix bardoensis* Forbes. Bougie, Algérie (A. LETOURNEUX).
- (23^b) *Helix meridionalis* Parreys. Barri, dans les Pouilles, Italie (DUPUY).
- (23^e) *Helix explanata* Müller. Palavas (Hérault) (PALADILHE) ; Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *Carocolla albella* Lmck. ; *Helix albella* Drap. p. 259, pl. XII, fig. 5, non Linné.]

- (23^e) *Helix depressula* Parreys. [Bourg., Mal. Alg., pl. xxxi, fig. 7-17.] Algérie (A. LETOURNEUX).
- (23^f) *Helix mograbina* Morelet. [Bourg., Mal. Alg., pl. xxxvi, fig. 4-6.] Oran (A. LETOURNEUX).
- (23^g) *Helix cespitum* Draparnaud. [Dupuy, p. 286, pl. XIII, fig. 6.] Marseille (ROUX); Algérie (A. LETOURNEUX).
Var..... Algérie (A. LETOURNEUX).
- (23^g) *Helix stiparum* Rossmässler. Cherchell, Algérie (A. LETOURNEUX).
- (23^g) *Helix Adolphi* Pfeiffer. Cherchell, Algérie (A. LETOURNEUX).
- (23^g) *Helix sphærita* Hartmann. Oran (A. LETOURNEUX).
- (23^g) *Helix ericetorum* Müller. [Dupuy, p. 288, pl. XIII, fig. 7.] Vendée, Loire-Inférieure (T. LETOURNEUX).
Bonneville (DUMONT).
- (23^g) *Helix kabyliana* Debeaux. Kabylie (A. LETOURNEUX).
- (23^g) *Helix neglecta* Draparnaud. [Dupuy, p. 290, pl. XIII, fig. 8.] Marseille (ROUX).
- (23^g) *Helix Terveri* Michaud. France méridionale (PALADILHE).
- (23^g) *Helix Colomesiana* Bourguignat. Oran (A. LETOURNEUX).
- (23^g) *Helix bathyomphala* Charpentier. Monte Corno, Italie (BLANC).
- (23^g) *Helix oranensis* Morelet. [Bourg., Mal. Alg., pl. xxviii, fig. 1-10.] Oran (A. LETOURNEUX).
- (23^g) *Helix cretica* Férussac. [Bourg., Mal. Alg., I, p. 232, pl. XIV, fig. 16-20.] Algérie, Égypte (A. LETOURNEUX); île de Syra (BLANC); Athènes (M^{me} HERMITE).
- Helix obovia* Hartmann. Tyrol (STABILE); Bologne (DUMONT).
- Helix submaritima* Rossmässler. Eche, prov. d'Alicante, Espagne.
- (23^h) *Helix submeridionalis* Bourguignat. [Bourg., Mal. Alg., pl. xxiii, fig. 26-29.] Oran (A. LETOURNEUX).

- (23¹) *Helix terrestris* Pennant. Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *H. elegans* Drap.]
- (23¹) *Helix euphorca* Bourguignat. [Bourg., Mal. Alg.,
pl. xxv, fig. 20-24] Alger (A. LETOURNEUX).
- (23¹) *Helix pyramidata* Draparnaud. Algérie (A. LETOURNEUX).
- (23¹) *Helix chalcidica* Mousson. Chalcas, Eubée (BLANC).
- (23¹) *Helix trochoides* Poiret. Algérie (A. LETOURNEUX).
- (23¹) *Helix contermina* Shuttleworth La Calle (A. LETOURNEUX).
[Syn. *H. psammoica* Morelet.]
- Helix aurasica* A. Letourneux. Dj. Mahmel, Algérie
(A. et E. LETOURNEUX).
- Helix rechodia* Bourguignat. [Bourg., Paléont. Alg.,
p. 64, pl. II, fig. 6-9.] Constantine (A. LETOURNEUX).
- Helix tauchomana* Bourguignat. Algérie (A. LETOURNEUX).
- Helix Borni* Chemnitz. Porto-Rico (M^{me} HERMITE).
- (24^e) *Helix hirta* Menke. Fiume (A. LETOURNEUX).
- (34^a) *Helix Raspaili* Payraudeau. [Payr., pl. v.] Corse.
- (34^a) *Helix carascalensis* Férussac. [Dupuy, p. 147, pl. VIII,
fig. 4.] Caunterets (T. LETOURNEUX); Pic du Midi
(DUPUY).
- Helix morronica* H. Blanc. Monte Morrone, Abruzzes
(H. BLANC).
- (34^b) *Helix carseolana* Férussac. Monte Majello, Abruzzes
(BLANC).
- (34^c) *Helix cornea* Draparnaud. Fontenay-le-Comte, Luzignan
(T. LETOURNEUX).
- Var..... Montpellier (PALADILHE).
- (34^c) *Helix Presli* F. Schmidt. Tyrol (MOUSSON).
- (34^c) *Helix cingulata* Studer. Nice (STABILE); Saorgio,
Alpes-Maritimes (BOURGUIGNAT); Lugano (MOUSSON).
- (34^c) *Helix colubrina* Jan. Riva (MOUSSON).
[Syn. *H. cingulata* Studer. var. *colubrina* Jan.]
- (34^c) *Helix Hoffmanni* Partsch. Cattaro, Monténégro
(A. LETOURNEUX).

- (34^e) *Helix setosa* Ziegler. Sicile (CAILLIAUD); Autriche (POUPILLARD).
- (34^e) *Helix crinita* Sandri. Dalmatie (A. LETOURNEUX).
- (34^e) *Helix setipila* Ziegler. Ascoli-Piceno (BLANC).
- (34^e) *Helix Gobanzi* Frauenfeld. Lac de Garde (MOUSSON).
- (34^e) *Helix zonata* Studer. [Dup., p. 109, pl. VI, fig. 4.] Saint-Bernard (STABILE).
- (34^e) *Helix subzonata* Mousson. Corfou (A. LETOURNEUX).
- (34^e) *Helix fœtens* Studer. [Stabile, p. 51-55, pl. I, fig. 6.] Italie (STABILE).
- (34^e) *Helix tigrina* Jan. Italie (STABILE).
- (34^e) *Helix Pouzolzi* Payraudeau. Monténégro.
[Syn. *H. montenegrina* Zglr.]
- (34^e) *Helix gravoensis* Von Mühlfeldt. Cattaro (A. LETOURNEUX).
[Syn. *H. Pouzolzi* Payr.]
- (34^e) *Helix Varronis* Cantraine. Cattaro (A. LETOURNEUX).
[Syn. *H. Pouzolzi* Payr.]
- (34^e) *Helix montenegrina* Ziegler. Autriche (POUPILLARD).
[Syn. *H. Pouzolzi* Payr. var. *montenegrina* Zglr.]
- (34^e) *Helix planospira* Lamarek. Trieste, Croatie (LECOMTE).
- (34^e) *Helix alpina* Faure-Biguet. [Dupuy, p. 143, pl. VIII, fig. 2.] Grande-Chartreuse (DUMONT).
- (34^e) *Helix Fontenillii* Michaud. [Dupuy, p. 145, pl. VIII, fig. 3.] Saint-Bruno (DUMONT).
[Syn. *H. alpina* Faure-B. var. *Fontenillii* Michaud.]
- (34^e) *Helix glacialis* Thomas. Saint-Bernard (DUMONT).
- (34^e) *Helix pyrenaica* Draparnaud. [Dupuy, p. 151, pl. VII, fig. 6.] Pyrénées-Orientales.
- (34^e) *Helix Desmoulinsi* Farines. [Dupuy, p. 157, pl. VI, fig. 6.] Saint-Julien-de-Loria (BOURGUIGNAT); Pyrénées (DE NANSOUTY).
- (34^e) *Helix faustina* Ziegler. Autriche.
- (34^e) *Helix quimperiana* Férussac. [Dupuy, p. 153, p. VII, fig. 1.] Quimper.
[Syn. *H. corisopitensis* Desh.]

- (34^c) *Helix cryptozona* Ziegler. [Stabile, p. 55-63.] Sicile (CAILLIAUD).
 [Syn. *H. macrostoma* Mhlfld. var. *cryptozona* Zglr.]
Helix cattaroensis A. Letourneux. Cattaro (A. LETOURNEUX).
Helix adriatica A. Letourneux. Sorgenti du Jadro, près Salona (A. LETOURNEUX).
Helix istriana Bourguignat. Carniole (BOURGUIGNAT).
Helix subsetigera A. Letourneux. Raguse (A. LETOURNEUX).
Helix solitaria Say. Cincinnati, Ohio (FAGOT).
Helix picena Tiberi. Ascoli-Piceno, Italie (BLANC).
- (34^f) *Helix lapicida* Linné. [Dupuy, p. 157, pl. vi, fig. 6.] Fontenay, Lusignan (T. LETOURNEUX).
- (37) *Helix arbustorum* Linné. [Dupuy, p. 139, pl. vi, fig. 3.] Lautaret, Bonneville (DUMONT) ; Chambiers, Moselle ; Styrie (LECOMTE).
- (37) *Helix alpestris* Ziegler. Bonneville (DUMONT).
 [Syn. *H. arbustorum* Lin. var. *alpestris* Zglr.]
- (39) *Helix Ehrenbergi* Roth. Alexandrie (A. LETOURNEUX).
- (39) *Helix chilembia* Bourguignat. [Bourg., Moll. nouv., 4^e déc., p. 85, pl. xii.] Algérie (A. LETOURNEUX).
 [Syn. *H. Ehrenbergi* Roth. var. *chilembia* Brgt.]
- (39) *Helix desertorum* Forskal. Algérie (A. LETOURNEUX).
- (39) *Helix irregularis* Férussac. Égypte (A. LETOURNEUX).
 [Syn. *H. maculosa* Born ; *H. desertorum* Forsk. var. *irregularis* Fér.]
- (39) *Helix Hasselquisti* Ehrenberg. Égypte.
 [Syn. *H. desertorum* Forsk. var. *Hasselquisti* Ehrenb.]
- (39) *Helix Forskali* Bourguignat. Suez, Pyramides (JOBA) ; Ismailia, Nefisch (A. LETOURNEUX).
 [Syn. *H. desertorum* Forsk. var. *Forskali* Brgt.]
Helix psammita Bourguignat. Alexandrie (A. LETOURNEUX).
- (41) *Helix nemoralis* Linné. Nantes (T. LETOURNEUX) ; Belgique (LECOMTE).
 Var. *major*. Haute-Garonne.
- (41) *Helix vindobonensis* C. Pfeiffer. Vienne, Autriche (LECOMTE).
 [Syn. *H. austriaca* Mhlfld.]

- (41) *Helix sylvatica* Draparnaud. [Dup., p. 133, pl. v, fig. 6.] Chambiers, Moselle (DUMONT).
Var..... Petit Saint-Bernard (DUMONT).
- (41) *Helix hortensis* Müller. [Dup., p. 133, pl. v, fig. 6.] Fontenay-le-Comte (T. LETOURNEUX); Belgique (LECOMTE); Piémont (STABILE).
Var. *major*. Haute-Garonne.
- (41) *Helix hybrida* Poiret. Villers-Coterets (STABILE).
[Syn. *H. hortensis* Müll. var. *hybrida* Poir.]
- (41) *Helix Sauveuri* J. Colbeau. Belgique (LECOMTE).
[Syn. *H. hortensis* Müll. var. *Sauveuri* J. Colb.]
- (41) *Helix splendida* Draparnaud. France méridionale (STABILE); Espagne.
Var..... France méridionale (STABILE).
- (42) *Helix lactea* Müller. [Dup., p. 117, pl. iv, fig. 2.]; [Bourg., Mal. Alg., p. 122, pl. II, fig. 1-9.]; [Bourg., Moll. nouv., 8^e déc., pl. xxxi.] Pyrénées-Orientales (DUPUY); Algérie (A. LETOURNEUX).
- (42) *Helix jourdaniana* Bourguignat. [Bourg., Moll. nouv., 8^e déc., p. 245, pl. xxxviii, fig. 1-5.] Algérie (A. LETOURNEUX).
- (42) *Helix punctata* Müller. Algérie (A. LETOURNEUX).
- (42) *Helix apalolena* Bourguignat. Espagne (A. LETOURNEUX).
[Syn. *H. punctata* Müll. var. *apalolena* Brtg.]
- (42) *Helix vermiculata* Müller. Algérie (A. LETOURNEUX); Dalmatie (LECOMTE).
- (42) *Helix Dupotetiana* Terver. Algérie (A. LETOURNEUX).
- (42) *Helix zaffarina* Terver. Algérie (A. LETOURNEUX); Malaga (Bourguignat).
[Syn. *H. Dupotetiana* Terv. var. *zaffarina* Terv.]
- (42) *Helix Constantinæ* Forbes. Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *H. cirtæ* Rossm. *H. certa* Terv.; *H. Constantinæ* Brtg.]
- (42) *Helix Fleurati* Bourguignat. Tunis (J. DE LHOTELLERIE).
[Syn. *H. Constantinæ* Forb. var. *Fleurati* Brtg.]
- (42) *Helix Lucasi* Deshayes. Algérie (A. LETOURNEUX).

- (42) *Helix Juilleti* Terver. Algérie (A. LETOURNEUX).
- (42) *Helix punica* Morelet. [Bourg., Mal. Alg., p. 110, pl. ix, fig. 11-14.] Algérie (A. LETOURNEUX).
- (42) *Helix Codringtoni* Gray. Navarrin (JOBA).
- (42) *Helix marmorata* Férussac. Espagne (A. LETOURNEUX).
- (42) *Helix balearica* Ziegler. Majorque (A. LETOURNEUX).
- (42) *Helix Companyonii* Aleron. [Dupuy, p. 120, pl. iv, fig. 3.] Barcelone (PALADILHE).
[Syn. *H. balearica* Zglr. var. *Companyonii* Aler.]
- (42) *Helix soluta* Michaud. [Bourg., Mal., Alg., I, p. 134, pl. xiii, fig. 12-21.] Algérie (A. LETOURNEUX).
- (42) *Helix alabastrites* Michaud. [Bourg., Mal. Alg., I, p. 136, pl. xiii, fig. 18-21.] Algérie (A. LETOURNEUX).
- (42) *Helix hieroglyphicula* Michaud. [Bourg., Mal. Alg., I, p. 131, pl. xiii, fig. 7-11.] Algérie (A. LETOURNEUX).
- (42) *Helix abrolena* Bourguignat. Algérie, îles Habibas (A. LETOURNEUX).
- (42) *Helix niciensis* Férussac. [Dupuy, p. 126, pl. v, fig. 3.] Nice, Grasse.
- (42) *Helix surrentina* Ad. Schmidt. Vietri, Salerne (Italie). (BLANC).
- (42) *Helix tigris* Gervais. Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *H. tigrina* Brgt.]
- (42) *Helix Bonduelliana* Bourguignat. Algérie (A. LETOURNEUX).
- (42) *Helix Raymondi* Moq.-Tand. [Bourg., Mal., Alg. I, p. 104, pl. ix, fig. 1-4.] Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *H. Carpenteri* Tryon.]
- (42) *Helix minoricensis* Mitre. Mahon (LALLEMANT).
- (42) *Helix xanthodon* Anton. Algérie, îles Habibas (A. LETOURNEUX).
- (42) *Helix odopachia* Bourguignat. Algérie, îles Habibas (A. LETOURNEUX).
[Syn. *H. xanthodon* Ant. var. *odopachia* Brgt.]

- (42) *Helix massylæa* Morelet. [Bourg., Mal. Alg., p. 108, pl. ix, fig. 5-9.] Algérie (A. LETOURNEUX).
Helix catodonta Bourguignat, inédit. Prov. d'Oran, frontière du Maroc (BOURGUIGNAT).
Helix marrucina Tiberi. Le Sora (Labour) (BLANC).
Helix calendyma? Bourguignat. Algérie (A. LETOURNEUX).
Helix hispanica. Westerlund Séville (M^{me} HERMITE).
- (43a) *Helix spiriplana* Olivi. [Bourg., Moll. nouv., 1^{re} déc., p. 98, pl. xvii et xviii.] Syrie (M^{me} HERMITE); Constantinople (JOBA); Damas (GAILLARDOT).
- (43a) *Helix scabriuscula* Deshayes. Sicile (CAILLIAUD, M^{me} HERMITE).
- (43a) *Helix Gualteriana* Linné. [Chenu, p. 474.] Cadix (M^{me} HERMITE).
- (43b) *Helix orgonensis* Philibert. [Dupuy, pl. v, fig. 1, b. c.) Orgon (Var) (DUPUY).
- (43b) *Helix serpentina* Férussac. [Dupuy, p. 124, pl. vi, fig. 6.] Italie.
- (43b) *Helix Magnettii* Cantraine. Saint-Cyr (Var) (DUPUY). [Syn. *H. serpentina* Pfr.]
- (43b) *Helix muralis* Müller. Sicile (M^{me} HERMITE); Rome, Mahon, Croatie.
 Var. *carinata*. Sicile, temple de Segeite (M^{me} HERMITE).
- (43b) *Helix strigata* Müller. Croatie (BOURGUIGNAT, POUILLARD); Spolito (BLANC).
 Var. *umbrica* Charpentier. Castel San Felice (Ombrie) (BLANC).
- (43b) *Helix signata* Férussac. Monte Cassino (Labour) (BLANC).
Helix Darolli A. Letourneux. Djar, Algérie (A. LETOURNEUX).
- (43c) *Helix cæsareana* Parreys. [Bourg., Moll. nouv., 4^e Déc., p. 94.] Syrie (BOURGUIGNAT).
- (44) *Helix circumornata* Férussac. Env. de Naples (BLANC).
- (47) *Helix cœlatura* Lamarck. Algérie.

- (50^a) *Helix melanostoma* Draparnaud. [Dupuy, p. 101, pl. II, fig. 2.] France méridionale ; Algérie (A. LETOURNEUX) ; île de Crête (BLANC).
- (50^a) *Helix aperta* Born. [Dupuy, p. 99, pl. II, fig. 1.] Provence ; Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *H. naticoides* Drap.]
- (50^a) *Helix tristis* Pfeiffer. Corse (M^{me} HERMITE).
- (50^b) *Helix aspersa* Müller. Fontenay-le-Comte (T. LETOURNEUX) ; Algérie (A. LETOURNEUX).
- (50^b) *Helix nucula* Parreys. Alexandrie (A. LETOURNEUX).
Helix picenica Bourguignat. Vrlika (BOURGUIGNAT).
- (50^c) *Helix pomatia* Linné. Châteauroux (PERSONNAT).
- (50^c) *Helix grisea* Linné. Candie, Syrie (A. LETOURNEUX).
- (50^c) *Helix secernenda* Rossmässler. Spalata (A. LETOURNEUX).
- (50^c) *Helix lucorum* Müller. Crémone, Italie (STABILE).
- (50^c) *Helix Schläfli* Mousson. Corfou (A. LETOURNEUX).
- (50^c) *Helix Gesneri* Hazard, Adelsberg (A. LETOURNEUX).
- (50^c) *Helix ligata* Müller. Basilicata (Italie) (BLANC).
Var. *pseudopomatia* BLANC. Monte Corno, Abruzzes (BLANC).
- (50^c) *Helix pachya* Bourguignat. [Bourg., Mal. Alg., I, p. 106, pl. VII, fig. 5-8.] Algérie (A. LETOURNEUX) ; Nazareth (BOURGUIGNAT) ; Grèce (BOURGAULT-DUCOUDRAY).
- (50^c) *Helix cyrtolena* Bourguignat. Épire (BOURGUIGNAT) ; île de Céphalonie (BLANC).
- (50^c) *Helix cincta* Müller. Italie (STABILE) ; Vrlika.
- (50^c) *Helix figulina* Parreys. Chypre (A. LETOURNEUX).
- (50^c) *Helix cavata* Mousson. Syrie (BOURGUIGNAT).
Helix exochotera A. Letourneux. Cattaro, Sebenico, Monténégro (A. LETOURNEUX).
Helix chitagorea Blanc. Corfou (A. LETOURNEUX).
Helix cernenda Bourguignat. Monténégro (A. LETOURNEUX).
Helix ligulata. Férussac. Saïda (GAILLARDOT).

- Helix castaneostoma* Bourguignat. Sebenico (A. LETOURNEUX).
- Helix trixenostoma* Bourguignat. Syrie.
- (51^b) *Helix discolor* Férussac. Martinique.
- (51^b) *Helix auricoma* Férussac. Cuba (DUCHÉ).
[Syn. *H. microstoma* Lmek.]
- (51^b) *Helix lima* Férussac. Porto-Rico (DUCHÉ).
- (54) *Helix picta* Born. Cuba (M^{me} HERMITE).
- (55) *Helix cornu-militare* Linné. Indes.
[Syn. *H. gigantea* Lmek.]
- (55) *Helix angulata* Férussac. Porto-Rico (M^{me} HERMITE).
[Syn. *Carocolla inflata* Lmek.]
- (56) *Helix magnifica* Férussac. Madagascar (PETIT DE LA SAUSSAYE).
[Syn. *H. polyzonata* Lmek.]
- (56) *Helix sulcifera* Duclos.
- (56) *Helix Goudotiana* Férussac. Algérie (A. LETOURNEUX).
- (58) *Helix unidentata* Chemnitz. Iles Séchelles (ex. Pfeiffer) (DUCHÉ).
- (59) *Helix mauritiana* Pfeiffer. Ile Maurice.
Helix Durvillei. Hombron et Jacquinot. Haïti (DUCHÉ).
- (60) *Helix luquillensis* Shuttleworth. Porto-Rico (M^{me} HERMITE).
- (60) *Helix indiscreta* Müller. Cuba (DUCHÉ).
[Syn. *H. marginella* Gmel.]
- (61) *Helix nux-denticulata* Chemnitz. Martinique (JOBA, M^{me} HERMITE).
[Syn. *H. hippocastanum* Lmek.]
- (61) *Helix lychnuchus* Müller. Guadeloupe (M^{me} HERMITE).
- (61) *Helix barbadensis* Lamarck. Guadeloupe (DUCHÉ).
[Syn. *H. isabella* Férussac.]
- (61) *Helix dentiens* Férussac. Antilles (M^{me} HERMITE).
- (61) *Helix orbiculata* Férussac. Cayenne (DUCHÉ).
- (61) *Helix Josephinæ* Férussac. Antilles (DUCHÉ).
- (62) *Helix Bambridgei* Pfeiffer. Jamaïque (DUCHÉ).
[Syn. *H. Lamarcki* Fér.; *Carocolla acutissima* Lmek.]

- (64) *Helix cepa* Müller. Haïti (DUCHÉ).
- (66) *Helix angistoma* Férussac. Antilles (DUCHÉ).
- (66) *Helix transitoria* Pfeiffer. Cuba (BERNARDI).
[Syn. *H. marginelloides* d'Orb.]
- (66) *Helix Arangiana* Poey. Cuba (BERNARDI).
- (66) *Helix mina* Pfeiffer. Cuba (BERNARDI).
[Syn. *H. sagemon* Poey.]
- (70) *Helix madagascariensis* Lamarck. Madagascar.
- (70^a) *Helix Listeri* Gray. Philippines.
- (70^c) *Helix bigonia* Férussac. Philippines (JOBA).
- (70^c) *Helix planulata* Lamarck. Philippines (DUCHÉ).
- (70^e) *Helix rota* Broderip. Philippines (DUCHÉ, JOBA).
- (74) *Helix coluber* Beck. Amboine (MOUSSON).
- (77) *Helix sepulchralis* Férussac. Madagascar (PETIT DE LA
SAUSSAYE).
- (77) *Helix viridis* Deshayes. Célèbes (ex. Pfeiffer) (M^{me} HER-
MITE, DUCHÉ).
- (78) *Helix pellis-serpentis* Chemnitz. [Chenu, 1, p. 462,
fig. 3443.] Guyanne (DUCHÉ).
- (78) *Helix brasiliiana* Deshayes. Brésil.
[Syn. *H. brasiliensis* Bk.]
- (78) *Helix Pascalia* Cailliaud. Brésil (CAILLIAUD).
Helix dictyodes Férussac. Nouvelle-Calédonie (A.
LETOURNEUX).
- (81) *Helix cicatricosa* Müller. Canton, Chine (VESCO).
[Syn. *H. senegalensis* Ch.]
- (83^a) *Helix bifasciata* Burrow. Brésil (DUCHÉ, DURIEU).
[Syn. *H. pyramidella* Mke.]
- (84) *Helix hæmastoma* Linné. Indes.
- (84) *Helix melanotragus* Born. Indes.
[Syn. *H. hæmastoma* Lin. var. *melanotragus* Born.]
- (84) *Helix Waltoni* Reeve. Ceylan.
- (88) *Helix Valenciennesi* Eydoux. Philippines (DUCHÉ).

- (88) *Helix reginæ* Broderip. Philippines (Duché).
 [Syn. *H. smaragdina* Grat.]
Helix tricolor Pfeiffer. Ile Salomon (Lesourd).
Helix pretiosa Say. Les Philippines (Duché).
Helix Kochiana Möllendorff. Les Philippines.
Helix Zuffera Pfeiffer. Les Philippines (ex. Cailliaud)
 (Duché).
Helix rapa Müller. Les Philippines (ex. Cailliaud)
 (Duché).

Genre **Cochlostyla** Férussac.

[Syn. *Helicostyla* Mörch ; *Cochlostyla* Issel.]

SECTIONS

- | | |
|--|--|
| 1. Calocochlia Hartm.
Syn. <i>Callicochlias</i> Agas.
— <i>Axina</i> Mörch. | 6. Orthostylus Bk.
Syn. <i>Pithohelix</i> Sw.
— <i>Helicobulimus</i> Mörch.
— <i>Cochlostyla</i> H. et A.
Ad.
— <i>Hypselostyla</i> Mrts. |
| 2. Helicobulimus Brod.
Syn. <i>Chromocochlea</i> Hartm.
— <i>Cromatocochlias</i> Agas. | 7. Phengus Alb. |
| 3. Helicostyla Fér.
Syn. <i>Orustia</i> Mörch. | 8. Phoenicobius Mörch. |
| 4. Cochlodryas Mrts.
Syn. <i>Poëcilus</i> Alb. | 9. Chrysallis Alb. |
| 5. Eudoxus Alb. | 10. Canistrum Mörch. |
| | 11. Prochilus Alb. |
- (1) *Cochlostyla luzonica* Sowerby. Les Philippines (Duché).
 [Syn. *Helix luzonica* Sow. ; *Bulimus ovoideus* Lmck.]
- (1) *Cochlostyla speciosa* Jay. Les Philippines (Duché).
 [Syn. *C. cocomelos* Sow. ; *Helix cocomelos* Sow.]
- (1) *Cochlostyla dubiosa* Pfeiffer. Les Philippines (Duché).
 [Syn. *Helix dubiosa* Pfr.]
- (1) *Cochlostyla Pan* Broderip. Les Philippines (Duché).
 [Syn. *Helix Pan* Brod.]
- (3) *Cochlostyla annulata* Sowerby. Les Philippines (Duché).
 [Syn. *Helix annulata* Sow.]
- (3) *Cochlostyla fulgens* Sowerby (ex. Cailliaud). Les Philippines (Duché).
 [Syn. *Helix fulgens* Sow.]

- (3) *Cochlostyla monticula* Sowerby. Les Philippines (LESOURD).
[Syn. *Helix monticula* Sow.]
- (3) *Cochlostyla mirabilis* Férussac. Les Philippines (CAILLIAUD).
[Syn. *Helix mirabilis* Fér.]
- (4) *Cochlostyla Buschi* Pfeiffer (ex. Cailliaud). Les Philippines (DUCHÉ).
[Syn. *Helix Buschi* Pfr.]
- (4) *Cochlostyla polychroa* Sowerby. Les Philippines (LESOURD).
[Syn. *Helix polychroa* Sow.]
- (4) *Cochlostyla metamorfis* Férussac. Les Philippines (LESOURD).
[Syn. *Helix metamorfis* Fér.]
- (4) *Cochlostyla iloconensis* Sowerby. (ex. Cailliaud). Les Philippines (DUCHÉ).
[Syn. *Helix iloconensis* Sow.]
- (4) *Cochlostyla florida* Sowerby. Les Philippines (LESOURD).
[Syn. *Helix florida* Sow.]
- (5) *Cochlostyla effusa* Pfeiffer. Les Philippines (DUCHÉ).
[Syn. *Helix effusa* Pfr.]
- (6) *Cochlostyla nympa* Pfeiffer. Les Philippines (DUCHÉ).
[Syn. *Helix nympa* Pfr.]
- (6) *Cochlostyla pithogaster* Férussac. Les Philippines (DUCHÉ).
[Syn. *Helix pithogaster* Fér.]
- (6) *Cochlostyla Reevei* Broderip. Les Philippines (DUCHÉ).
[Syn. *Helix Reevei* Brod.]
- (6) *Cochlostyla virens* Pfeiffer. Les Philippines.
- (7) *Cochlostyla cincinnus* Sowerby. Les Philippines (DUCHÉ) ; Burias (LESOURD) ; Manille (JOBA).
[Syn. *Helix cincinnus* Sow. ; *Bulinus labiozonatus* Grat.]
- (7) *Cochlostyla simplex* Jonas. Les Philippines (DUCHÉ).
[Syn. *Helix simplex* Jon.]
- (9) *Cochlostyla mindoroensis* Broderip. Les Philippines (DUCHÉ).
[Syn. *Bulinus mindoroensis* Brod.]

- (9) *Cochlostyla chrysalidiformis* Sowerby. Les Philippines (Duché).
[Syn. *Bulimus chrysalidiformis* Sow.]
- (11) *Cochlostyla dryas* Broderip. Les Philippines (Duché).
[Syn. *Bulimus dryas* Brod. ; *B. paradoxus* Pfr.]
- (11) *Cochlostyla virgata* Jay. Les Philippines (Duché).
[Syn. *Bulimus virgatus* Jay ; *B. sylvanus* Brod. ;
B. poraceus Jay.]

FAMILLE DES BULIMIDÆ

Genre **Bulimus** Scopoli.

SECTIONS

- | | |
|---|---|
| (1) Amphidromus Alb.
Syn. <i>Orthostylus</i> Bk.
— <i>Canistrum</i> H. et A.
Ad. | (8) Anthimus Alb.
(9) Pachyotus Bk.
Syn. <i>Pachyotis</i> Woodwd.
— <i>Auris</i> Spix. |
| (2) Placostylus Bk.
2 ^a Euplacostylus Cross.
2 ^b Aspastus Alb. | (10) Otostomus Bk.
Syn. <i>Auricula</i> Sw.
10 ^a Navicula Spix. |
| (3) Charis Alb. | 10 ^b Semiclausaria Pfr. |
| (4) Macrodonates Sw. | (11) Strophocheilus Spix.
Syn. <i>Coniolus</i> Alb.
— <i>Strophochilus</i> Alb. |
| (5) Odontostomus Bk.
Syn. <i>Cyclodontina</i> Bk. | (12) Borus Alb. |
| (6) Tomigerus Spix.
Syn. <i>Tomogeres</i> Pfr. | (13) Orphnus Alb.
Syn. <i>Borus</i> Mörch. |
| (7) Plekocheilus Gldg. | 13 ^a Oxycheilus Alb.
Syn. <i>Oxychilus</i> Pfr. |
| 7 ^a Plecocochilus Gld. | |
| 7 ^b Gonyostomus Bk.
Syn. <i>Stenostoma</i> Spix.
— <i>Goniostoma</i> Sow.
— <i>Goniostomus</i> Herms. | (14) Dryptus Alb.
(15) Eurytus Alb.
(16) Rhinus Alb. |

- (1) *Bulimus comes* Pfeiffer. Cambodge (Duché).
- (2) *Bulimus melanostomus* Sowerby. Brésil (Duché).
Bulimus phasianellus Humbert. Chili, Pérou (Duché).
- (2^a) *Bulimus porphyrostomus* Pfeiffer. Nouvelle-Calédonie.

- (2^a) *Bulimus singularis* Morelet. [Gassies, p. 49, pl. iv, fig. 4.] Nouvelle-Calédonie (DUPUY).
[Syn. *B. porphyrostomus* Pfeiffer. var. *singularis* Morl.]
- (2^a) *Bulimus bovinus* Bruguière. Nouvelle-Zélande (DUCHÉ).
- (2^a) *Bulimus Souvillei* Morelet. Nouvelle-Calédonie.
- (2^a) *Bulimus Seemanni* Dhrn. [Journ. Conch., 75, p. 10.] Ile Fidji (MOUSSON).
- (2^a) *Bulimus elobatus* Gould. [Journ. Conch. 75, p. 13, pl. I, fig. 7.] Ile Fidji (MOUSSON).
- (2^b) *Bulimus miltocheilus* Reeve. Ile Salomon (DUCHÉ).
- (3) *Bulimus fulguratus* Jay. Ile Fidji (MOUSSON).
- (10) *Bulimus auris-leporis* Bruguière. Brésil (DURIEU).
- (12) *Bulimus ovatus* Müller. Indes orientales (ex. Lamarck) (DUCHÉ).
- (12) *Bulimus oblongus* Müller. Guyane (ex. Lamarck).
[Syn. *B. hæmastomus*, Scop.]
- (12) *Bulimus rosaceus* King. Chili (DUCHÉ).
- (13^a) *Bulimus magnificus* Grateloup. Brésil.

FAMILLE DES BULIMULIDÆ

Genre **Bulimulus** Leach.

SECTIONS

- | | |
|--|---|
| (1) Eudioptus Alb. | (12) Scutalus Alb. |
| (2) Plectostylus Bk. | 12 ^a Scutalus Alb. |
| (3) Leptomerus Alb. | 12 ^b Rhabdotus Alb. |
| (4) Drymæus Alb.
Syn. <i>Hamadryas</i> Alb. | (13) Pyrgus Alb. |
| (5) Liostracus Alb.
Syn. <i>Liostracus</i> Mörch. | (14) Ataxus Alb. |
| (6) Anctus Alb. | (15) Bostryx Trschl. |
| (7) Mesembrinus Alb. | (16) Næsiotus Alb.
Syn. <i>Nesiotus</i> Alb. |
| (8) Leptobyrsus Cross. et F. | — <i>Omphalostyla</i> H. et
A. Ad. |
| (9) Thaumastus Alb. | (17) Pleuropyrgus Mrts. |
| (10) Globulinus Cross. et F. | (18) Peronæus Alb. |
| (11) Mormus Alb. | (19) Pupoides Pfr. |

- (2) *Bulimulus peruvianus* Bruguière. Pérou (Duché).
[Syn. *Bulimus peruvianus* Brug.]
- (4) *Bulimulus cerebro-striatus* Leach. États-Unis.
- (4) *Bulimulus lætus* Reeve. Madagascar.
[Syn. *Bulimus lætus* Rv.]
- (12^a) *Bulimulus proteus* Broderip. Pérou (Duché).
[Syn. *Bulimus proteus* Brod. ; *B. sordidus* Desh.]

FAMILLE DES ORTHALICIDÆ

Genre **Orthalicus** Beck.

SECTIONS

- | | |
|--------------------|---|
| (1) Sultana Sh. | (4) Corona Alb. |
| (2) Zebra Sh. | (5) Orthalicinus Cross et F.
Syn. <i>Liguus</i> Tryon. |
| (3) Calycia H. Ad. | |
- (2) *Orthalicus undatus* Bruguière. Floride.
- (4) *Orthalicus reginus* Férussac. Brésil (ex. Lamarck)
(BOURGAULT-DUCOUDRAY).
[Syn. *Achatina melastoma* Swains ; *A. melanostoma*
Gray ; *Orthalicus rex-dextrorsus* Bk.]

Genre **Liguus** Montfort.

[Syn. *Chersina* Hmph. ; *Pseudostrombus* Mörch.]

Liguus virgineus Linné. Haïti.

Liguus fasciatus Müller. Floride.

[Syn. *Achatina solida* Say.]

FAMILLE DES ACHATINIDÆ

Subfamille des *Achatinæ*

Genre **Limicolaria** Schümacher.

[Syn. *Limicolarius* Bk.]

Limicolaria flammulata Pfeiffer. Afrique.

[Syn. *Bulimus flammulatus* Jay.]

Limicolaria Adansoni Pfeiffer. Gabon (Eudel) ;
Sénégal (Cailliaud).

[Syn. *Bulimus Kambeul* Brug. ; *B. Adansoni* Pfr.]

Genre **Achatina** Lamarck

[Syn. *Achatium* Link ; *Oncæa* Gist.]

SECTIONS

- | | |
|--|--------------------|
| (1) Homorus Alb. | (2) Achatinus Mft. |
| (2) <i>Achatina purpurea</i> Lamarck. Grand-Bassam (Eudel). | |
| (2) <i>Achatina perdrix</i> Lamarck. Antilles (ex. Lamarck).
[Syn. <i>A. variegata</i> Fabr.] | |
| (2) <i>Achatina panthera</i> Férussac. La Réunion (Eudel);
Madagascar (Joba). | |
| (2) <i>Achatina zebra</i> Lamarck. Madagascar (ex. Lamarck)
(Duché). | |
| (2) <i>Achatina fulica</i> Férussac. La Réunion (Eudel).
[Syn. <i>A. mauritiana</i> Lmck.] | |

Genre **Stenogyra** Shuttleworth.

[Syn. *Sira* A. Schmdt.]

SECTIONS

- | | |
|--|--|
| (1) Rumina Riss.
Syn. <i>Orbitina</i> Riss.
— <i>Cylindrina</i> Schlütr.
— <i>Bulimulus</i> Woodwd. | (6) Nothus Alb.
(7) Subulina Bk.
Syn. <i>Macrospira</i> Sw.
(8) Opeas Alb.
(9) Melaniella Pfr.
(10) Pseudobalea Sh. |
| (2) Clavator Mrts. | |
| (3) Obeliscus Bk. | |
| (4) Prosopeas Bk. | |
| (5) Euspiraxis Pfr. | |
-
- | | |
|--|--|
| (1) <i>Stenogyra decollata</i> Linné. France méridionale.
[Syn. <i>Rumina decollata</i> Riss.] | |
| (2) <i>Stenogyra Grandidieri</i> Crosse et Fischer. [Journ. Conch.
68, pl. VII, p. 182] Madagascar. | |
| (3) <i>Stenogyra calcarea</i> Bruguière. Brésil. | |

FAMILLE DES BULIMINIDÆ

Genre **Buliminus** Beck.

[Syn. *Bulimina* Ehrbg. *Bulimulus* Riss.]

SECTIONS

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| (1) Caryodes Alb. | 9 ^a Leucochiloides Cless. |
| (2) Leucotænius Alb. | Syn. <i>Leucochila</i> Alb. |
| (3) Liparus Alb. | (10) <i>Cylindrus</i> Ftzgr. |
| (4) Pachnodus Alb. | (11) <i>Mastus</i> Bk. |
| (5) Ovella Pfr. | Syn. <i>Cylindrus</i> Pfr. |
| (6) Rhachis Alb. | (12) <i>Zebrina</i> Hld. |
| (7) Cerastus Alb. | Syn. <i>Brephulus</i> Bk. |
| (8) Petræus Alb. | (13) <i>Chondrula</i> Bk. |
| 8 ^a Retowskia Bttg. | Syn. <i>Chondrus</i> Cuv. |
| (9) Ena Leach. | — <i>Jaminia</i> Riss. |
| Syn. <i>Peristoma</i> Kyrn. | — <i>Gonodon</i> Held. |
| — <i>Merdigerus</i> Hld. | — <i>Eucore</i> Agas. |
| — <i>Napaeus</i> Alb. | — <i>Mirus</i> Alb. |
| | (14) <i>Raphiellus</i> Pfr. |
- (1) *Buliminus fulvicans* Pfeiffer. Iles Séchelles (LESOURD).
[Syn. *Bulimus fulvicans*. Pfr.]
- (8) *Buliminus labrosus* Oliv. Syrie (BOURGUIGNAT).
[Syn. *Bulimus labrosus* Oliv.]
- (12) *Buliminus detritus* Müller. Monte Corno, Abruzzes
(BLANC).
[Syn. *Bulimus detritus* Müll.]

FAMILLE DES AURICULIDÆ

III. Subfamille des *Auriculinae*

Genre **Auriculus** Montfort.

[Syn. *Auricula* Lmck. ; *Geovula* Sow.]

Auriculus auris-Midæ Linné. Indes orientales (ex. Lamarek).
[Syn. *Auricula auris-Midæ* Lin.]

FAMILLE DES CYCLOSTOMIDÆ

III. *Subfamille des Cyclophorinæ*

Genre **Cyclophorus** Montfort.

SECTIONS

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| (1) <i>Myxostoma</i> Trschl. | (5) <i>Lagocheilus</i> Theob. |
| (2) <i>Scabrina</i> Blfd. | (6) <i>Ditropis</i> Blfd. |
| (3) <i>Cyclophorus</i> Mft. | (7) <i>Eupstichia</i> Cross. |
| (4) <i>Buckleyia</i> Higg. | (8) <i>Jerdonia</i> Blfd. |

Cyclophorus volvulus Müller. Indes.

[Syn. *Cyclostoma volvulus* Lmck.]

Cyclophorus luzonicus Sowerby. Les Philippines
(Duché, Joba).

[Syn. *Cyclostoma luzonicum* Sow.]

Cyclophorus turgidus Pfeiffer. Chine.

[Syn. *Cyclostoma turgidum* Pfeiffer.]

Cyclophorus variegatus Val., Sumatra (ex. Cailliaud)
(Duché).

[Syn. *Cyclostoma variegatum* Fér.]

VI. *Subfamille des Cyclostominæ*

Genre **Otopoma** Gray.

Otopoma naticoides Recluz. Socotora. (Duché).

[Syn. *Cyclostoma naticoides* Recl.]

Genre **Cyclostoma** Montfort.

[Syn. *Ligatella* Moeb.]

Cyclostoma occlusa Mörch. Madagascar.

[Syn. *Cyclostoma occlusus* Mörch.]

Cyclostoma unicarinata Linné. Madagascar (Duché).

[Syn. *Cyclostoma unicarinatus* Lin.]

Cyclostoma tricarinata Müller. Madagascar (Duché).

[Syn. *Cyclostoma tricarinatus* Müll.]

Cyclostoma aspera Potiez et Michaud. Madagascar
(A. Letourneux).

[Syn. *Cyclostoma asperum* Pot. et Mich.

Cyclostoma obsoleta Lamareck. Madagascar.

[Syn. *Cyclostoma obsoletus* Lmck.]

Cyclostoma Cuvieriana Petit. Madagascar.

[Syn. *Cyclostoma Cuvieranus* Pet.]

Cyclostoma Sowerbyi Pfeiffer.

Cyclostoma Olivieri Sowerby: Beyrouth (BOURGUI-
GNAT).

Cyclostoma cingulata Sowerby. Les Philippines
(ex. Cailliaud) (DUCHÉ).

Cyclostoma Peterveiana Gray. Madagascar (ex. Cail-
liaud) (DUCHÉ).

Cyclostoma dubia Gmelin.

II

COQUILLES FLUVIATILES

CLASSE DES GASTROPODES

I. Ordre des Pectinibranches

FAMILLE DES MELANIIDÆ

Genre **Paludomus** Swainson.

SECTIONS

- (1) *Paludomus* Sw. (2) *Tanalia* Gray.
(1) *Paludomus regulatus* Benson. Goramarack.
(2) *Paludomus undatus* Reeve. États-Unis (BERNARDI).
[Syn. *P. loricatus* Rv. var. *undatus* Rv.]
Paludomus acutus Reeve. Pondichéry.

Genre **Leptoxis** Rafinesque.

[Syn. *Anculotus* Say; *Anculosa* Conr.]

Leptoxis costata Anton. Ohio River, États-Unis (DUPUY, FAGOT).

[Syn. *L. trilineata* Say. var. *costata* Anth.]

Genre **Melania** Lamarck.

SECTIONS

- (1) *Ceriphasia* Sw. (4) *Juga* H. et A. Ad.
(2) *Potadoma* Sw. (5) *Juga* H. et A. Ad.
(3) *Megara* H. et A. Ad. (6) *Juga* H. et A. Ad.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (7) Juga H. et A. Ad. | (19) Melanoides Oliv. |
| (8) Juga H. et A. Ad. | (20) Melanoides Oliv. |
| (9) Pachycheilus Lea. | (21) Melanoides Oliv. |
| (10) Melaniella Sw. | (22) Tarebia H. et A. Ad. |
| (11) Pachycheilus Lea. | (23) Tarebia H. et A. Ad. |
| (12) Pachycheilus Lea. | (24) Plotia Bolt. |
| (13) Pachycheilus Lea. | (25) Tiara Bolt. |
| (14) Doryssa H. et A. Ad. | (26) Plotia Bolt. |
| (15) Melanoides Oliv. | (27) Pachycheilus Lea. |
| (16) Sermyla H. et A. Ad. | (28) Vibex Oken. |
| (17) Melanoides Oliv. | (29) Tarebia H. et A. Ad. |
| (18) Melanoides Oliv. | |

(2) *Melania virginæa* Say. Ohio (JOLY).

(10) *Melania crassa* Ktsch. Cettina, près Vrlika (A. LETOURNEUX).

[Syn. *Melaniella crassa* Ktsch.]

(10) *Melania coronata* Küster. La Save à Steinbrack (A. LETOURNEUX).

(10) *Melania Hollandri* Férussac.

Var. *lævigata* Rösm. Dalmatie (POUPILLIER);
Croatie (LECOMTE).

Var. *legitima* Rossm. Dalmatie (POUPILLIER);
Croatie (LECOMTE).

(15) *Melania asperata* Lamarck. Amérique du Sud (JOBA).

(17) *Melania rustica* Mousson. Java (MOUSSON).

(17) *Melania Rossiteri* Gassies. Nouvelle-Calédonie.

(19) *Melania decollata* Lamarck.

(21) *Melania tuberculata* Müller. Égypte (A. LETOURNEUX)
Algérie, Syrie (BOURGUIGNAT).

(21) *Melania aculeus* Lea. Iles Mariannes (POUPILLIER).
[Syn. *M. latronum* Tarnier.]

(22) *Melania semigranosa* Van der Burck. Java (MOUSSON).

(25) *Melania villosiuscula* Philippi. Nouvelle-Calédonie.
[Gassies, p. 91, pl. iv, fig. 7].

- (25) *Melania amarula* Linné. Chine (M^{me} HERMITE, EUDEL).
 (26) *Melania datura* Dornh. Ceylan.
 [Syn. *Melania acanthica* Dornh non Lea.]
 (26) *Melania granum* Van der Burek. Java (MOUSSON).
 (28) *Melania fusca* Gmelin Sénégal.
 (28) *Melania aurita* Müller. Afrique Occidentale.
Melania. Sp. Embouchure du Tigre; Chine.
Melania. Sp. Ile de Zèbre, Philippines.

Genre **Pirena** Lamarck.

Pirena ater Linné. Philippines.
 [Syn. *P. terebralis* Lmck. ; *Strombus ater* Lin.]

Genre **Hemisinus** Swainson.

[Syn. *Basistoma* Lea.]

Hemisinus ornatus Poey. Sagna-la-Grande, Cuba (CALVERT).
Hemisinus lineatus Wood. Rio Lobre, Jamaïque (DUPUY).
Hemisinus Esperii Moquin-Tandon. Podgnsed, Croatie (LECOMTE).
 [Syn. *H. decussatus* Fér.; *Melanopsis Esperii* Moq.-Td.]
Hemisinus acicularis Férussac. Carniole (MOUSSON);
 Croatie (LECOMTE).

Genre **Melanopsis** Férussac.

Melanopsis maroccana Morelet. Algérie (A. LETOURNEUX).
 Var. *costulata*. Algérie (A. LETOURNEUX).
Melanopsis præmorsa Linné. Saida, Tripoli, Syrie (GAILLARDOT).
Melanopsis Maresi Bourguignat. Algérie (MARÈS).
Melanopsis costata. Férussac. Lac de Tibériade.
Melanopsis prærosa Linné. Smyrne (M^{me} HERMITE).
 Var. *costata* Oliv. Lac de Gibereas.

Melanopsis Dufouri Férussac. Valence, Espagne (M^{me} HERMITE).

Var. *toscana* Campiglin, Toscane (MOUSSON, FAGOT).

Melanopsis carinata Gassies. Nouvelle-Calédonie (DUPUY).

Melanopsis buccinoidea Olivi. Vöslau, Autriche (LECOMTE).

Melanopsis sevillensis Grateloup. Séville, Espagne (FAGOT).

[Syn. *M. cariosa* Lin. var. *sevillensis* Grat.]

Melanopsis Graellsii Villa. Le Guadalquivir à Séville, Espagne (M^{me} HERMITE).

Melanopsis nodosa Férussac. Takrit, près Bagdad (MOUSSON).

Genre **Paladilhia** Bourguignat.

Paladilhia Moitessieri Bourguignat. Montpellier (PALADILHE).

Genre **Moitessieria** Bourguignat

Moitessieria Rollandiana Bourguignat. Montpellier (PALADILHE).

Genre **Pyrgula** Cristofori et Jan.

SECTIONS

(1) *Pyrgula* Jan.

(2) *Diána* Riss.

(1) *Pyrgula thiesseana* Godet. Missolonghi.

(1) *Pyrgula annulata* Linné. Lac de Garde, Italie (A. LE-TOURNEUX, STABILE).

[Syn. *P. helvetica* Michelin]

FAMILLE DES PLEUROCERIDÆ

Genre **Pleurocera** Rafinesque.

Sous genre **Lithasia** Haldman.

Lithasia plicata Wetherley. États-Unis.

Genre **Goniobasis** Leach.

[Syn. *Melasma*, H.-A. Adams ; *Juga*, H.-A. Adams.]

Goniobasis Spillmani Leach. États-Unis.

Goniobasis depygis Say. Mitford (Ohio).

Goniobasis livescens Menke. Mohawk-New-York.

Goniobasis plicato-striata Leach. Stones River.

Goniobasis clavæformis Leach. États-Unis.

Goniobasis louisvillensis Leach. États-Unis.

FAMILLE DES VIVIPARIDÆ

Genre **Vivipara** Lamarck.

[Syn. *Paludina*, Lamk ; *Viviparus* Mft. ; *Cyclostoma* Oken ; *Pleurocera* Blvll. ; *Viviparella* Rfq ; *Omphemis* Rfq ; *Oxytrema* Rfq.]

Vivipara fasciata Müller. [Dupuy, Hist. Moll., p. 540, pl. xxvii, fig. 6], Nantes (T. LETOURNEUX) ; Croatie (LECOMTE).

[Syn. *Paludina vivipara* Moq.-Td.]

Vivipara occidentalis Bourguignat. [Servain, Ann. de mal., p. 57.] La Vilaine à Rennes (A. LETOURNEUX).

Vivipara pyramidalis Bourguignat. [Servain, Ann. de mal., p. 58], Lac de Côme (A. LETOURNEUX).

Vivipara contecta Millet. Vendée (T. LETOURNEUX) ; Croatie (LECOMTE).

Vivipara canaliculata Gould. Ohio River (FAGOT).

[Syn. *Pleurocera canaliculata* Say.]

Genre **Neothauma** E. Smth.

Neothauma bicarinata Grandidier. Couze, Dordogne (GASSIES).

FAMILLE DES RISSOIDÆ

III. — SUBFAMILLE DES EMMERICIINÆ

Genre **Emmericia** Brusina.

Emmericia patula Brusina. Raguse (LECOMTE).

[Syn. *E. narrentana* Klec. var. *patula* Brusina].

Var. *scalaris* Neumayr. Raguse (LECOMTE).

IV. — SUBFAMILLE DES FLUMINICOLINÆ

Genre **Lithoglyphus** Von Mühlfeld.

[Syn. *Lithoclyphus* Crist.; *Paludestrina* d'Orb., *Lithoglypter* Ftzgr.]

Lithoglyphus naticoides Férussac. Agram, Croatie (LECOMTE).

V. — SUBFAMILLE DES HYDROBIINÆ

Genre **Hydrobia** Hartmann.

[Syn. *Leachia* Riss.; *Littorinella* Brown; *Peringia* Col.]

Hydrobia ventrosa Montagu. Adriatique.

[Syn. *Littorinella ventrosa* Mtg.]

FAMILLE DES AMPULLARIIDÆ

Genre **Ampullaria** Lamarck.

[Syn. *Pila* Bolt.; *Ampullarius* Mft.; *Pomacea* Perry; *Pachystoma* Gldg.; *Pachylabra* Sw.]

SECTIONS

- | | |
|--|------------------------------|
| (1) <i>Ampullaria</i> Lmk. | (5) <i>Lanistes</i> Mft. |
| (2) <i>Pomus</i> Humph. | Syn. <i>Lanites</i> Sw. |
| (3) <i>Marisa</i> Gray. | — <i>Meladomus</i> Sw. |
| Syn. <i>Ceratodes</i> Gldg. | (6) <i>Ampulloidea</i> Orb. |
| — <i>Marissa</i> Gray. | Syn. <i>Asolene</i> Orb. |
| (4) <i>Pomella</i> Gray. | — <i>Ampullaroides</i> Gray. |
| (1) <i>Ampullaria kordofana</i> Parreys. [Bourg., Moll. nouv., 8 ^e déc., p. 78, pl. II, fig. 12, 13.] Égypte (A. LETOURNEUX). | |
| [Syn. <i>A. ovata</i> Oliv.] | |
| (1) <i>Ampullaria Raymondi</i> Bourguignat. Égypte, (A. LETOURNEUX). | |
| (1) <i>Ampullaria globosa</i> Swainson. Calcutta (EUDEL). | |
| (1) <i>Ampullaria virens</i> Lamarck. Chine. | |
| (1) <i>Ampullaria scutata</i> Mousson. Java (Mousson). | |

- (1) *Ampullaria polita* Deshayes. Amérique.
- (1) *Ampullaria avellana* Quoy. Nouvelle-Zélande.
Ampullaria. Sp. Saïgon.
Ampullaria. Sp. La Plata.
- (2) *Ampullaria canaliculata* Lamarck.
- (2) *Ampullaria fasciata* Lamarck. Indes Orientales ; Antilles (ex. Lamarck).
- (2) *Ampullaria hopetonensis* Lea. Géorgie, États-Unis.
[Syn. *A. depressa* Say.]
- (2) *Ampullaria scalaris* d'Orbigny. Afrique.
- (2) *Ampullaria Swainsoni* Reeve.
- (5) *Ampullaria Bolteniana* Chemnitz. Égypte (A. LETOURNEUX).
[Syn. *A. carinata* Lmck.]
- (5) *Ampullaria guineaica* Lamarck. Côte-d'Or, Afrique.
- (5) *Ampullaria ovum* Peters. Mozambique.
[Syn. *Meladomus ovum* Peters.]
- (5) *Ampullaria elatior* Pfeiffer.
Ampullaria Kirkii. S. n. d'a.
- (5) *Ampullaria purpurea* Jonas. Zanzibar.
[Syn. *Meladomus purpureus* Jon.]
- (5) *Ampullaria pyramidalis* A. Letourneux. Zanzibar (A. LETOURNEUX).
[Syn. *Meladomus pyramidalis* A. Letourn.]
- (5) *Ampullaria pyramidalis* A. Letourneux. var. *minor*. Zanzibar (A. LETOURNEUX).

II. Ordre des Scutibranches

FAMILLE DES NERITIDÆ

Genre **Neritina** Lamarck.

[Syn. *Neritella* Humph. ; *Clypeolum* Relz. ; *Nereina* Crist. et Jan ; *Lamprostoma* Rqf. ; *Chernites* Gistl.]

SECTIONS

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Neritella</i> Humph. (2) <i>Neritina</i> Sw.
 Syn. <i>Clithon</i> Relz. | <ul style="list-style-type: none"> (3) <i>Vitta</i> Klein.
 Syn. <i>Theodoxus</i> Mft.
 — <i>Elea</i> Zglr.
 — <i>Puperita</i> Gray. |
|---|---|

- (4) *Dostia* Gray. (6) *Neripteron* Less.
 Syn. *Sandaliformis* Mke. (7) *Clithon* Mft.
 — *Mitrella* Mke. Syn. *Cliton* Less.
 (5) *Alinda* Relz. — *Corona* Relz.
- (1) *Neritina pulligera* Lamarck. Marseille (J. DE LHÔTEL-
 LERIE).
- (1) *Neritina canalis* Sowerby. [Gassies, p. 102, pl. VI,
 fig. 19.] Nouvelle-Calédonie.
- (1) *Neritina punctulata* Lamarck. Guadeloupe (M^{me} HER-
 MITE).
- (1) *Neritina Petiti* Recluz. Nouvelle-Calédonie.
- (2) *Neritina gagates* Lamarck. La Réunion (JOBA).
- (2) *Neritina zebra* Lamarck. Amérique du Sud.
- (2) *Neritina navigatoria* Reeve. Nouvelle-Calédonie.
- (2) *Neritina reclivata* Say. Golfe du Mexique (PETIT DE
 LA SAUSSAYE).
- (2) *Neritina tristis* d'Orbigny. Cuba.
- (2) *Neritina nilotica* Reeve. Lac Mariout, Égypte (A. LE-
 TOURNEUX).
- (3) *Neritina fluviatilis* Linné. Nantes, Poitiers, Fontenay-
 le-Comte (T. LETOURNEUX); Algérie (A. LETOUR-
 NEUX).
- (3) *Neritina littoralis* Linné. Danemark (BOURGUIGNAT).
 [Syn. *N. fluviatilis* Lin. var. *littoralis* Lin.]
- (3) *Neritina thermalis* Boubée. Bagnères-de-Bigorre (DU-
 PUY); Salat (FAGOT).
 [Syn. *N. fluviatilis* Lin. var. *thermalis* Boub.]
- (3) *Neritina dalmatina* Ziegler. Krka, Dalmatie.
 [Syn. *N. fluviatilis* Lin. var. *dalmatina* Zglr.]
- (3) *Neritina zebrina* Recluz. Lamalou, Hérault (M^{me} HER-
 MITE, A. LETOURNEUX).
 [Syn. *N. fluviatilis* Lin. var. *zebrina* Relz.]
- (3) *Neritina fontinalis* Brard. La Baïse (DUPUY).
 [Syn. *N. fluviatilis* Lin. var. *fontinalis* Brard.]
- (3) *Neritina fluviatilis* Lin. var. . . . Danemark.
- (3) *Neritina baltica* Lamarck. Suède (MÖRCH).

- (3) *Neritina intertexta* Villa. Italie, lac de Côme (FAGOT) ;
lac de Garde (DUPUY).
[Syn. *N. fluviatilis* Lin. var. *rhodoscalpe* Jan.]
- (3) *Neritina numidica* Recluz. Algérie (A. LETOURNEUX).
- (3) *Neritina bæotica* Lamarck. Sicile (FAGOT).
- (3) *Neritina Prevostiana* Partsch. Lamalou, Hérault (A. LETOURNEUX) ; Parlerme, Sicile (CAILLIAUD).
- (3) *Neritina bahusiensis* Dupuy. Le Bahus, Landes (DUPUY).
- (3) *Neritina corcyrensis* A. Letourneux. Corfou (A. LETOURNEUX).
[Syn. *Theodoxia corcyrensis* A. Letourn.]
- (3) *Neritina meridionalis* Philibert. Phléoude.
- (3) *Neritina peloponnensis* Recluz. Chalcis, Eubée (M^{me} HERMITE).
- (3) *Neritina Diocleziana* Küster. Le Jadro, près Salona (localité classique) (A. LETOURNEUX).
- (3) *Neritina nigrina*. Kobelt. Croatie (LECOMTE).
- (3) *Neritina Kustigi* Kobelt. Agram (A. LETOURNEUX).
- (3) *Neritina Michoniana* Bourguignat. Syrie (GAILLARDOT).
- (3) *Neritina Saulcyi* Bourguignat. Saida (M^{me} HERMITE).
- (3) *Neritina viridis* Linné. Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. *Smaragdia viridis* Lin.]
- (3) *Neritina Jordani* Butler. Lac de Tibériade (M^{me} HERMITE) ; le Jourdain (BOURGUIGNAT).
- (3) *Neritina serratilineata* Ziegler, Véronais (STABILE).
[Syn. *N. danubialis* Zglr. var. *serratilineata* Zglr.]
- (3) *Neritina carinata* Kok. Croatie (LECOMTE).
[Syn. *N. danubialis* Zglr. var. *carinata* Kok.]
- (3) *Neritina pupa* Linné. La Guadeloupe (POUPILLIER).
Neritina venosa Menke. Cuba (PETIT DE LA SAUSSAYE).
- (3) *Neritina virginea* Lamarck. La Jamaïque (LESOURD).
- (3) *Neritina tessellata* Gmelin. Tahiti (M^{me} HERMITE).
- (3) *Neritina cornucopiæ* Benson. Banka (MOUSSON) ; Cochinchine (VECCO).
- (4) *Neritina Schlaffi* Mousson. Europe.
[Syn. *N. crepidularia* Lmck. var. *Schlaffi* Mss.]

- (5) *Neritina antiquata* Kutsch. Dalmatie (LECOMTE).
- (5) *Neritina latissima* Broderip. Colombie.
- (5) *Neritina granosa* Sowerby. Iles Sandwich.
- (6) *Neritina Lamarcki* Deshayes. Polynésie.
- (6) *Neritina squamospina* Mousson. Sumatra (MOUSSON).
- (7) *Neritina nucleola* Morelet. [Gassies, p. 106, pl. VIII, fig. 8-9]. Nouvelle-Calédonie (M^{me} HERMITE).
- (7) *Neritina aspersa* Recluz. [Gassies, p. 109, pl. VIII, fig. 6]. Nouvelle-Calédonie.
- (7) *Neritina corona* Lamarck. Indes.
- (7) *Neritina undata* Deshayes. Tahiti (PETIT, JOBA).
- (7) *Neritina méleagris* Lamarck Saint-Domingue [ex. Lamarck).
- (7) *Neritina Grateloupeana* Gassies.
Neritina sp. Nouvelle-Calédonie.

Genre **Smaragdinella** H. A. Adams.

[Syn. : *Linteria* A. Ad., *Glaucionella* Gray, *Thecaphorus* Nutt.].

SECTIONS

- (1) *Smaragdinella* H. A. Ad. (2) *Nona* H. A. Ad.
- (1) *Smaragdinella viridis* Rang ; Chenu, p. 391, fig. 2.968-2.969 ; la Réunion (EUDEL).

III. Ordre des Pulmonés

FAMILLE DES SIPHONARIIDÆ

Genre **Siphonaria** Sowerby 1824

- Siphonaria kurracheensis* Reeve, Suez (A. LETOURNEUX).
- Siphonaria diemenensis* Quoy, Chine boréale (VESCO).
- Siphonaria caracteristica* Reeve, Panama (PETIT DE LA SAUSSAYE).
- Siphonaria viridis* Quoy Sénégal (CAILLIAUD).

Siphonaria algesiræ Quoy, Algérie (A. LETOURNEUX).

[Syn. *S. striata-punctata* Wkff.]

Siphonaria Lessoni Blainville, Chili (LEPELTIER).

FAMILLE DES LIMNÆIDÆ

I. — SUBFAMILLE DES LIMNÆINÆ

Genre **Limnæa** Lamarck.

[Syn. *Lymnæus* Drap. ; *Limnus* Mft. ; *Limnea* Brug.]

SECTIONS

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| (1) <i>Limnæa</i> Lamarck. | (4) <i>Limnophysa</i> Fitzgr. |
| (2) <i>Neristoma</i> Klein. | Syn. <i>Stagnicola</i> Leach. |
| Syn. <i>Radix</i> Mft. | — <i>Galba</i> Schrnk. |
| — <i>Gulnaria</i> Leach. | (5) <i>Omphiscola</i> Rfq. |
| (3) <i>Bulimnea</i> Hldm. | Syn. <i>Leptolimnea</i> Sw. |
| . | (6) <i>Acella</i> Hldm. |

(1) *Limnæa stagnalis* Linné. Dalmatie.

(1) *Limnæa turgida* Hartmann. Fontenay-le-Comte (T. LETOURNEUX).

(1) *Limnæa raphidia* Bourguignat. Le Danube à Ibraïla (A. LETOURNEUX).
[Syn. *L. stagnalis* Lin. var. *raphidia* Brgt.]

III. — SUBFAMILLE DES PLANORBIINÆ

Genre **Planorbis** Guettard.

SECTIONS

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| (1) <i>Planorbis</i> Guett. | (6) <i>Anisus</i> Fitzgr. |
| (2) <i>Planorbella</i> Hldm. | Syn. <i>Tropidiscus</i> Stein. |
| (3) <i>Helisoma</i> Sw. | (7) <i>Spirorbis</i> Sw. |
| (4) <i>Taphius</i> H. et A. Ad. | (8) <i>Nautilina</i> Stein. |
| (5) <i>Menetus</i> H et A. Ad. | Syn. <i>Gyraulus</i> Agas. |

(1) *Planorbis corneus* Linné. [Dupuy, p. 132, pl. XXI, fig. 6]. Vendée (T. LETOURNEUX).

Planorbis. Sp. Marais de la Drave à Essey.

CLASSE DES PÉLÉCYPODES

FAMILLE DES CYRENIDÆ

Genre **Corbicula** Megerle.

Corbicula cor Lamarek, vi, 274, Égypte (A. LETOURNEUX, J. DE L'HOTELLERIE).

[Syn. *Cyrena consobrina*, Caill. ; *Tellina fluminalis* Dillw., Chenu, p. 103, fig. 467-469.]

Corbicula fluminea Müller. (Lmck. vi, 274), Canton.

Corbicula, Sp. Pondichéry.

Genre **Sphærium** Scopoli.

[Syn. *Cyclas* Brug. ; *Nux* Humph. ; *Cornea* Mhlfd. ; *Amesoda* Rfq ; *Sphæriastrum* Brgt. ; *Cyrenastrum* Brgt. ; *Corneocyclas* Fér.]

Sphærium corneum Linné. [Dupuy, p. 667, pl. xxix, fig. 4.] Fontenay, Nantes (T. LETOURNEUX).

[Syn. *Tellina cornea* Lin. ; *Cyclas rivalis* Drap. ; *C. cornea* Lmck.]

Sphærium rivicola Leach. [Dupuy, p. 665, pl. xxix, fig. 3]. Nantes (T. LETOURNEUX). Moselle (JOBA).

Var..... Belgique (LECOMTE).

Sphærium Letourneuxi Bourguignat, fort de Giurgivo (A. LETOURNEUX).

Sphærium stramineum Conrad. Miami canal, Ohio (FAGOT).

Sphærium nucleum Studer. [Dupuy, p. 668, pl. xxix, fig. 4 bis.] Montpellier (PALADILHE) ; Belgique (LECOMTE).

[Syn. *S. corneum* Lin. var. *nucleus* Stud.]

Sphærium ovale Férussac. Égypte (A. LETOURNEUX).

[Syn. *Cyclas lacustris* Drap. var. *ovalis* Moq.-Td.]

Sphærium transversum Say. Miami Canal, Ohio (FAGOT).

Genre **Calyculina** Clessin.

Calyculina lacustris Müller. [Dupuy, p. 672, pl. xxiv, fig. 8.] Fontenay, Lusignan (T. LETOURNEUX) ; Genève (DUMONT).

[Syn. *Sphærium lacustre* Müll.]

Calyculina Rykholti Normand. Fontenay (T. LETOURNEUX) [Dupuy, p. 675, pl. xxix, fig. 10].

[Syn. *Sphærium Rykholti* Norm.]

Calyculina Terveriana Dupuy. [Dupuy, p. 674, pl. xxix, fig. 9.] Seine-et-Oise (PALADILHE).

[Syn. *Sphærium Terverianum* Brgt. ; *Cyclas Terveriana* Dup.]

Calyculina Ddingoli Bivona. [Bourg. Mal. Alg., pl. xvii, fig. 1-9.] Alger (A. LETOURNEUX).

[Syn. *Sphærium Ddingoli* Biv. ; *S. Raymondi* Brgt.]

Genre **Pisidium** Pfeiffer.

[Syn. *Pera* Leach ; *Musculum* Link ; *Pisum* Mhlfd. ; *Galileja* Costa ; *Euglesia* Leach ; *Eupera* Brgt. ; *Cordula* Leach]

Pisidium pusillum Gmelin. Fontenay-le-Comte (T. LETOURNEUX) ; Égypte (A. LETOURNEUX).

[Syn. *P. fontinale* Pfr.]

Pisidium nitidum Jenyns. Fontenay-le-Comte (T. LETOURNEUX) ; Montpellier (PALADILHE).

Pisidium casertanum Poli. Agen (GASSIES) ; Algérie (A. LETOURNEUX).

Pisidium thermale Dupuy. [Dupuy, p. 682, pl. xxx, fig. 6.] Cauterets (T. LETOURNEUX).

[Syn. *P. casertanum* Poli. var. *thermale* Moq.-Td.]

Pisidium pulchellum Jenyns. Aïn-Sefra, Tlemcen (A. LETOURNEUX).

[Syn. *P. casertanum* Poli. var. *pulchellum* Moq.-Td.]

Pisidium Gassiesianum Dupuy. [Dupuy, p. 685, pl. xxx, fig. 7]. Bordeaux (GASSIES) ; Oise (PALADILHE).

Pisidium lumsterianum. Forbes. Mostaganem, Algérie (A. LETOURNEUX).

Pisidium amnicum, Müller. Fontenay-le-Comte, Nantes (T. LETOURNEUX).

[Syn. *Cyclas palustris* Drap.]

Pisidium Henslowianum Jenyns. Agen (GASSIES).

[Syn. *Pera Henslowiana* Leach ; *Cyclas appendiculata* Leach.]

Var. *inappendiculata* Jenyns. Barbotan. (DUPUY).

Pisidium Dupuyanum Normand. Valenciennes (DUPUY)
Basses-Pyrénées (BERILLON).

[Syn. *P. Henslowanum* Moq.-Td. var. *dupuyanum*
Moq.-Td.]

Pisidium Jaudouinianum Gassies. Agen (GASSIES).

Syn. *P. Henslowanum* Moq.-Td. var. *Jaudouinia-*
num Moq.-Td.]

Pisidium Heldreichi Clessin. Eubée.

Pisidium abditum Haldman. Miami canal, Ohio (FAGOT).

Genre **Galatea** Bruguière

[Syn. *Egeria* F. de Roissy ; *Megadesma* Bowdich ;
Potamophila Sowerby.]

Galatea radiata Lamarck VI. 285, Encycl. pl. 250
fig. 1. Chenu, p. 75, fig. 327-328, Fleuves de Guinée.

FAMILLE DES UNIONIDÆ

I. — SUBFAMILLE DES UNIONINÆ

Genre **Unio** Retzius.

[Syn. *Elliptio* Rfq. ; *Eurynea* Rfq. ; *Mysca* Turt. ;
Margaron Lea ; *Mya* Humph. ; *Lymnium* Oken ;
Luticola Goldfs. ; *Cunicula* Sw. ; *Legumia* Sw.]

SECTIONS

- | | |
|--|--|
| (1) <i>Unio</i> Retz. | (8) <i>Canthyria</i> Sw. |
| (2) <i>Bariosta</i> Rfq.
Syn. <i>Potamida</i> Sw. | (9) <i>Iridea</i> Sw.
Syn. <i>Tritogenia</i> Agas.
— <i>Orthonymus</i> Agas. |
| (3) <i>Naidea</i> Sw. | (10) <i>Rotundaria</i> Rfq.
Syn. <i>Cyprogenia</i> Agas. |
| (4) <i>Niaea</i> Sw. | (11) <i>Quadrula</i> Rfq.
Syn. <i>Theliderma</i> Sw. |
| (5) <i>Hyridella</i> Sw.
Syn. <i>Micromya</i> Agas. | (12) <i>Diplodon</i> Spix.
Syn. <i>Cucumaria</i> Conr.
— <i>Naja</i> Sw. |
| (6) <i>Obovaria</i> Rfq.
Syn. <i>Rhipidodonta</i> Mörch. | (13) <i>Dysonomia</i> Agas. |
| (7) <i>Lampsilis</i> Rfq.
Syn. <i>Truncilla</i> Rfq.
— <i>Pleurobema</i> Rfq.
— <i>Syntoxia</i> Rfq.
— <i>Scalenaria</i> Rfq.
— <i>Plagiola</i> Rfq.
— <i>Crenodonta</i> Schlütr.
— <i>Æglia</i> Sow. | (14) <i>Metaptera</i> Rfq.
Syn. <i>Proptera</i> Rfq.
— <i>Limnadia</i> Sw.
— <i>Megadomus</i> Sw. |

- (1) *Unio pictorum* Linné [Dupuy, p. 647, pl. xxvi, fig. 20]
Nantes (T. LETOURNEUX) ; Moselle (M^{me} HERMITE) ;
Belgique (LECOMTE).
- (1) *Unio rostratus* Lamarck. La Saône à Mâcon (DUPUY).
[Syn. *U. pictorum* Lin. var. *rostrata* Lmck.]
- (1) *Unio longirostris* Ziegler.
- (1) *Unio Moreleti* Deshayes [Bourg. Mal. Alg., II, p. 294,
pl. xxi, fig. 1-7]. Algérie (A. LETOURNEUX).
- (1) *Unio bayonnensis* De Folin et Bérillon. Lac de la
Négresse à Biarritz (BÉRILLON).
- (1) *Unio crassus* Philippsen. [Bourg., Mal. Alg., II, p. 295,
pl. xxii, fig. 1-5.] Algérie (A. LETOURNEUX).
- (1) *Unio corrosus* Villa. Lac d'Isseo, Lombardie (STABILE).
- (1) *Unio Baudonianus* De Folin et Bérillon. Lac de Garros
à Ondres (BÉRILLON).
[Syn. *U. Baudoni* De Fol. et Bér. ; *U. Lambottei*
Malzine.]
- (1) *Unio Moquinianus* Dupuy. Gers (PALADILHE).
Var..... Le Bahus (Landes) [Dup., p. 644,
pl. xxxvi, fig. 18.] (DUPUY).
- (1) *Unio Danieli* Gassies. Canal de Mimizan (Landes)
(BÉRILLON).
- (1) *Unio Jacquemini* Dupuy. [Dupuy, Hist. Moll., p. 643,
pl. xxv, fig. 17.] Arles (DUPUY).
- (1) *Unio Requieri* Michaud. [Michaud, compl. Hist. Moll.,
p. 106, pl. xvi, fig. 24.] Le Gers (GASSIES).
- (1) *Unio Rousi* Dupuy. [Dupuy, p. 653, pl. xxviii, fig. 18.]
Savoie (DUMONT).
- (1) *Unio Aleroni* Companyo et Massot. Perpignan (DUPUY).
- (1) *Unio Turtoni* Payraudeau (DUPUY).
- (1) *Unio tumidus* Retzius. Nantes (A. LETOURNEUX) ;
Étangs de la Moselle (M^{me} HERMITE) ; Metz (DUPUY) ;
Belgique (LECOMTE).
- (1) *Unio tigridis* Bourguignat. Bagdad (MOUSSON).
- (1) *Unio terminalis* Bourguignat. Syrie (A. LETOURNEUX).
- (1) *Unio dilatatus* Rafinesque. Ohio (DUPUY).
[Syn. *U. gibbosus* Born..]

- (1) *Unio ater* Nilsson. [Dupuy, Hist. Moll., p. 654, pl. xxviii fig. 19.] Vosges (DUMONT).
- (1) *Unio Durieui* Deshayes. [Bourg., Mal. Alg., p. 188, pl. xix, fig. 4-8.] Algérie (A. LETOURNEUX).
- (1) *Unio Letourneuxi* Bourguignat. [Bourg. Mal. Alg., II, p. 289, pl. xvii, fig. 47-50.] Algérie (A. LETOURNEUX).
- (1) *Unio Valentinus* Rossmässler. Étang d'Albufera, Espagne (BOURGUIGNAT).
- (1) *Unio capigliolo* Payraudeau. L'Arros (DUPUY).
Unio soleniformis Lea. Corrientes (JOBA).
- (1) *Unio Astierianus* Dupuy. [Dupuy, Cat. extramar. test. 1849, n° 320.] Arles (DUPUY).
[Syn. *U. cuneata* Jacq. ; *U. rhomboideus* Schrött. var. *cuneatus* Moq.-Td.]
- (1) *Unio carolinensis* Bosc. États-Unis (PETIT DE LA SAUSSAYE).
- (4) *Unio rhomboideus* Schrötter. [Dupuy, Hist. Moll., p. 632, pl. xxviii, fig. 8 et pl. xxiv, fig. 5, 6, 8.] Vendée (T. LETOURNEUX) ; Gironde (GASSIES).
[Syn. *U. littoralis* Drap.]
Var. *sericea*. Le Ciron (Gironde).
- (4) *Unio bigorriensis* Millet. Vic-de-Bigorre (DUPUY).
[Syn. *U. bigerrensis* Mill. ; *U. littoralis* Drap. var. *bigerrensis* Mill.]
- (4) *Unio subtetragonus* Michaud. [Michaud, Compl. Hist. Moll., p. 111, pl. xvi, fig. 23.] (Dupuy, Hist. Moll., p. 634, pl. xxiv, fig. 7.) La Loire à Nantes (T. LETOURNEUX).
[Syn. *U. littoralis* Drap. var. *subtetragonus* Mich.]
- (4) *Unio pianensis* Farines [Dupuy, p. 635, pl. xxiv, fig. 4.] Ruisseau de Pia, Pyrénées-Orientales [PALADILHE].
[Syn. *U. littoralis* Drap. var. *pianensis* Far.]
- (4) *Unio Fellmanni* Deshayes. [Bourg. Mal. Alg., II, p. 285, pl. xviii, fig. 8.] Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *U. littoralis* Drap. var. *Fellmanni* Desh.]
- (4) *Unio mauritanicus* Bourguignat. [Bourg. Moll. nouv., 10^e Déc., p. 317, pl. xlv, fig. 1-5.] Saint-Denis-du-Sig, Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *U. littoralis* Drap. var. *mauritanicus* Brgt.]

- (4) *Unio subreniformis* Bourguignat. Étang de Bagnolas, Catalogne (BOURGUIGNAT).
[Syn. *U. littoralis* Drap. var. *subreniformis* Brgt.]
- (4) *Unio sinuatus* Lamarek. [Dupuy, p. 630, pl. xxiii, fig. 7.] France (DUPUY).
- (4) *Unio Maccarthyanus* Bourguignat. [Bourg. Moll. nouv., 7^e Déc., n° 70, pl. xxxiv, fig. 8-11.] O. Rouca, Algérie (A. LETOURNEUX, BOURGUIGNAT).
- (4) *Unio Rothi* Bourguignat. Lac de Tibériade (BOURGUIGNAT).
- (4) *Unio PENCHINATIANUS* Bourguignat. Etang de Bagnolas, Catalogne (BOURGUIGNAT).
- (4) *Unio complanatus* Solander. Erié Canal, Ohio (DUPUY).
- (4) *Unio purpureus* Say. États-Unis.
[Syn. *U. purpurascens* Lmck.; *U. complanatus* Sol.]
- (4) *Unio Sayi* Tappan. Miami Canal, Ohio (DUPUY).
- (4) *Unio euphraticus*. Westerlund. Euphrate (MOUSSON).
- (4) *Unio montanus* Philibert. Valdivivia (LEPELTIER).
- (5) *Unio batavus* Maton et Racket. [Dupuy, Hist. Moll., pl. xxv, fig. 14, 15.] Ferney (DUMONT); Moselle (M^{me} HERMITE).
[Syn. *U. batavus* Lmck.]
- (5) *Unio mancus* Lamarek. Lac d'Annecy (DUMONT).
[Syn. *U. batavus* Lmck. var. *mancus* Lmck.]
- (5) *Unio nanus* Dupuy. Bonneville (DUMONT).
[Syn. *U. batavus* Lmck. var. *nanus* Lmck.]
- (5) *Unio ovalis* Gray. [Dupuy, p. 637, pl. xv, fig. 13]. Nantes (T. LETOURNEUX).
Syn. *U. batavus* Mat. et Rack. var. *ovalis* Moq.-Td].
- (5) *Unio ovatus* Lamarek.
- (5) *Unio niloticus* Cailliaud (Chenu, p. 140, fig. 682). Égypte (CAILLIAUD).
- (5) *Unio parvus* Barnes. Miami Canal, Ohio (DUPUY, FAÛOT).
- (5) *Unio production* Mousson. Calcutta (EUEDEL).
- (5) *Unio multiradiatus* Lea. Withe River. États-Unis (DUPUY).

- (5) *Unio luteolus* Lamarck. Ohio (DUPUY).
- (5) *Unio contradeus* Lea, Java (Mousson).
[Syn. *U. javanus* Lea; *U. javanus*, H. et A. Ad ;
U. juvanus, Sow.]
- (6) *Unio coccineus* Lea. Withe River, Indiana (DUPUY).
- (6) *Unio circulus* Lea. Lac Érié (DUPUY).
[Syn. *U. subrotundus* Rfq. var. *circulus* Lea.]
- (6) *Unio retusus* Lamarck. Ohio (DUPUY).
- (7) *Unio nervosus* Rafinesque. Ohio (DUPUY).
[Syn. *U. donaciformis* Lea.]
Var..... Ohio (DUPUY).
- (7) *Unio elegans* Lamarck. Duke River, États-Unis (DUPUY).
[Syn. *U. truncatus* Rfq. var. *elegans* Lmck.]
- (7) *Unio obliquus* Lamarck. Cumberland River, Ohio (DUPUY).
- (7) *Unio plenus* Lea. Ohio (DUPUY).
- (7) *Unio pyramidatus* Lea. Ohio River, Cincinnati (DUPUY).
[Syn. *U. mytiloides* Rfq. var. *pyramidatus* Lea.]
- (7) *Unio rotundatus* Lamarck. (Lamarck, VI, 538). Rio-de-la-Plata.
- (7) *Unio rubiginosus* Lea. Withe River, États-Unis (DUPUY).
[Syn. *U. flavus* Rfq. var. *rubiginosus* Lea.]
- (7) *Unio solidus* Lea. Cumberland River, Ohio (DUPUY).
- (7) *Unio trigonus* Lea. Ohio (PETIT DE LA SAUSSAYE).
- (7) *Unio ligamentinus* Lamarck. Cumberland River, États-Unis (DUPUY).
- (7) *Unio anodontoides* Lea. Ohio (DUPUY).
- (7) *Unio distans* Ant. Plat Roch River, Indiana (DUPUY).
- (10) *Unio subrotundatus* Lea. Ohio (DUPUY).
- (10) *Unio securis* Lea. Cumberland River, Ohio.
- (10) *Unio dromas* Lea. Ohio (DUPUY).
- (10) *Unio Cooperianus* Lea. Ohio (DUPUY).
- (10) *Unio irroratus* Lea. Cumberland River, Ohio (DUPUY).
[Syn. *U. stegarius* Rfq. var. *irroratus* Lea.]

- (10) *Unio tuberculatus* Rafinesque. Cumberland River, Ohio (DUPUY).
[Syn. *U. verrucosus* Barn.]
- (10) *Unio cornutus* Barnes. Cumberland River, Ohio (DUPUY).
- (11) *Unio quadrulus* Rafinesque. Miami Canal, Ohio (DUPUY).
[Syn. *U. asperrimus* Lea.]
- (11) *Unio pustulatus* Lea. Cumberland River, Ohio (DUPUY).
[Syn. *U. nodulatus* Rfq. var. *pustulatus* Lea.]
- (12) *Unio ellipticus* Wagner. Brésil (JOBA).
[Syn. *U. ellipticus* Wagner.]
- (12) *Unio depressus* Lamarck. Chili (JOBA).
- (13) *Unio costatus* Rafinesque. Ohio (DUPUY).
[Syn. *U. undulatus* Born.]
- (14) *Unio delphinus* Gruner (Chenu, p. 143, fig. 707). Lacs américains.

Genre **Margaritana** Schümacher.

[Syn. *Baphia* Meusch.; *Damalis* Leach; *Hemilastena* Rfq.; *Pseudodon* Gld.]

SECTIONS

- (1) *Margaritana* Schmch. (4) *Calceola* Sw.
[Syn. *Triopsis* Sw.]
- (2) *Alasmodonta* Say.
- (3) *Complanaria* Sw.
- (1) *Margaritana margaritifera* Linné. [Dupuy, Hist. Moll., pl. xxii, fig. 14-16.] Auvergne (A. LETOURNEUX).
[Syn. *Unio margaritifera* Cuv.; *U. margaritifera* Rossm.]
- (1) *Margaritana Michonii* Bourguignat. Lac de Tibériade (BOURGUIGNAT).
[Syn. *Unio Michonianus* Brgt.]
- (3) *Margaritana rugosa* Barnes. Ohio (DUPUY).

Genre **Microcondylæa** Westerlund.

Microcondylæa Saulcyi Bourguignat. Lac de Tibériade (A. LETOURNEUX).
[Syn. *Unio Saulcyi* Brgt.]

Genre **Anodonta** Cuvier.

[Syn. *Limnæoderma* Poli; *Hemiodon* Sw.; *Pseudodon* Gld.; *Anodon* Oken; *Limnæa* Poli; *Strophitus* Rfq.; *Lastena* Rfq.; *Limella* Rfq.; *Anodontina* Schültr.; *Craspedodonta* Küst; *Glochidium* Rathke.]

SECTIONS

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| (1) <i>Anodonta</i> Cuv. | (4) <i>Patularia</i> Sw. |
| (2) <i>Symphynota</i> Lea. | Syn. <i>Glabaris</i> Gray. |
| (3) <i>Lamproscapha</i> Sw. | (5) <i>Pseudanodonta</i> Brgt. |

(1) *Anodonta cygnæa* Rossmässler. [Dupuy, p. 601, pl. xv, fig. 14.] Varemme, Belgique (LECOMTE).

(1) *Anodonta arenaria* Bourguignat. [Dupuy, p. 603, pl. xvi, fig. 14.]]Bourg. Mal. Bret., p. 78.] Vendée (T. LETOURNEUX).

(1) *Anodonta oblonga* Millet. [Dupuy, p. 615, pl. xviii, fig. 13.] Vendée (T. LETOURNEUX).

(1) *Anodonta cellensis* Schrötter (DUPUY).
Var..... Pyrénées-Orientales (DUPUY).

(1) *Anodonta Rossmässleriana* Dupuy. [Dupuy. Ess. Mol. Gers, p. 74.] Le Gers (DUPUY).
[Syn. *A. cellensis* Schröt. var. *Rossmässleriana* Dup.]

(1) *Anodonta subponderosa* Dupuy. [Dupuy, Hist. Moll., p. 607, pl. xvii, fig. 14.] Monferran, dans les mares (Gers) (DUPUY).
[Syn. *A. cellensis* Schröt. var. *subponderosa* Dup.]

(1) *Anodonta Dupuyi* Ray et Drouet., var. *minor*. [Ray et Drouet, Rev. Mag. Zool., p. 32, pl. i et ii.] Jura (PALADILHE).
[Syn. *A. cellensis* Schröt. var. *Dupuyi* Ray et Drouet.]

(1) *Anodonta avonensis* Montagu. L'Autise, Vendée (T. LETOURNEUX).

(1) *Anodonta piscinalis* Nilsson. Vendée (T. LETOURNEUX); Algérie (A. LETOURNEUX).

(1) *Anodonta minima* Millet. [Dupuy, p. 610, pl. xx, fig. 20.] Vendée (T. LETOURNEUX).

(1) *Anodonta anatina* Linné. [Dupuy, p. 610, pl. xix, fig. 13] France.

- (1) *Anodonta Lucasi* Morelet. [Bourg. Mal. Alg., II, p. 296, pl. xxvii, fig. 1-4 et pl. xxiv, fig. 1.] Algérie (A. LETOURNEUX),
- (1) *Anodonta embia* Bourguignat. [Bourg. Mal. Alg., p. 298, pl. xxv, fig. 1-4.] Algérie (A. LETOURNEUX).
- (1) *Anodonta numidica* Bourguignat? [Bourg. Mal. Alg., p. 208, pl. xxiv, fig. 2-6.] Alger (A. LETOURNEUX).
- (1) *Anodonta Letourneuxi* Bourguignat. [Bourg. Mal. Alg., p. 299, pl. xxvi, fig. 2-6.] Algérie (A. LETOURNEUX).
- (1) *Anodonta rostrata* Kobelt [in Rossm.] Carinthie (DUPUY).
- (1) *Anodonta melinia* Bourguignat. Étang d'Albufera, Valence, Espagne (BOURGUIGNAT).
- (1) *Anodonta Lewisi* Lea. Erié Canal, États-Unis (DUPUY).
- (2) *Anodonta decora* Lea. Little Miami, Ohio (DUPUY).
- (2) *Anodonta salmonia* Lea. Plat Roch River, Indiana (DUPUY).
- (5) *Anodonta Rayi* Dupuy. [Dupuy, p. 614, pl. xx, fig. 22.] Denain (PALADILHE).
- (5) *Anodonta complanata* Ziegler. Vendée (T. LETOURNEUX) Belgique (LECOMTE).
- (5) *Anodonta Grateloupiana* Gassies. [Gassies, Moll., Agenais, p. 193, pl. II, fig. 13-16 et pl. III, fig. 1-3). [Dupuy, p. 618, pl. xvii, fig. 12. Agenais (GASSIES). [Syn. *A. Gratelupeana* Gassies ; *A. complanata* var. *gratelupeana* Moq.-Td.]

FAMILLE DES ÆTHERIDÆ

Genre **Ætheria** Lamarek.

Ætheria Cailliaudi Ferussac [Lmk, VI, 596]. Le Haut-Nil (CAILLIAUD).

FAMILLE DES MUTELIDÆ

[Syn. *Iridinæ*]

Genre **Mutela** Scopoli.

[Syn. *Scapha* Humph. ; *Anodontites* Brug. ; *Berpolis* Leach ; *Euphira* Gistl. ; *Platiris* Lea.]

SECTIONS

(1) *Mutela* Scop.

2 *Mutelina* Brgt.

(1) *Mutela nilotica* Férussac. [Chenu, p. 148, fig. 727.]
Égypte (A. LETOURNEUX).

Mutela Letourneuxi Bourguignat. Égypte (A. LETOURNEUX).

Mutela. sp. Égypte.

(2) *Mutela rostrata* Rang. Sénégal (JOBA).
[Syn. *Iridina rostrata* Rang.]

Genre **Pliodon** Conrad.

[Syn. *Cameronia* Brgt.]

Pliodon ovatus Swainson. [Chenu, p. 148, fig. 728.]
Amérique.

Genre **Spatha** Lea.

Spatha rubens Lea. [Chenu, p. 148, fig. 729.] Égypte
(A. LETOURNEUX).

Spatha Lepsii Jick. Égypte (A. LETOURNEUX).

Spatha. Sp.!!! Senhara, Algérie (A. LETOURNEUX).

Spatha. Sp.!!! Senhara, Algérie (A. LETOURNEUX).

Genre **Hyria** Lamarck.

[Syn. *Triquetra* Klein ; *Prisodon* Schmch ; *Paxyodon*
Schmch. ; *Hyriopsis* Conr. ; *Triplodon* Spix ; *Arco-*
nalina Conr.]

Hyria corrugata Lamarck. [Lamarck, VI, p. 562.]
[Encycl., p. 247, fig. 2.] Amérique du Sud.
[Syn. *H. rugosa* Spix.]

Hyria avicularis Lamarck [Lamarck, VI, p. 561.]
[Chenu, p. 149, fig. 731, 732, 734.] Amérique du
Sud.

Genre **Castalia** Lamarck.

[Syn. *Tetraplodon* Spix.]

Castalia ambigua Lamarck. [Chenu, p. 149, fig. 735.]
Pérou, Chili.

FAMILLE DES DRESSSENSIDÆ

Genre **Dreissensia** Van Beneden.

[Syn. *Dreyssena* V. Beneden. *Mytilina* Cantr.; *Coelognia* Bronn.; *Dithalamia* Say.; *Enocephalus* Münst.; *Congerina* Prtsch.; *Mytilomia* Catnr.; *Myoconcha* d'Orb.; *Tichogonia* Rm.]

SECTIONS

(1) *Dreyssena* Van Ben. (2) *Praxis* H. et A. Ad.

Dreissensia polymorpha Van Beneden. Nantes (T. LE-TOURNEUX).

Dreissensia africana Van Beneden. Gabon.

Dreissensia. sp. Gabon.

Genre **Septifer** Recluz.

[Syn. *Septiger* Mörch.]

Septifer Kraussi Küster. La Réunion (EUDEL)

[Syn. *Dreyssena Kraussi* Küst.]


Septifer granulatus Hanley. Magellan.

[Syn. *Mytilus granulatus* Hanl.]

Genre **Prasina** Deshayes.

[Syn. *Julia* Gld.]

Prasina borbonica Deshayes. La Réunion (EUDEL).



DEUXIÈME PARTIE

MOLLUSQUES MARINS

CLASSE DES CÉPHALOPODES

FAMILLE DES ARGONAUTIDÆ

Genre **Argonauta** Linné

Argonauta argo Linné, Méditerranée.

FAMILLE DES SPIRULIDÆ

Genre **Spirula** Lamarck

Spirula Peroni Lamarck, Algérie (Weinkauff).

FAMILLE DES NAUTILIDÆ

Genre **Nautilus** Linné

Nautilus Pompilius Linné, Indes Orientales.

CLASSE DES PTÉROPODES

FAMILLE DES HYALIDÆ

Genre **Hyalæa** Lamarck

[Syn. *Cavolinia* Giœni, *Caulina* Poli, *Tricla* Retz, *Rheda* Humph, *Hyalus* Torpe, *Archonta* Mft., *Glandiolus* Mft.]

Hyalæa angulata Souleyet, Océan Indien (EUDEL).

Hyalæa uncinata Rang, Océan Atlantique (EUDEL).

Hyalæa longirostris Lesueur, Océan Atlantique (EUDEL).
[Syn. *Hyalæa ecaudata* Lesueur].

Hyalæa curtita Lesueur, Alger (JOLY).

Hyalæa quadridentata Lesueur, Océan Atlantique.

Hyalæa quadridentata Lesueur, var. *minor.*, Océan Atlantique (EUDEL).

Hyalæa globulosa Rang, Océan Indien (EUDEL).

Hyalæa gibbosa Rang, Océan Indien (EUDEL).
[Syn. *Hyalæa flava* d'Orb.].

Hyalæa tridentata Forsk, Alger (EUDEL).

[Syn. *Hyalæa affinis* d'Orb., *Hyalæa chemnitziana* Lesueur, *Hyalæa cornea* Lmck., *Hyalæa Cumingi* Sow., *Hyalæa Forskali* Blvll., *Hyalæa natans* Alb., *Hyalæa Peroni* Blv., *Hyalæa telemus*, *Hyalæa teniobranchia* Per.].

Hyalæa tridentata Forsk. Océan Atlantique (EUDEL).

Hyalæa labiata d'Orb., Océan Indien.

Genre **Diacria** Gray

Diacria trispinosa Lesueur, Océan Indien (EUDEL).

[Syn.: *Hyalæa trispinosa* Les, *Diacria triacanta* Guid.,
Hyalæa depressa Biv.].

Diacria depressa d'Orbigny, var. *inflexa* Lesueur, Océan Atlantique (EUDEL).

Genre **Cleodora** Peron

[Syn. : *Clio* Brown, *Pleuropus* Eschrecht, *Vaginella* Daud.].

Cleodora cuspidata Bosc., Océan Indien (EUDEL).

[Syn. : *Cleodora quadrispinosa* Rang.].

Cleodora pyramidata Brown., Océan Atlantique (EUDEL).

[Syn. : *Cleodora Browni* Blvll., *Cleodora lanceolata* Lesueur, *Cleodora retusa* Gmelin].

Genre **Creseis** Rang

[Syn. : *Styliola* Lesueur, *Crisia* Mke].

Creseis acicula Rang, Océan Atlantique (EUDEL).

Creseis striata Rang, Océan Indien (EUDEL).

Creseis subulata Quoy et G., Océan Atlantique (EUDEL).

Creseis subulata Quoy et G., Alger.

Creseis virgula Rang, Océan Indien (EUDEL).

FAMILLE DES TRIPTERIDÆ

Genre **Cuvieria** Rang

[Syn. : *Triptera* Quoy et Gaimard].

Cuvieria columnella Rang, Océan Atlantique (EUDEL).

FAMILLE DES LIMACINIDÆ

Genre **Spirialis** Eydoux et Souleyet, 1840

[Syn. : *Scæa* Philippi].

Spirialis australis Eyd. et Souleyet., Océan Indien.

Genre **Heterofusus** Fleming, 1825

Heterofusus bulimoides d'Orbigny, Océan Atlantique (EUDEL).

CLASSE DES GASTROPODES

FAMILLE DES JANTHINÆ

Genre **Janthina** Bolt

[Syn. : *Jodes* Leach, *Amethistina* Schinz, *Achates* Gistl.].

Janthina globosa Sowerby, La Tranche (Vendée) (T. LETOURNEUX).

[Syn. : *Janthina Atlantica* Mörch., *Janthina bicolor* Mke, *J. communis* Cost., *J. decollata* Crpтр., *J. elongata* Mar., *J. nana* Gray, *J. prolongata* Blvll., *J. splendens* Monters., *J. violacea* Bolt.]

Janthina orientalis Caillaud, Alger (CAILLAUD).

FAMILLE DES ATLANTIDÆ

Genre **Ladas** Cantr.

[Syn. : *Oxygyrus* Bens., *Helioplegma* d'Orb., *Brownia* d'Orb.].

Ladas Keraudreni Lesueur, Océan Atlantique et Océan Indien.

Genre **Atlanta** Lesueur

[Syn. : *Steyra* Eschh.].

Atlanta Gaudichaudi Eyd. et Souleyet, Océan Indien.

Atlanta sp., Océan Atlantique.

FAMILLE DES FIROLIDÆ

Genre **Carinaria** Lamarck

Carinaria mediterranea Deshayes, Méditerranée.

[Syn. : *C. fragilis* Bory].

FAMILLE DES MURICIDÆ

(Subfamille des Muricinæ)

Genre **Murex** Linné

[Syn. : *Arauca* Perry, *Purpura* Humph.].

SECTIONS

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| (1) <i>Murex</i> Linné. | Syn. <i>Centronotus</i> Sow. |
| (2) <i>Haustellum</i> Klein. | — <i>Cerastoma</i> Conr. |
| Syn. <i>Brontes</i> Mft. | (7) <i>Vitularia</i> Sow. |
| (3) <i>Rhinocantha</i> H. A. Ad. | (8) <i>Homalocantha</i> Mörch. |
| (4) <i>Chicoreus</i> Mft. | (9) <i>Ocinebra</i> Leach. |
| (5) <i>Pteronotus</i> Sowerby. | Syn. <i>Tritonalia</i> Flmg. |
| (6) <i>Phyllonotus</i> Sowerby. | (10) <i>Muricidea</i> Sow. |
| Syn. <i>Muricanthus</i> Sow. | (11) <i>Pseudomurex</i> Monteros. |
- (1) *Murex tribulus* Linné, Penang (Mer Rouge) (A. LETOURNEUX).
 [Syn. : *M. crassispina* Lmck, *M. rarispina* Sowerby,
 M. unidentatus Sowerby].
- (1) *Murex ternispina* Lamarck, Chine.
 [Syn. : *M. tenuirostrum* Linné, *M. tenuispina* Quoq.].
- (1) *Murex tenuispina* Lamarck, Océan Indien.
 [Syn. : *M. duplicatus* Mörch, *M. tribulus-duplicatus*
 Chem.].
- (2) *Murex corallinus* Sacchi, Alger (A. LETOURNEUX),
 Adriatique (LE COMTE).
- (2) *Murex haustellum* Linné, Océan Indien.

- (2) *Murex motacilla* Chemnitz, Océan Indien.
[Syn. *M. Cailleti* Pet.].
- (3) *Murex cornutus* Linné, Océan Indien.
- (3) *Murex brandaris* Linné, Algérie (A. LETOURNEUX).
- (4) *Murex capucinus* Lamarck, Océan Indien.
[Syn. *M. monachus* Chemnitz].
- (4) *Murex adustus* Lamarck, Océan Indien (VESCO).
[Syn. : *M. australiensis* A. Ad., *M. despectus* A. Ad.,
M. trivialis A. Ad.].
- (4) *Murex corrugatus* Sowerby, Suez (A. LETOURNEUX).
- (5) *Murex talienwahanensis* Cross. J. Conchyl., 1862, p. 56,
pl. I, fig. 9, Tchéfou (VESCO).
- (5) *Murex monachus* Cross J. Conchyl., 1862, p. 55, pl. I,
fig. 8, Tchéfou (VESCO).
- (5) *Murex pinnatus* Wood, Mers de Chine.
[Syn. : *M. fimbriatus* A. Ad., *M. martinianus* Pfr.].
- (6) *Murex melanomathos* Gmelin, Indes.
- (6) *Murex anguliferus* Lamarck, var. *erythraeus* Fischer
J. Conchyl., 1870, p. 176, Suez, (A. LETOURNEUX).
- (6) *Murex trunculus* Linné, Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *M. asperrimus* Grat.].
- (6) *Murex regius* Wood., Pérou.
[Syn. *M. tricolor* Val.].
- (6) *Murex radix* Gmelin, Mexique.
[Syn. : *M. nigritus* Meusch.].
- (6) *Murex pomum* Gmelin, Côtes du Brésil.
[Syn. : *M. asperrimus* Lmck., *M. pomiformis* Mart.].
- (6) *Murex princeps* Brod., Mer Vermeille (A. LETOURNEUX).
- (7) *Murex salebrosus* King, Amérique méridionale.
- (9) *Murex cristatus* Broch., Alger (A. LETOURNEUX),
Syrie (M^{me} HERMITE).
[Syn. : *M. cataphractus* Sow., *M. dentatus* Ant.,
M. fortis Risso, *M. rugulosus* Cost., *M. Blainvillei*
Payr.].
- (9) *Murex Edwardsi* Payr., Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *M. coralligena* Mont., *M. Lassaignei* Desh., *M.*
Lassagnii Broch., *M. nucula* Monterosato, *M. nux*
Reeve].

- (9) *Murex corallinus* Scach., Adriatique (LE COMTE).
 [Syn. : *M. aciculatus* Lmck., *M. Badius* Reeve, *M. Gyrinus* Brocchi, *M. minutus* Req., *M. Titi* Stossich].
- (9) *Murex erinaceus* Linné, Le Croisic.
 [Syn. : *M. decussatus* Gmel.].
- Murex dubius* Sowerby, Panama.
 [Syn. : *Purpura muricina* Kiener, *Murex aculeatus* Wood.].
- Murex inflatus* Lamarck, Océan Indien.
 [Syn. : *M. incarnatus* Blainv., *M. ramosus* Linn.].
- Murex* sp., Sidi Ferruch.

Genre **Typhis** Linné

- Typhis tetrapterus* Bronn, Alexandrie.
 [Syn. : *T. labiatus* Jan, *T. Sowerbyi* Brod., *T. tubifer* Cost.].

Genre **Trophon** Mft.

- Trophon clathratus* Linné, Groënland (MÖRCH).
 [Syn. : *Tr. Bamffius* Mtg., *Tr. Kroyeri* Bk., *Tr. truncatus* Gray].
- Trophon craticulatus* Fabr., Groënland (MÖRCH).
 [Syn. : *Tr. Brochii* Mrts., *Tr. mediglacialis* Wood, *Tr. squamulifer* Crpтр.].
- Trophon geversianus* Pall., Détroit de Magellan.
 [Syn. : *Fusus magellanicus* Gmelin, *Trophon calva* Kob.].
- Trophon vaginatus* Crist et Jan., Sicile (COINDE).
 [Syn. *Trophon echinatus* Kiener].
- Trophon muricatus* Montagu, Marseille.
 [Syn. : *Tr. asperrimus* Leach., *Tr. echinatus* Philippi, *Tr. variabilis* Crist., *Fusus asperrimus* Link.].

Subfam. des *Fusinæ*

Genre **Pyrula** Lamarck

SECTIONS

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (1) <i>Melongena</i> Schmch. | (2) <i>Hemifusus</i> Sow. |
| Syn. <i>Cassidulus</i> Humph. | Syn. <i>Cochlidium</i> Gray. |
| — <i>Osteodes</i> Bolt. | |

- (1) *Pyrula melongena* Linné, les Antilles.
[Syn. : *Murex squamosus* Brod.].
- (1) *Pyrula vespertilio* Lamarek, Océan Indien.
[Syn. : *Murex pugilinus* Born.].
- (1) *Pyrula paradisiaca* Martini, Suez.
[Syn. : *Pyrula nodosa* Lmck.].
- (1) *Pyrula morio* Linné, Sénégal.

Genre **Neptunea** Bolt

[Syn. : *Chrysodomus* Sow., *Tritonium* Müll.],

SECTION:

- (1) *Volutopsis* Mörch. (3) *Jumala* Friele.
(2) *Helictopsis* Dall. (4) *Mohnia* Friele.

Neptunea antiqua Linné, Côtes de Belgique (LE COMTE).

Neptunea despecta Linné, Mers du Nord (MÖRCH).

[Syn. : *N. arthritica* Val., *N. heros* Gray, *Fusus borealis* Sow., *F. bulbaceus* Bern., *F. carinatus* Penn., *F. saturus* Martyn, *F. taeniatus* Sow.]

Genre **Pisania** Bivona

[Syn. *Pusio* Gray]

Pisania pusio Linné, Méditerranée.

[Syn. : *P. articulata* Lmck., *P. fasciolaris* Lmck, *P. Gualtieri* Seach, *P. mercatoria* Dlle, *P. pennata* Chemn., *P. syracusana*, *P. variegata* Schub.].

Pisania maculosa Lamarek, Alger (A. LETOURNEUX), Syrie (M^{me} HERMITE).

[Syn. : *P. striata* Wood, *P. striatella* Bivona, *Fusus Æthiops* Philippi].

Genre **Clavella** Sowerby

[Syn. : *Clavellithes* Sow., *Cyrtulus* Hinds., *Triumphalis* Gray].

Clavella serotina Hinds, Iles Marquises (M^{me} HERMITE).

Genre **Pollia** Gray

[Syn. : *Cantharus* Bolt., *Pollania* Ms. Gray].

- (1) *Pollia* Gray. (2) *Tritonidea* Sowerby.
Syn. *Lagena* Bolt.

- (1) *Pollia scacchianum*, Philippi, Saïda (M^{me} Hermite).
[Syn. : *Pollia picta* Scach].
- (2) *Pollia coromandelianum* Lamarck, Océan Indien.
[Syn. : *Pollia Caribæorum* Lmck].
- (2) *Pollia Orbignyi* Payr, Afrique (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *P. homoleuca* Küst, *P. marminea* Risso,
P. nodulosa Bivona, *P. rustica* Lamarck, *P. Silus*
Adams, *P. strigosa* Gmel].
- (2) *Pollia Orbignyi* Payr, var. *Gaillardoti* Bast., Saïda
(M^{me} HERMITE).

Genre **Euthria** Gray

Euthria cornea Linné, Algérie.
[Syn. : *Fusus lignarius* Lmck].

Genre **Fusus** Lamarck

[Syn. : *Colus* Humph., *Fusinus* Rfq., *Syrinx* Bolt.].

SECTIONS

- (1) *Fusus* Lmck. (3) Sinistralia H. A. Ad.
- (2) Evârne H. A. Ad.
- (1) *Fusus spectrum* Ad. et Reeve, Mer Rouge.
[Syn. : *Fusus multicarinatus* Reeve, *F. reevanus*
Philippi].
- (1) *Fusus syracusanus* Linné, Alger.
- (1) *Fusus Dupetit-Thouarsi* Kiener, Californie.
[Syn. : *Fusus funiculatus* Less., *F. Petit-Thouarsi*
Val., *F. turris* Val.].
- (1) *Fusus marmoratus* Philippi, Suez (A. LETOURNEUX).
- (1) *Fusus tuberculatus* Lamarck, Océan Indien.
[Syn. : *Fusus colus* Enc., *F. maculiferus* Tapp.].
- (1) *Fusus longurio* Wkf., Palerme (J. DE L'HÔTELLERIE).
[Syn. : *Murex muricatus* Montagu].
- (1) *Fusus pulchellus* Philippi, Alger (JOLY).
[Syn. : *F. crispus* Brocchi].
- (2) *Fusus lamellosus* Crist. et J., Mers australes.

FAMILLE DES PLEUROTOMIDÆ

I. *Subfamille des Pleurotominæ*

Genre **Fleurotoma** Lamarek

[Syn. : *Turris* Humph., *Pleurotomus* Mft., *Pleurotomarius* Dum.].

SECTIONS

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) <i>Turris</i> (Mft.) Bolt. | (9) <i>Clavus</i> Mft. |
| (2) <i>Gemmula</i> Wkf. | (10) <i>Clavatula</i> Lmck. |
| (3) <i>Surcula</i> H. A. Ad. | Syn. <i>Clavicantha</i> |
| (4) <i>Genota</i> H. A. Ad. | (11) <i>Lachesis</i> . |
| (5) <i>Brachytoma</i> Sow. | Syn. <i>Anna</i> Risso, <i>Nesaea</i> Risso. |
| (6) <i>Conopleura</i> Hinds. | (12) <i>Perrona</i> Schmch. |
| (7) <i>Drillia</i> Gray. | Syn. <i>Tomella</i> Sow. |
| (8) <i>Crassispira</i> Sow. | |

- (1) *Pleurotoma tigrina* Lamarek, Océan Indien (LESOURD).
- (1) *Pleurotoma crispa* Lamarek, Océan Indien (LESOURD).
- (3) *Pleurotoma obeliscus* Reeve, Chine.
- (3) *Pleurotoma australis* Roissy, Océan Indien.
- (3) *Pleurotoma javana* Linné, Océan Indien.
[Syn. : *Pleurotoma nodifera* Lmck].
- (3) *Pleurotoma Vauquelini* Payr, p. 145, pl. VII, fig. 14 et 15, Adriatique, Dalmatie (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Daphnella unifasciata* Cost., *D. brevis* Req., *D. rigida* Reeve, *D. Rossmassleri* Ant.].
- (6) *Pleurotoma brachytoma* Philippi, Marseille.
- (7) *Pleurotoma exarata* Reeve, Groënland (MÖRCH).
- (7) *Pleurotoma flavidula* Lamarek, Mer Rouge (A. LETOURNEUX).
- (8) *Pleurotoma barclayana* A. Ad., Ile Maurice (LE SOURD).
[Syn. : *Pleurotoma strigata* Sow.].
- (11) *Pleurotoma Folinæ* Philippi Moll. Sicil. 1844, II, p. 189, t. xxvii, fig. 10. Alger (JOLY), Gaÿotville (BRONDEL).

- (11) *Pleurotoma minima* Montagu, Algérie (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *Pleurotoma Chauveti* Req., *Pl. multiplicata* Reeve, *Pl. perlatum* Req., *Pl. rubrum* Mich., *Pl. subnigris* Brown., *Pl. turritellata* Desh., *Pl. turritellidæ* Desh.].

- (11) *Pleurotoma areola* Tiber, Océan Indien.

[Syn. : *Pl. granulata* Calc.].

Pleurotoma grandis Gray, Océan Indien.

Pleurotoma undatirugis Bivona, Alger (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *Pleurotoma balteata* Bk., *Pl. tenuis* Gray, *Pl. corrugata* Kiener, *Pl. Reevei* Høernes, *Pl. gracilis* Weink.].

Pleurotoma stricta Desh., la Réunion (EUDEL).

Pleurotoma tæniata Desh., Alger (JOLY).

Pleurotoma sp., Alger.

Genre **Bela** Gray

Bela pyramidalis Ström, Groënland (MÖRCH).

II. Subfamille des *Cathurellidæ*

Genre **Clathurella** Crprtr.

[Syn. *Defrancia* Millet].

Clathurella scalarina Deshayes, la Réunion (EUDEL).

Clathurella linearis Montag., [Kien, p. 72, pl. XXV], Alger (JOLY).

[Syn. : *Clathurella buchanensis* Mag., *Clat. Cyrilli* Brusin, *Clat. elegans* Donovan., *Clat. multilinearis* Brown., *Clat. muricoides* Blvll., *Clat. rosea* Brusin].

Clathurella Cordieri Payraudeau, p. 144, pl. VII, fig. 11, Alger (A. LETOURNEUX).

Clathurella clandestina Deshayes, la Réunion (EUDEL).

Clathurella purpurea Risso, Côtes de France.

Clathurella Leufroyi Michaud, Sicile (J. DE L'HÔTELLERIE).

[Syn. : *Clat. Booihi* E. Smth., *Clat. candicula* Chier, *Clat. zonalis* Dlle.].

Clathurella rugosa Mighl., Alger (JOLY).

Genre **Daphnella** Hinds

SECTIONS

- (1) *Daphnella* Hinds
- (2) *Cithara* Schmch.
- (3) *Mangilia* Risso.
- (2) *Daphnella gemmulata* Desh., la Réunion (EUDEL).
- (3) *Daphnella rugulosa* Philippi, Alger (JOLY).
[Syn. : *D. crassilabrum* Req., *D. goudotiana* Leach.].
- (3) *Daphnella nebula* Montagu, Payr, p. 144, pl. VII, fig. 12 et 13, Alger.
[Syn. : *D. Bertrandi* Philippi, *D. elongata* Jeffer., *D. laevigata* Philippi, *D. Metcalfei* Hanl., *D. polita* Brusin, *D. pyramidata* Brown.].
- (3) *Daphnella mica* Philippi, Suez (A. LETOURNEUX).
- (3) *Daphnella Vauquelini* Payr., Algérie.
- (3) *Daphnella septangularis* Montagu, Alger (JOLY).
- (3) *Daphnella gracilis* Montagu, Marseille (DE L'HÔTELLE-RIE).
- Daphnella multilineolata* Deshayes, Algérie (JOLY).
[Syn. : *Daph. coarctata* Wkf., *D. elegans* Donovan., *D. lineata* Brown., *D. multilineata* Desh.].
- Daphnella paciniana* Calc., Alger (JOLY).

FAMILLE DES TRITONIDÆ

Genre **Triton** Mft.

[Syn. : *Tritonium* Link., *Charonia* Gistl.].

SECTIONS

- (1) *Triton* Mft.
- (2) *Simpulum* Klein.
Syn. *Lampusia* Schmch.
— *Monoplex* Perry.
- (3) *Cabestana* Bolt.
- (4) *Lotorium* Mft.
Syn. *Cymatium* Bolt.
- (5) *Gutturnium* Klein.
Syn. *Ranularia* Schmch.
- (6) *Epidromus* Klein.
Syn. *Colubraria* Schmch.
— *Cumia* Bivon.
- (7) *Lagena* Klein.
- (8) *Argobuccinum* Klein. Ad.
Syn. *Pryene* N. A.

- (1) *Triton nodiferus* Lamarck, Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Tr. colubrinus* Grat., *Tr. crassus* Grat., *Tr. mediterraneus* Risso, *Tr. opis* Bolt., *Tr. ranellæformis* Sism., *Tr. subcolubrinus* d'Orb., *Tr. ventriosus* Grat.].
- (1) *Triton variegatus* Lamarck, Océan Indien.
[Syn. *Tr. articularis* Mke, *Murex tritonis* Linné].
- (2) *Triton chlorostomus* Lamarck, la Réunion (EUDEL).
[Syn. *Tr. pulchellus* A. Ad.].
- (2) *Triton olearius* Linné, Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Tr. acclivis* Hutt., *Tr. americanus* d'Orb., *Tr. Australasiæ*. Perry, *Tr. costatus* Born., *Tr. inflectilabrum* L., *Tr. insperans* L., *Tr. labropolitus* L., *Tr. Parthenopus* Dillw., *Tr. peribrantum* L., *Tr. pilearis* d'Orb., *Tr. singillum* L., *Tr. succinctus* Lmck., *Tr. Vojet* Adans.].
- (2) *Triton pilearis* Linné, Antilles.
[Syn. : *Tr. haemastomus* Val., *Tr. martinianus* Reeve, *Tr. Veliei* Cal.].
- (2) *Triton corrugatus* Lamarck, Algérie (A. LETOURNEUX).
- (3) *Triton cutaceus* Linné, Alger.
[Syn. : *Tr. gyrinatus* Risso, *Tr. heptagonum* S.Wood., *Tr. intermedius* Broch., *Tr. tuberculatus* Risso].
- (4) *Triton tripus* Chemn., Océan Indien.
[Syn. : *Tr. femoralis* Dillw.].
- (4) *Triton femoralis* Linné, Antilles.
- (4) *Triton tuberosus* Lamarck, Océan Indien.
[Syn. : *Tr. albocingulatus* Desh., *Tr. Antillarum* d'Orb., *Tr. nodulus* Moreh., *Tr. productus* Gld., *Tr. pyriformis* Conr.].
- (6) *Triton reticulatus* Blainville, Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Tr. intertextum* Pfr., *Tr. mediterraneus* Sow., *Tr. pygmæus* Reeve].
- (6) *Triton Sowerbyi* Reeve, la Réunion (EUDEL).
[Syn. : *Tr. lineatus* Sow.].
- (6) *Triton clathratus* Sowerby, Amérique méridionale.
[Syn. : *Tr. Cumingi* Desh., *Murex cancellinus* Roissy].
- (6) *Triton angulatus* Reeve, Pondichéry.
- (7) *Triton cingulatus* Lamarck, Malacca.
[Syn. : *Tr. undosus* Kiener, *Tr. Voigti* Ant.].
- 8) *Triton rudis* Broderip, Chenu, fig. 704, Magellan.

- (8) *Triton scaber* King, Océan Indien.
Triton lanceolatum Kiener, Porto-Rico.
Triton sp., Sidney.

Genre **Persona** Montfort
 [Syn. : *Distortus* Bolt., *Distortrix* Linné].

Persona anus Linné, Océan Indien.
 [Syn. : *Persona rugosa* Schmch.].

Genre **Ranella** Lamarck
 [Syn. : *Bursa* Bolt., *Gyrinum* Link., *Bufo* Mft.,
Biplex Perry, *Rana* Humph., *Ranina* Blvll.].

SECTIONS

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) <i>Bursa</i> Bolt. | (4) <i>Apollon</i> Mft.
Syn. <i>Gyrina</i> Schmch. |
| (2) <i>Lampas</i> Schmch. | (5) <i>Eupleura</i> H. A. Ad. |
| (3) <i>Aspa</i> H. A. Ad. | (6) <i>Bufonaria</i> Schmch. |
- (1) *Ranella subgranosa* Lamarck, Hong-Kong.
 [Syn. : *Ranella Becki* Kiener].
- (1) *Ranella spinosa* Lamarck, Océan Indien (Vesco).
 [Syn. : *R. bufonia* Bolt.].
- (2) *Ranella granifera* Lamarck, Iles Marquises (M^{me} HERMITTE).
 [Syn. : *ri. granularis* Bolt.].
- (4) *Ranella gigantea* Lamarck, Algérie (A. LETOURNEUX).
 [Syn. : *R. bicanalata* Lmck., *R. gyrina* Mft., *R. incerta* Mich., *R. maculata* Schmch., *R. olearius* Desh., *R. parvivaricata* Gray, *R. ranina* Blvll., *R. reticularis* L., *R. rubicola* Perry].
- (4) *Ranella pusilla* Brod., I.-L. Hood.
 [Syn. : *R. polychloros* Tapp.].
- (4) *Ranella anceps* Lamarck, IX, 550 ; Kien, p. 36, pl. IV, fig. 2, Amérique (LEPELTIER).
 [Syn. : *R. pyramidalis* Brod.].
- (6) *Ranella scrobiculata* Linné, Algérie (LETOURNEUX).
 [Syn. : *R. Jabick* Adans., *R. pes-leonis* Schmch., *R. scrobiculata* Sow.].

Ranella bufo Gmelin, Océan Indien (LEPELTIER).
[Syn. : *R. mammata* Bolt., *R. nobilis* Reeve].

Ranella sp., Cochinchine.

Ranella sp., Penang.

FAMILLE DES BUCCINIDÆ

Genre **Buccinum** Linné

SECTIONS

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) <i>Buccinum</i> Linné. | (3 ^a) <i>Josepha</i> T. Woods. |
| (2) <i>Volutharpa</i> Fschr. | (4) <i>Amphissa</i> H. A. Ad. |
| (3) <i>Cominella</i> Gray. | (5) <i>Northia</i> Gray. |

- (1) *Buccinum undatum* Linné, Le Croisic (France).
[Syn. *Buc. bornianum* Chemn., *B. breve* A. Ad., *B. carinatum* Turt. *B. flexuosum* Tryon, *B. labradorensis* Kien., *B. littoralis* King, *B. paupercula* Tryon, *B. pelagica* King., *B. pyramidale* Reeve, *B. solutum* Dillw., *B. vulgare* Costa, *B. zetlandicum* Forb.].

- (1) *Buccinum groenlandicum* Chemnitz, Groënland (MÖRCH).
[Syn. : *Buccinum Baeri* Middf., *B. ciliatum* Gld., *B. humphreysianum* Möl., *B. inflatum* Auriv., *B. undatum* Fabr.].

Buccinum nucleus Brug., Saint-Thomas (M^{me} HERMITE).

Genre **Bullia** Gray

[Syn. : *Bulliana* Gray].

SECTIONS

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) <i>Bullia</i> Gray. | (4) <i>Leiodomus</i> Sow. |
| (2) <i>Buccinanops</i> Orb. | (5) <i>Adinus</i> H. A. Ad. |
| (3) <i>Dorsanum</i> Gray. | |
- Syn. *Pseudostrombus* Klei.

- (1) *Bullia annulata* Lamarck, Océan Indien.

- (3) *Bullia vitata* Linné, Pondichéry.

- (3) *Bullia polita* Lamarck, Sénégal.
[Syn. : *Bullia vitrea* Reeve].

- (4) *Bullia tranquebaricum* Bolt., Indes.

Genre **Phos** Mft.

[Syn. : *Rhinodomus* Sowerby].

SECTIONS

- (1) Phos Mft. (2) Strongylocera Mörch.
(1) *Phos senticosus* Linné, Nouvelle Calédonie (PETIT DE LA
SAUSSAYE).
[Syn. : *P. angulatus* Sow., *P. textilis* A. Adams].

Genre **Nassa** Lamarck

SECTIONS

- (1) Nassa Lmck. (10) Uzita H. A. Ad.
(2) Niotha H. A. Adams. (11) Hebra H. A. Ad.
(3) Phrontes H. A. Adams. (12) Zaphon H. A. Ad.
(4) Arcularia Link. (13) Aciculina H. A. Ad.
Syn. *Eione* Risso. (14) Hima Leach.
(5) Naytia H. A. Ad. Syn. *Tritonia* Turt.
(6) Alectryon Mft. — *Tritonella* A. Ad.
(7) Zeuxis H. A. Ad. (15) Tritea Risso.
(8) Telasco H. A. Ad. (16) Nassodonta H. A. Ad.
(9) Cæsia H. A. Ad. (17) Ilyanassa Stimps.
- (1) *Nassa mutabilis* Linné, Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Nassa foliosum* Wood, *N. gibba* Dillw., *N. maculata* Monterosato, *N. mediterranea* Risso, *N. obliquata* Brug., *N. tessellata* Oliv].
- (1) *Nassa grana* Lamarck, Alger (A. LETOURNEUX).
(1) *Nassa arcularia* Linné, Océan Indien.
[Syn. : *N. laticostata* Marr., *N. pulla* Linné, *N. Rumphii* Desh.].
- (1) *Nassa coronata* Lamarck, Madagascar.
[Syn. *N. Bronni* Philippi].
- (2) *Nassa Kieneri* Deshayes, Ile Maurice (EUDEL).
[Syn. : *N. margaritifera* Reeve, *N. marginulata* Reeve non Lmck nec Kiener].
- (2) *Nassa marginulata* Lamarck, Naples.
(4) *Nassa Thersites* Brug., Océan Indien.
[Syn. : *N. bimaculosa* A. Ad., *N. dorsuosa* A. Ad.].

- (4) *Nassa granifera* Kiener, Océan Indien, Tahiti (M^{me} HERMITE).
[Syn. : *N. nodulosa* Marr., *N. obliqua* Pse., *N. onerata* Desh.].
- (4) *Nassa globosa* Quoy, Australie.
[Syn. : *N. clathrata* Kiener].
- (4) *Nassa gibbosula* Linné, Saïda (Syrie) (M^{me} HERMITE).
[Syn. : *N. circumcincta* A. Adams].
- (6) *Nassa papillosa* Linné, Océan Pacifique (PETIT DE LA SAUSSAIE). La Réunion (EUDEL).
[Syn. : *N. seminodosa* A. Ad.].
- (6) *Nassa Monile* Kiener, La Réunion (EUDEL).
[Syn. : *N. distorta* A. Ad., *N. mucronata* A. Ad., *N. corticata* A. Ad., *N. acuticostata* Mont., *N. tasmanica* Woods, *N. jaksoniana* Quoy].
- (7) *Nassa canaliculata* Lamarck, les Antilles (LEPELTIER).
[Syn. : *N. lævis* H. A. Ad.].
- (7) *Nassa olivacea* Brug., les Antilles (LEPELTIER).
[Syn. : *Buccinum tænia* Gmelin].
- (8) *Nassa variabilis* Philippi, Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *N. beudentiana* Risso, *N. corrugata* Brocchi, *N. flexuosa* Cost., *N. raricosta* Risso, *N. tessellata* Seach., *Buccinum Cuvieri* Payr., *Buccinum Ferussaci* Payr.].
- (8) *Nassa costulata* Ren., Méditerranée.
[Syn. *N. Ferussaci* Payr., *N. maderensis* Reeve, *N. subdiaphana* Bivona].
- (8) *Nassa cornicula* Olivi, Alger.
[Syn. : *N. Gussoni* Calc., *N. lævissima* Bronn., *N. olivacea* Risso, *N. polita* Bivona, *N. semiplicata* Cost., *N. trifasciata* A. Ad., *Buccinum fasciolatum* Lmck, *Buccinum Calmeilii* Payr.].
- (13) *Nassa maculata* A. Adams, La Réunion (EUDEL).
[Syn. : *Nassa vittata* A. Adams].
- (14) *Nassa stolata* Gmelin, Océan Indien.
- (14) *Nassa pygmæa* Philippi, Vendée (T. LETOURNEUX), Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Nassa asperula* Philippi, *N. evaricosa* Monterosato].
- (14) *Nassa incrassata* Müller, Le Croisic (T. LETOURNEUX).
[Syn. : *N. asperula* Brocchi, *N. coccinella* Lmck., *N. granulata* Brusin, *N. intermedia* Forb., *N. Lacepedei* Payr., *N. macula* Mtg., *N. minuta* Penn., *N. nana* Gmelin, *N. riparia* Dll.-Ch.].

(14) *Nassa fasciata* Lamarck, Nouvelle Hollande (LE SOURD).

(14) *Nassa stolata* Gmelin, Penang (LE PELTIER).

(14) *Nassa dentifera* Powis, Pérou (A. LETOURNEUX).

(15) *Nassa reticulata* Linné, Le Croisic (T. LETOURNEUX), Cadix (PETIT DE LA SAUSSAIE), Dalmatie (LE COMTE).

[Syn. : *N. hepatica* Montag., *N. nitida* Jeffr.].

(15) *Nassa prismatica* Broch., Le Croisic (T. LETOURNEUX), Cadix (PETIT DE LA SAUSSAIE).

(15) *Nassa limata* Chemnitz, Méditerranée (COINDE).

[Syn. : *Buccinum scalariforme* Kien].

(15) *Nassa crenulata* Brug., Océan Indien (LE PELTIER).

(15) *Nassa cancellata* Chemnitz, Danemark (MÖRCH).

Nassa sp., Hong-Kong (LE PELTIER).

Nassa lobecula Adams, Sydney.

Nassa chlorostoma Linné, Pérou (PETIT DE LA SAUSSAYE).

[Syn. : *Nassa luteostoma* Kiener].

Nassa Belangeri Deshayes, Pérou (LE PELTIER).

Genre **Eburna** Lamarck

[Syn. : *Latrunculus* Gray, *Babylonia* Schlüt].

SECTIONS

(1) *Eburna* Lamarck. (2) *Zemira* H. A. Ad.

(1) *Eburna lutosa* Lamarck, Nouvelle Zélande.

[Syn. : *E. maculosa* Bolt.].

(1) *Eburna spirata* Lamarck, Ceylan.

[Syn. : *E. canaliculata* Schmeh.].

(1) *Eburna areolata* Lamarck, Chine.

[Syn. : *E. tessellata* Sow.].

(1) *Eburna ceylanica* Lamarck, Ceylan.

[Syn. : *E. glabrata* Schröt, *E. zeylanica* Brug.].

Genre **Purpura** Bruguière

(1) *Purpura columellaris* Lamarck, Chili.

[Syn. : *P. leucostoma* Deshayes].

- (1) *Purpura persica* Linné, Océan Indien.
- (1) *Purpura Rudolphi* Lamarek, Océan Indien.
- (1) *Purpura patula* Linné, Océan Indien.
[Syn. : *P. pansa* Gld.].
- (2) *Purpura neritoidea* Linné, Guinée.
[Syn. : *P. ascensionis* Quoy, *P. nodosa* Linné].
- (3) *Purpura echinata* Blainville, Mer des Indes.
- (3) *Purpura hippocastanum* Linné, Océan Indien (IOBA).
[Syn. *P. distinguenda* Dkr., *P. Kieneri* Desh.].
- (3) *Purpura hippocastanum* Linné, var. *intermedia* Kiener
La Réunion (EUDEL).
- (3) *Purpura armigera* Chemn., Océan Indien.
- (3) *Purpura mancinella* Lamarck, Océan Indien (LE
SOURD).
[Syn. : *P. gemmulata* Enc., *P. mancinelloides* Blainv.].
- (3) *Purpura pica* Blainville, Océanie.
[Syn. : *P. armigera* Quoy].
- (4) *Purpura bufo* Lamarck, Océan Indien.
[Syn. : *P. bufonalis* Val., *P. multilineata* Küst, *P.
tumida* Schub.].
- (4) *Purpura bufo* Lamarck, var. *callosa* Lamarck, Océan
Indien (LE PELTIER), La Réunion (EUDEL).
- (4) *Purpura hæmastoma* Linné, Mer Méditerranée (A. LE-
TOURNEUX), Barcelone (M^{me} HERMITE).
[Syn. : *P. barcinonensis* Hidlg., *P. consul* Mke, *P.
delessertiana* d'Orb., *P. fasciata* Reeve, *P. gigan-
tea* Calc., *P. lapillus* Risso, *P. nebulosa* Conr., *P.
peruviana* Soul., *P. Sakeni* Adans., *P. vidua*
Kust.].
- (5) *Purpura cingulata* Linné, Mer Jaune.
[Syn. : *P. clavus* Lmck, *P. trochlea* Lmck.].
- (6) *Purpura lapillus* Linné, Le Croisic.
- (6) *Purpura lapillus* Linné, var. *imbricata* Lmck., Le
Croisic.
- (6) *Purpura cincta* Mke., Nouvelle-Zélande.
- (8) *Purpura sarta* Brug., Nouvelle-Guinée.
[Syn. : *P. hederacea* Mart.].
Purpura coronata Lamarck, Mers du Sénégal.
Purpura lacera Born., Penang (EUDEL).

Genre **Ricinula** Lamarck

[Syn. *Pentadactylus* Klein, *Drupa* Bolt.].

SECTIONS

- (1) *Ricinula* Lamarck. (2) *Sistrum* Mft.
Syn. *Morula* Schmch.
- (1) *Ricinula hystrix* Linné, Nouvelle-Zélande.
[Syn. : *Ricinula reeveana* Cross.].
- (1) *Ricinula digitata* Lamarck, Taïti (IOBA).
[Syn. : *R. dactyloides* Schmch., *R. grossularia* Bolt.].
- (1) *Ricinula ricinus* Linné, Océan Indien.
[Syn. : *R. arachnoides* Lmck.].
- (1) *Ricinula ricinus* Linné, var. *albolabris* Blainville, Iles
Marquises (M^{me} HERMITE).
- (1) *Ricinula horrida* Lamarck, La Réunion (EUDEL).
[Syn. : *Ricinula globosa* Mart., *R. violacea* Schmch.].
- (1) *Ricinula rufostoma* Lesson, Taïti (PETIT DE LA SAUS-
SAYE).
- (1) *Ricinula clathrata* Lamarck, La Réunion (EUDEL).
- (1) *Ricinula mutica* Lamarck, La Réunion (EUDEL).
[Syn. : *R. pisolina* Lmck.].
- (1) *Ricinula digitata* Lamarck, var. *lobata* Blainville, Chili
(LE SOURD).
- (2) *Ricinula tuberculata* Blainville, Madagascar.
[Syn. : *R. parvulum* Gld.].
- (2) *Ricinula cancellata* Kiener, La Réunion (EUDEL).
[Syn. : *R. marginata* Blainville, *R. affinis* Pse., *R.*
fusca Küst., *R. marginalba* Blainv., *R. marginatra*
Blainville, *R. squamosa* Pse., *Purpura atromargi-*
nata Blainv.].
- Ricinula marginulalba* Linné, Penang.
- Ricinula* sp., Mer des Indes.

Genre **Monoceros** Lamarck

[Syn. : *Unicornu* Mft., *Rudolpha* Schmch., *Rudolphus*
Chemnitz, *Acanthina* Fschr.].

- Monoceros imbricatum* Lamarck, Détroit de Magellan.
- Monoceros cingulatum* Lamarck, Mexique.

Monoceros crassilabrum Lamarck, Magellan (M^{me} HERMITE).

[Syn. *Mon. globulus* Sow., *Mon. unicorn* Brug.].

Genre **Concholepas** Lamarck

[Syn. : *Conchopatella* Chemn., *Conchulus* Rfq.].

Concholepas peruviana Lamarck, Pérou.

[Syn. : *C. imbricata* Küst, *C. oblonga* Reeve].

Genre **Rapana** Schmch.

Rapana bezoar Linné, var. *thomasi* Cross., Chine boréale.

FAMILLE DES CORALLIOPHILIDÆ

Genre **Coralliophila** A. Ad.

I. Subg. *Galeropsis* Hupé

Coralliophila costularis Lamarck, IX, 594 ; Encycl., pl. 419, fig. 8, Ile Masb.

Coralliophila neritoidea Chemnitz, La Réunion (EUDEL).

[Syn. : *Purpura violacea* Kiener].

Genre **Leptoconchus**

SECTIONS

(1) *Leptoconchus* Rüpp. (2) *Corallioba* H. A. Ad.

(1) *Leptoconchus Cumingi* Deshayes, La Réunion (EUDEL).

(1) *Leptoconchus Lamarki* Deshayes, La Réunion (EUDEL).

(1) *Leptoconchus striatus* Rüpp, La Réunion (EUDEL)

[Syn. : *Lep. serratus* Rüpp.].

Genre **Magilus** Mft.

[Syn. : *Campulotus* Guett., *Spirobranchus* Blvll., *Tubulites* Davil.]

Magilus antiquus Mft., La Réunion (EUDEL).

[Syn. : *M. Diedah* Chenu, *M. tenuis* Chenu, *Leptoconchus ellipticus* Sow., *L. oblongus* Sow., *L. rostratus* A. Ad.].

FAMILLE DES OLIVIDÆ

Genre **Olivancillaria** d'Orbigny

SECTIONS

- (1) *Olivancillaria* d'Orb. (3) *Linetricula* H. A. Ad.
(2) *Utriculina* Gray. Syn. *Scaphula* Sow.
(1) *Olivancillaria nana* Lamarck, X, 631 ; Encycl., pl. 363,
fig. 3, Océan Américain.
[Syn. : *O. millepunctata* Duclos ; *O. zenospira* Brod.].
(1) *Olivancillaria brasiliensis* Chemnitz, Brésil (IOBA).

Genre **Agaronia** Gray

[Syn. : *Hiatula* Sowerby].

Agaronia hiatula Gmelin, Océan Américain.

Agaronia acuminata Lamarck, Océan Indien.

[Syn. : *A. annotata* Marr., *A. carita* Marr., *A. modesta* Reeve].

Genre **Oliva** Bruguière

[Syn. : *Dactylus* Klein, *Olivaria* Rfq., *Olivarius* Dum.].

SECTIONS

- (1) *Dactylus* Klein. (6) *Olivella* Sow.
(2) *Strephona* Bowdtsch. Syn. *Olivina* d'Orb.
(3) *Porphyria* Bolt. (7) *Dactylidia* H. A. Ad.
(4) *Ispidula* Gray. (8) *Callianax* H. A. Ad.
(5) *Cylindrus* Breyn. (9) *Lamprodoma* Sow.
(2) *Oliva irisans* Lamarck, Océan Indien (LE PELTIER).
[Syn. : *O. fumosa* Marr., *O. azemula* Duclos. *O. ceylonica* Lmck., *O. nazaria* Duclos, *O. Sylvia* Duclos, *O. tenebrosa* Marr.].
(2) *Oliva tricolor* Lamarck, X, 615 ; Encycl., pl. 365, fig. 4,
Océan Indien.
[Syn. : *O. guttata* Mörch.].
(2) *Oliva inflata* Lamarck, var. *bicincta* Lamarck, Nouvelle
Hollande (MENKE).

- (2) *Oliva tigrina* Lamarck, X, 623, Madagascar (IOBA).
- (2) *Oliva guttata* Lamarck, var. *alba*, Océan Indien (LE PELTIER).
[Syn. : *O. cruenta* Sol., *O. emicator* Mörch.].
- (2) *Oliva guttata* Lamarck, var. *leucophæa* Lamarck, Océan Indien.
- (2) *Oliva carneola* Lamarck, X, 621 ; Encycl., pl. 365, fig. 5, Philippines.
- (2) *Oliva carneola* Lamarck, var. *athenia* Duclos, Ile Salomon (LE PELTIER).
- (2) *Oliva zeylanica* Lamarck, Nossi-Bé (LE SOURD).
[Syn. : *Oliva galeola* Duclos, *Oliva philantha* Duclos].
- (2) *Oliva macleyana* Duclos, Ceylan (LE PELTIER).
- (2) *Oliva peruviana* Lamarck, var. *senegalensis* Lamarck, X, 617, 618 ; Encycl., pl. 367, fig. 4 ; pl. 364, fig. 3, Pérou.
- (2) *Oliva maura* Lamarck, Océan Pacifique.
- (2) *Oliva elegantissima* Deshayes, La Réunion.
- (2) *Oliva ispidula* Linné, Lamarck, X, 621 ; Encycl., pl. 366, fig. 6, Océan Indien.
[Syn. : *O. erica* Duclos, *O. candida* Lmck.].
- (2) *Oliva angulata* Lamarck, Océan Indien.
- (2) *Oliva porphyria* Linné, Côtes du Brésil.
- (2) *Oliva avellana* Lamarck, X, 637, Nouvelle Guinée.
- (2) *Oliva jaspidea* Gmelin, Antilles (J. DE L'HÔTELLERIE).
[Syn. : *O. conoidalis* Lamarck.].
- (2) *Oliva flammulata* Lamarck, X, 613 ; Encycl., pl. 367, fig. 5, Guyanne (A. LETOURNEUX).
- (2) *Oliva scripta* Lamarck, X, 615 ; Encycl., pl. 362, fig. 4, Océan Indien.
- (2) *Oliva tremulina* Marr. ; Océan Indien.
[Syn. : *O. magnifica* Duclos, *O. nobilis* Reeve].
- (2) *Oliva sanguinolenta* Lamarck, X, 615, Océan Indien.
[Syn. *O. virescens* Mörch., *O. evania* Duclos].
- (2) *Oliva erythrostoma* Lamarck, Madagascar.
[Syn. : *O. porphyretica* Mörch.].

- (2) *Oliva erythrostoma* Lamarck, var. *nigra*, Madagascar.
(PETIT DE LA SAUSSAYE).
- (2) *Oliva reticularis* Lamarck, X, 613 ; Encycl., pl. 361,
fig. 1, Océan Indien.
[Syn. : *O. Bewleyi* Marr., *O. bifasciata* Wkf., *O. Dia-*
phana Duclos, *O. figura* Marr., *O. formosa* Marr.,
O. jamaicensis Marr., *O. memnonia* Duclos, *O.*
nivosa Marr., *O. olorinella* Duclos, *O. Sowerbyi*
Marr., *O. ustulata* Lmck.]
- (2) *Oliva episcopalis* Lamarck, Océan Indien (IOBA).
[Syn. : *O. cærulea* Bolt.].
- (3) *Oliva duclosiana* Jay, Mer Vermeille (A. LETOURNEUX).
- (6) *Oliva nivea* Gmelin, Indes occidentales, Alger (A.
LETOURNEUX).
[Syn. : *O. eburnea* Lamarck X. 630].
- (6) *Oliva nitida* Gmelin, var. *eburnea* Lamarck, Antilles.
- (6) *Oliva columellaris* Sowerby, Lamarck, X, 633, Pérou.
- (6) *Oliva myriadina* Duclos, La Réunion (EUDEL).
- (6) *Oliva dama* Mawe, Mer Vermeille (A. LETOURNEUX).
- (6) *Oliva mutica* Say, Amérique.
- (8) *Oliva biplicata* Sowerby, Lamarck, X, 634, Amérique
septentrionale.
- (9) *Oliva volutella* Lamarck, X, 623, Californie (LE SOURD).
Oliva subulata Lamarck, X, 626 ; Encycl., pl. 368, fig. 6,
Océan Indien.
Oliva utriculus Lamarck, Océan Indien.
[Syn. : *O. gibbosa* Born.].

Genre **Dipsaccus** Klein

Dipsaccus glabratus Linné, Océan Indien.

Genre **Ancilla** Lamarck

SECTIONS

- | | |
|---|---------------------------------|
| (1) <i>Ancillaria</i> Lamarck. | (3) <i>Chilotygma</i> H. A. Ad. |
| (2) <i>Anaulax</i> Roissy. | |
| (1) <i>Ancilla torosa</i> Meusch., var. <i>alba</i> Lamarck, 5 Océan
Indien. | |

- (1) *Ancilla torosa* Meusch., var. *mauritiana* Sowerby,
Océan Indien (LE SOURD).
[Syn. : *Ancilla volutella* Kiener].

FAMILLE DES FASCIOLARIIDÆ

Genre **Fasciolaria**

[Syn. : *Colus* Bolt., *Pyrula* Perry, *Jeranea* Rfq.]

Fasciolaria coronata Lamarek, Nouvelle Hollande.
[Syn. *Fasciolaria Antoni* Recluz].

Fasciolaria trapezium Linné, Océan Indien.

Fasciolaria lignaria Linné, Alger.
[Syn. *F. tarentina* Lamarek, *F. Savignyi* Tapp.].

Fasciolaria tulipa Linné, Antilles.

Fasciolaria distans Lamarek, Campêche.

Fasciolaria filamentosa Mart., Océan Indien.

Genre **Latirus** Mft.

[Syn. : *Polygona* Schmch., *Polygonum* Blvll.].

SECTIONS

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| (1) <i>Latirus</i> Mft. | (3) <i>Peristernia</i> Mörch. |
| (2) <i>Plicatella</i> Sow. | (4) <i>Leucozonia</i> Gray. |
| Syn. <i>Cymatium</i> Lmck. | Syn. <i>Lagena</i> Schmch. |

- (1) *Latirus infundibulum* Gmelin, la Guadeloupe (M^{me} HER-
MITE).
[Syn. *L. attenuatus* Reeve, *L. fusiformis* Schmch.].

- (2) *Latirus craticulatus* Lamarek, Méditerranée.

- (3) *Latirus fragarius* Wood,
[Syn. : *Turbinella Carolinæ* Kiener].

- (3) *Latirus nassatululus* Lamarek, La Réunion (EUDEL).
[Syn. : *L. microstomus* Küst, *L. subrostratus* Gray].

- (3) *Latirus gemmatus* Reeve, La Réunion.

- (4) *Latirus smaragdulus* Linné, Océan Indien.
[Syn. : *Latirus crassus* Schmch., *L. rusticus* Gmelin].

FAMILLE DES TURBINELLIDÆ

Genre **Turbinella** Lamarck

[Syn. : *Xancus* Bolt., *Rapum* Humph., *Mazza* Klein].

Turbinella gravis Dillw., Océan Indien.

[Syn. : *T. napus* Lmck., *T. clavata* Wagn.].

Turbinella pyrum Linné, Océan Indien.

Genre **Vasum** Bolt

[Syn. : *Scolymus* Sowerby, *Cynodona* Schmch.,
Clava Fabr., *Volutella*. Perry].

Vasum capitellum Linné, Océan Indien (IOBA).

Vasum cassidiforme Val., Bahia.

Vasum cornigerum Lamarck, Océan Indien.

Vasum ceramicum Linné, Iles Moluques.

[Syn. : *Vasum vexillulum* Reeve].

FAMILLE DES VOLUTIDÆ

Genre **Voluta** Lamarck

SECTIONS

- | | |
|---|---|
| (1) <i>Cymbium</i> Klein.
Syn. <i>Cymba</i> Brod.
— <i>Yetus</i> Adans. | (10) <i>Voluta</i> Gray.
Syn. <i>Lyra</i> Linne.
— <i>Plejona</i> Bolt.
— <i>Musica</i> Humph. |
| (2) <i>Melo</i> Humph. | |
| (3) <i>Ausoba</i> H. A. Adams. | (11) <i>Harpula</i> Sowerby. |
| (4) <i>Aulica</i> Gray.
Syn. <i>Vespertilio</i> Klein
— <i>Scapha</i> Gray. | (12) <i>Fulguraria</i> Schmch.
Syn. <i>Psephæa</i> Cross. |
| (5) <i>Zidona</i> H. A. Adams.
Syn. <i>Volutella</i> d'Orbigny. | (13) <i>Aurinia</i> H. A. Ad. |
| (6) <i>Callipara</i> Gray. | (14) <i>Lyria</i> Gray. |
| (7) <i>Cymbiola</i> Sowerby. | (15) <i>Enata</i> H. A. Ad. |
| (8) <i>Scaphella</i> Sowerby.
Syn. <i>Amoria</i> Gray. | (16) <i>Volutilithes</i> Sowerby. |
| (9) <i>Alcithoë</i> H. A. Adams. | (17) <i>Microvoluta</i> Ang. |
| | (18) <i>Volutoconus</i> Cross. |

- (1) *Voluta porcina* Lamarck, Côtes d'Afrique.
- (1) *Voluta Neptuni* Gmelin, Golfe Persique.
- (1) *Voluta proboscidalis* Lamarck, Philippines.
- (2) *Voluta tessellata* Lamarck, Océan Indien.
- (2) *Voluta æthiopica* Linné, var. *nautica* Linné, Océan Indien.
- (2) *Voluta indica* Gmelin, Océan Indien.
[Syn. : *V. melo* Solander].
- (4) *Voluta vespertilio* Linné, var. *serpentina* Lamarck, Océan Indien.
- (4) *Voluta scapha* Gmelin, Cap de Bonne-Espérance.
- (10) *Voluta musica* Linné, var. *guineaica* Lamarck, Guinée.
- (10) *Voluta musica* Linné, var. *tiarella* Lamarck, Amérique.
- (10) *Voluta hebræa* Linné, Océan Indien (COINDE).
- (11) *Voluta vexillum* Chemnitz, Océan Indien (LEPELTIER).
- (14) *Voluta delessertiana* Pet., Océanie.
Voluta armata Lamarck, Cap de Bonne-Espérance.
Voluta fulminata Lamarck, Océan Indien.
[Syn. : *Voluta rupestris* Gmelin].

Genre **Mitra** Lamarck

[Syn. *Tiarella* Sow., *Mitraria* Rfq.]

SECTIONS

- (1) *Mitra* Lamarck.
- (2) *Nebularia* Sow.
- (1) *Mitra fusca* Sow., Alger (JOLY).
- (1) *Mitra puncticulata* Lmck., Océan Indien (LE SOURD).
- (1) *Mitra episcopalis* Linné, Océan Indien.
- (1) *Mitra pontificalis* Lmck., Océan Indien.
- (1) *Mitra cardinalis* Gmel., Océan Indien.
- (1) *Mitra chilensis* Kiener, Pérou.
- (3) *Mitra scabriuscula* Linné, Océan Indien (IOBA).
- (4) *Mitra senegalensis* Reeve, Sénégal (EUDEL).

- (5) *Mitra ambigua* Swains, Océan Indien.
[Syn. : *Mitra attenuata* Reeves].
- (10) *Mitra litterata* Lmck., Ile Guimar.
- (13) *Mitra regina* Sow., Océan Indien.
- (13) *Mitra vulpecula* Linné, Océan Indien.
- (13) *Mitra intermedia* Kiener, Madagascar (LE SOURD).
- (13) *Mitra costellaris* Lmck. Océan Indien. Côtes de Chine.
- (14) *Mitra turriger* Reeve, Ticao.
- (14) *Mitra arenosa* Lmck, Philippines (LE SOURD).
[Syn. : *Mitra torulosa* Kien. pl. XXV, fig. 80].
- (15) *Mitra tricolor* Gmel., Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Mitra Savignyi* Payr., p. 166, pl. VIII, fig. 23, 25 ; *Mitra microzonias* Blvll ; *Mitra punctata* Risso ; *Mitra pusilla* Bivon].
- (19) *Mitra dactylus* Linné, Océan Indien.
- (21) *Mitra filosa* Crprtr., Nouvelle Calédonie (PETIT DE LA SAUSSAYE).
[Syn. : *Mitra filaris* Linné].
- Mitra lutea* Quoy et Gaim., Ceylan (LE SOURD).
- Mitra striatula* Lmck. ; Encycl., pl. 372, fig. 41 ; Kien., pl. XIII, fig. 41, Mers d'Amérique.
- Mitra plicaria* Lmck., Cochinchine (VESCO).
- (18) *Mitra pauperula* Lmck., Océan Indien.

Genre **Mitrolumna** Bucq. et Dautz.

Mitrolumna olivoidea Cant., Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *M. columbellaria* Sow. ; *Mitra clandestina* Forb. ; *M. striata* Brus, *M. striatella* Calc. ; *M. obsoleta* Brown ; *M. typostigma* Brusin ; *Columbella Greci* Phil.].

147 Genre **Conohelix** Sow.

[Syn : *Imbricaria* Schmeh.]

Conohelix conica Schmeh., Taïti (EUDEL).
[Syn : *Mitra conulus* Lmck.]

FAMILLE DES MARGINELLIDÆ

Genre **Marginella** Lamarck.

[Syn : *Porcellana* Ad. ; *Dactylus* Humph. ; *Pterygia* Link ; *Phænospira* Hinds ; *Marginellarius* Dum. ; *Marginellus* Mft.].

SECTIONS

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| (1) <i>Marginella</i> Lmck. | (4 ¹) <i>Closia</i> Gray. |
| (2) <i>Glabella</i> Sow. | (5) <i>Cryptospira</i> Hinds. |
| (3) <i>Prunum</i> Mart. | (6) <i>Persicula</i> Schmch. |
| (4) <i>Volutella</i> Sow. | (7) <i>Gibberula</i> Sow. |
-
- (1) *Marginella helmatina* Rang. [Desh. in Lmck, X, p. 448 ; Kiener, pl. XVII, fig. 28], Gambie.
- (1) *Marginella glabella* Linné [Encycl., pl. 377, fig. 6 ; Kiener, pl. I, fig. 1-2], Sénégal.
- (2) *Marginella fusiformis* Hinds., la Réunion (EUDEL).
- (2) *Marginella Adamsoni* Kiener [pl. VII, fig. 27], Sénégal.
- (2) *Marginella faba* Linné [Encycl., pl. 377, fig. 1 ; Kiener, pl. II, fig. 7], Sénégal.
- (3) *Marginella curta* Sow. [Lmck, X, 448 ; Kiener, pl. VII, fig. 30], Iquiqui.
- (3) *Marginella amygdala* Kiener [pl. II, fig. 1], Sénégal (LEPELTIER).
- (3) *Marginella conoidalis* Kiener [p. 37, pl. XII, fig. 2], les Antilles.
- (3) *Marginella cincta* Kiener [pl. VIII, fig. 32], Sénégal.
- (6) *Marginella cornea* Lmck [Lmck, X, 444 ; Kiener, pl. IV, fig. 17], Golfe du Mexique (PETIT DE LA SAUSSAYE) [p. 26, pl. IX, fig. 40], Océan Indien.
- (6) *Marginella maculosa* Kien.
- (6) *Marginella clandestina* Broch. [Lmck, X, 452 ; Kiener, pl. XIII, fig. 1], Algérie (A. LETOURNEUX).
- (6) *Marginella persicula* Lin. [Encycl., pl. 377, fig. 3 ; Lmck, X, 444 ; Kiener, pl. V, fig. 19], Océan Indien.
[Syn. : *M. fasciata* Martyn.].

- (6) *Marginella avellana* Lmck, Océan Indien.
- (6) *Marginella pygmæa* Issel, Suez (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *M. Isseli* Nevil].
- (6) *Marginella cingulata* Dillw. (Lmck, X, 435 ; Encycl., pl. 377, fig. 4 ; Kiener, pl. V, fig. 22], Sénégal.
[Syn. : *M. lineata* Lmck. ; *M. Bobi* Blvll.].
- (6) *Marginella interrupta* Lmck, Sénégal.
- (7) *Marginella miliaria* Linné, la Réunion (EUDEL), Alger.
[Syn. : *M. Lestipon* Adans ; *M. miliacea* Lmck. ; *M. siculus* Dlle].
- (7) *Marginella flavida* Rdfld., Golfe du Mexique (PETIT DE LA SAUSSAYE).
- (7) *Marginella sueziensis* Issel, Suez.
- (7) *Marginella diaphana* Kien. [p. 38, pl. XII, fig. 5], Antilles, Gambie.
[Syn. : *Marginella pellucida* Pfr.].
- Marginella lævis* Desh., Méditerranée.
[Syn. : *M. Donovan* Payr. Kien. pl. VIII, fig. 34 ; *Erato cypræola* Risso].
- Marginella bullata* Born [non Lmck. nec Kiener], Océan Indien.
[Syn. : *M. Bellangeri* Kiener].
- Marginella prunum* Gmel. (Lmck. X, 437 ; Encycl., pl. 376, fig. 8 ; Kiener, pl. I, fig. 4], Gorée.
[Syn. : *Marginella cærulescens* Lmck.]
- Marginella Savignyi* Payr. Sicile.
- Marginella monilis* Kien [pl. VI, fig. 23], Sénégal.

Genre **Volvaria**

[Syn. : *Hyalina* Schmeh. ; *Volvarius* Mft. ; *Volvarina* Hinds].

- Volvaria triticea* Lmck, Sénégal [Lmck, X, 460 ; Kien, pl. XII, fig. 15].
- Volvaria lactea* Kiener, Océan Indien [Kiener, p. 42, pl. XIII, fig. 3 ; Desh. in Lmck, X, p. 454].
- Volvaria varia* Sow., la Réunion (EUDEL).

FAMILLE DES COLUMBELLIDÆ

Genre **Columbella** Lamarck

[Syn. : *Columbus* Mft. ; *Peristera* Rfq.].

SECTIONS

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| (1) Pygmæa Humph. | (9) Strombina Mörch. |
| (2) Nitidella Sow. | (10) Amycla H. A. Ad. |
| (3) Alia H. A. Ad. | (11) Astyris H. A. Ad. |
| (4) Mitrella Risso. | Syn. <i>Æsopus</i> Gld. |
| (5) Atilia H. A. Ad. | (12) Alcira H. A. Ad. |
| (6) Anachis H. A. Ad. | (13) Engina Gray. |
| (7) Conidea Sowerby. | (14) Pusiostoma Sowerby. |
| Syn. <i>Pyrene</i> Bolt. | (15) Zafra H. Adams. |
| — <i>Seminella</i> Pse. | Syn. <i>Columbellina</i> d'Orb. |
| (8) Conella Sowerby. | |
| Syn. <i>Meta</i> Reeve. | |

- (1) *Columbella rustica* Linné, Algérie (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *Columbella ambigua* Kiener ; *Columbella aureola* Ducl. ; *Columbella azorica* Drouet ; *Columbella cornea* Kiener ; *Columbella fastigiata* Kiener ; *Columbella guilfordia* Risso ; *Columbella luteola* Kiener ; *Columbella modesta* Kiener ; *Columbella nucleus* Kiener ; *Columbella punctata* Kiener ; *Columbella Sigar.* Adams ; *Columbella simplona* Ducl. ; *Columbella striata* Ducl. ; *Columbella tumida* Reeve ; *Columbella Vestalia* Duclos].

- (1) *Columbella fulgurans* Lmck, Océan Indien.

- (1) *Columbella mercatoria* Linné [Kien., pl. IV, fig. 3], Antilles.

[Syn. : *Columbella affinis* Risso ; *Columbella gualteriana* Risso ; *Columbella incubitantes* Mart. ; *Columbella zulmis* Duclos].

- (1) *Columbella pardalina* Lmck, Ile Guimar.

[Syn. : *Columbella anitis* Ducl. ; *Columbella vulpecula* Sow. ; *Columbella zopilla* Duclos ; *Columbella japonica* Reeve ; *Columbella lactescens* Souvrb. ; *Columbella quintilia* Ducl.].

- (1) *Columbella turturina* Lmck [Enc., pl. 374, fig. 2 ; Kien., pl. XI, fig. 3], Ile Masb.
[Syn. : *Columbella palumbina* Gld. ; *Columbella sandwichensis* Pse].
- (2) *Columbella lævigata* Linné, Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Columbella concinna* Brod.].
- (2) *Columbella nitida* Lmck [Kien., pl. XV, fig. 1], Alger (A. LETOURNEUX), Antilles (M^{me} HERMITE).
[Syn. *Columbella nitidula* Sow.].
- (4) *Columbella scripta* Linné, Alger (LETOURNEUX).
[Syn. : *Columbella Linnei* Payr. ; *Columbella corniculata* Lmck. ; *Columbella decollata* Brus. ; *Columbella flaminea* Risso ; *Columbella Gervillei* Payr. ; *Columbella lineolata* Risso ; *Columbella marmorea* Gmelin ; *Columbella nasuta* Gmelin].
- (4) *Columbella cribraria* Lmck, Gorée (EUDEL), Antilles (M^{me} HERMITE).
- (5) *Columbella exilis* Philippi, Mer Rouge.
Columbella minor Scacchi, Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Columbella minus* Philippi ; *Columbella Thorrenti* Mittr.].
- (7) *Columbella cancellata* Gaskoin, Sénégal, Gorée (EUDEL).
- (9) *Columbella lanceolata* Sow. [Kien, pl. XV, fig. 2], Pérou.
Columbella paytensis Less. [Kien., pl. I, fig. 2], Pérou.
[Syn. : *Columbella paytalida* Ducl.].

FAMILLE DES HARPIDÆ

Genre **Harpa** Lamarck.

[Syn. : *Cithara* Klein ; *Harparia* Rfq. ; *Harpalis* Link. ; *Lyra* Griffith.].

Harpa ventricosa Lmck, Océan Indien.

[Syn. : *Buccinum Harpa* Linn.].

Harpa rosea Lmck, Océan Indien.

Harpa articularis Lmck, Océan Indien.

Harpa minor Rumph., Océan Indien.

[Syn. : *Harpa solidula* A. Ad. ; *Harpa virginalis* Gray
Harpa elongata Kiener].

FAMILLE DES CASSIDIDÆ

Genre **Cassis** Lamarck.

[Syn. : *Cassidea* Brug. ; *Cassida* Humph.].

SECTIONS

- (1) *Cassis* Lmck. (4) *Casmaria* H. A. Ad.
(2) *Semicassis* Klein. (5) *Cassidea* Link.
 Syn. *Cassidea* Sow. (6) *Levenia* Gray.
(3) *Phalium* Link.
 Syn. *Bezoardica* Schm.
- (1) *Cassis tuberosa* Linné, Antilles.
 [Syn. : *Cassis rotundata* Perry].
- (2) *Cassis abbreviata* Lmck, Suez et Algérie (A. LETOURNEUX).
 [Syn. : *Cassis granulosa* Brug. ; *cassis undulata* Gmel.
 var. *abbreviata* Linné ; *Cassis bilineata* Gmelin ;
 Cassis lactea Kiener].
- (2) *Cassis canaliculata* Brug., Ceylan (LEPELTIER).
- (2) *Cassis undulata* Gmel., Antilles (IOBA).
 [Syn. : *Cassis sulcosa* Brug. ; *Cassis centriquadrata*
 Vol. ; *cassis decussata* Blainv. ; *Cassis gibba* Gmelin ;
 cassis minuta Mke ; *cassis pulchella* Jeffer.].
- (2) *Cassis saburon* Lmck, Algérie (A. LETOURNEUX).
 [Syn. : *Cassis diluvii* M. de Serres ; *cassis inflata*
 M de Serres ; *Cassis nucleus* Küst ; *Cassis*
 pomum Schub ; *cassis reticulata* Bellardi ; *cassis*
 striata M. de Serres ; *cassis striatella* Grat. ; *cassis*
 texta Bronn.].
- (3) *Cassis strigata* Gmelin, Océan Indien.
 [Syn. : *Cassis zebra* Lmck. ; *cassis rugosa* Gmelin ;
 cassis undata Deshayes].
- (3) *Cassis glauca* Linné, Océan Indien.
- (3) *Cassis areola* Linné, Océan Indien.
- (4) *Cassis erinacea* Linné, Océan Indien.
- (4) *Cassis Vibex* Linné, Égypte.
- (5) *Cassis testiculus* Linné, Acapuleo.

(5) *Cassis rufa* Linné, Océan Indien.

(5) *Cassis testiculus* Linné, var. *crumena* Lmck, Ile Ascension.

Genre **Cassidaria** Lamarek

[Syn. : *Sconsia* Gray ; *Morio* Mft. ; *Echinora* Schmeh.,
Galeoda Link.]

Cassidaria echinophora Linné, Algérie (A. LETOURNEUX).

Genre **Oniscia** Sowerby

[Syn. : *Morum* Bolt. ; *Hystrix* Humph. ; *Ersina*
Gray ; *Theliostoma* Aust. ; *Lambidium* Link.]

SECTIONS

(1) *Morum* Bolt.

(2) *Oniscidia* Sow.

(1) *Oniscia cancellata* Sowerby, Inde.

(2) *Oniscia tuberculosa* Sowerby, Mers Australes.

(2) *Oniscia oniscus* Linné, Océan Indien.

Syn. : *Oniscia quadriseriata* Linné ; *Oniscia triseriata*
Mke ; *Oniscia Lamarcki* Desh. ; *Cassidaria oniscus*
Lmck.]

FAMILLE DES DOLIIDÆ

Genre **Dolium** Lamarck

[Syn. : *Perdix* Mft. ; *Galea* Mart. ; *Cassida* Lang. ;
Tonna Brunn.].

Dolium maculatum Lmck, Océan Indien.

[Syn. : *Buccinum dolium* Linné].

Dolium perdix Linné, Océan Indien, Afrique (LEPELTIER).

[Syn. : *Dolium plumatum* Green. ; *Dolium reticulatum*
Mft. ; *Dolium rufum* Blvll.].

Dolium latilabris Valenc., Océan Indien.

Dolium fasciatum Brug., Océan Indien.

[Syn. : *Dolium sulcosum* Dillw].

Dolium variegatum Lmck, Nouvelle Hollande.

[Syn. : *Dolium Kieneri* Philippi].

Dolium olearium Brug., Océan Indien.

[Syn. : *Dolium cepa* Mart.].

Genre **Malea** Val.

[Syn. : *Caedium* Link.]

Malea pomum Linné, Océan Indien (M^{me} HERMITE).

FAMILLE DES SYCOTYPIDÆ

Genre **Sycotypus** Brown

[Syn. : *Ficus* Bolt. ; *Ficula* Sow. ; *Otus* Risso ; *Pyrula* Lamarek].

Sycotypus Dussimieri Valenc., Mers de Chine.

Sycotypus bulbosus Valenciennes, Mers de Chine.

Sycotypus ventricosus Sow., Océan Indien.

[Syn. : *Sycotypus decussatus* Wood.].

Sycotypus ficus Linné, Océan Indien.

[Syn. : *Sycotypus lævigatus* Reeve].

Sycotypus ficoides Lmck, Océan Indien.

[Syn. : *Sycotypus reticulatus* Reeve].

Sycotypus Rapa Lmck, Océan Indien.

Sycotypus spirillus Lmck, Océan Indien.

FAMILLE DES VELUTINIDÆ

Genre **Velutina** Flmg.

[Syn. : *Galericulum* Brown.].

SECTIONS

(1) *Velutina* Flmg.

(3) *Velutella* Gray.

(2) *Limneria* H. A. Ad.

Syn. *Morvillia* Gray.

(1) *Velutina capuloidea* Blainville, La Rochelle (D'ORBIGNY père).

[Syn. : *Velutina lævigata* Pennant ; *Velutina elongata* Forb. ; *Velutina haliotoides* Müll. ; *Velutina Mülleri* Desh. ; *Velutina rupicola* Conr. ; *Velutina stolidia* Mrts. ; *Velutina striata* Brown. ; *Velutina velutina* Müller ; *Velutina vulgaris* Flmg.].

FAMILLE DES LAMELLARIIDÆ

Genre **Lamellaria** Montag.

[Syn. : *Marsenia* Leach. ; *Sigaretia* Rfq. ; *Oxynce* Couth. ; *Coriocella* Weink.]

Lamellaria perspicua Linné, Algérie (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *Lamellaria Adansoni* Chiag. ; *Lamellaria ampullacea* Marwg. ; *Lamellaria Audouini* Cantr. ; *Lamellaria complanata* Leach. ; *Lamellaria convexa* Bouch. ; *Lamellaria flava* Dll. ; *Lamellaria neritoides* Linné ; *Lamellaria producta* Leach. ; *Lamellaria stomatella* Risso ; *Lamellaria tentaculata* Mtg. ; *Lamellaria vitrea* Costa ; *Lamellaria zonifera* Bgh.].

FAMILLE DES NATICIDÆ

Genre **Natica** Adans

SECTIONS

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (1) <i>Natica</i> Adams. | Syn. <i>Globularia</i> Sowerby |
| Syn. <i>Nacca</i> Riss. | — <i>Deshayesia</i> Raul. |
| (2) <i>Stigmaulax</i> Mörch. | — <i>Cernina</i> Gray. |
| (3) <i>Lunatia</i> Gray. | — <i>Anomphala</i> Jon. |
| (4) <i>Acrybia</i> H. A. Ad. | (7) <i>Ruma</i> Ch. |
| (5) <i>Neverita</i> Riss. | — <i>Mamilla</i> Schmch. |
| Syn. <i>Naticaria</i> Sowerby. | — <i>Uber</i> Humph. |
| (6) <i>Ampullina</i> Bk. | — <i>Albula</i> Bolt. |
| Syn. <i>Ampullaria</i> Flmg. | — <i>Polinices</i> Bolt. |
| — <i>Euspira</i> Agas. | — <i>Mamilla</i> Gray. |
| — <i>Bulbus</i> Brown. | — <i>Eucaryum</i> Ehbq. |
| | — <i>Mamillaria</i> Sow. |
| | — <i>Naticina</i> Gld. |

(1) *Natica lineata* Lmck, Saïgon, Océan Indien.

(1) *Natica Dillwynii* Payr., Alger (A. LETOURNEUX).

(1) *Natica pellis-tigrina* Chemn., Cochinchine (VESCO).

[Syn. : *Natica maculosa* Lmck. ; *Natica variolaria* Recluz.].

(1) *Natica flammulata* Req., Alger (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *Natica filosa* Philippi].

- (1) *Natica millepunctata* Lmck, Alger (A. LETOURNEUX),
Océan Indien.
[Syn. : *Natica maculata* Desh. ; *Natica punctata*
Chemn. ; *Natica stercus-muscarum* Gmelin].
- (1) *Natica canrena* Linné, Océan Indien.
[Syn. : *Natica affinis* v. d. Bsch. ; *Natica articulata*
Pfr. ; *Natica lemniscata* Phl. ; *Natica pennata* Schrött. ; *Natica*
proxima C. B. Ad.]
- (1) *Natica ala-papilionis* Chemnitz, Cochinchine (A. LE-
TOURNEUX).
- (1) *Natica sagraiana* d'Orb., Alger (JOLY).
- (1) *Natica marmorata* H. Adams, Alger (JOLY).
[Syn. : *Natica avellana* Wkf. ; *Natica Prietoi* Hidlg.]
- (2) *Natica cancellata* Gmelin, Antilles.
- (3) *Natica intricata* DONOV., Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Natica Valenciennesii* Payr. ; *Natica fasciata*
Risso].
- (3) *Natica globosa* King, Penang.
- (3) *Natica catena* Cost., Le Croisic (T. LETOURNEUX).
[Syn. : *Natica monilifera* Lmck ; *Natica ampullaria*
Lmck ; *Natica canrena* Mat. ; *Natica castanea* Lmck ;
Natica glaucina Linné ; *Natica helicina* Broch. ;
Natica Leckembyi Cost. ; *Natica glaucina* Perin ;
Natica Nicolii de Forb.].
- (3) *Natica Guillemini* Payr., Alger (A. LETOURNEUX), Bar-
celone (M^{me} HERMITE).
[Syn. : *Natica franciscana* Recluz ; *Natica marmo-*
rata Risso ; *Natica maroccana* Salis].
- (3) *Natica pallida* Brod. et S., Danemarck (MÖRCH).
[Syn. : *Natica alba* Loven ; *Natica Beverlii* Leach. ;
Natica borealis Gray ; *Natica bulbosa* Reeve ;
Natica caurina Gld. ; *Natica groenlandica* Bk. ;
Natica lactea Loven ; *Natica livida* Lask. ; *Natica*
pusilla Forb. ; *Natica suturalis* Gray].
- (3) *Natica lactea* Sow., Saint-Thomas (M^{me} HERMITE).
- (5) *Natica olla* M. de Serres, Alger (A. LETOURNEUX et
JOLY).
[Syn. : *Natica Josephina* Risso].
- (5) *Natica glaucina* Lmck, Océan Indien.
- (5) *Natica albumen* Linné, Océan Indien (LEPELTIER).
- (6) *Natica fluctuata* Sow., Océan Indien.

- (7) *Natica melanostoma* Gmel., Océan Indien, la Réunion (EUDEL).
[Syn. : *Natica opaca* Recluz].
- (8) *Natica Strangei* Reeve, Pondichéry.
- (8) *Natica plumbea* Lmck, Tchefou (VESCO).
[Syn. : *Natica sordida* Sow.].
- (8) *Natica mamilla* Linné, Océan Indien, Cochinchine (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Natica intermedia* Recluz ; *Natica pyriformis* Recluz].
- (8) *Natica pyramis* Reeve, Nouvelle Hollande.
- (8) *Natica lactea* Gldg., Cherbourg (LEPELTIER).
[Syn. : *Natica nitida* Donovan ; *Natica acuta* Phl. ;
Natica caribæa Phl. ; *Natica philippiana* Nyst. ;
Natica puella, Phl. ; *Natica puerilis* Gldg.].
- (8) *Natica mamillaris* Lmck, var., Golfe du Mexique (PETIT DE LA SAUSSAYE).
Natica disparilis Desh., la Réunion (EUDEL).
Natica rugata Desh., la Réunion (EUDEL).
Natica cuvieriana Recluz, la Réunion (EUDEL).
Natica Rumalupi Chemnitz, Nouvelle Calédonie (PETIT DE LA SAUSSAYE).
[Syn. : *Natica lupinus* Desh. in Lmck].
Natica sp., Chine (VESCO).
Natica sp., Pondichéry.
Natica sp., Zanzibar.
Natica sp., Suez (A. LETOURNEUX).

Genre **Naticina** Gray

- Naticina papilla* Gmelin, Zanzibar.
[Syn. : *Natica costulata* Quoy].

Genre **Sigaretus** Lamarck

- [Syn. : *Catinus* Klein ; *Stomatia* Hill ; *Auris-veneris* Humph. ; *Auriformis* Gevers ; *Halotis* Adams ;
Cryptostoma Blvll.].

SECTIONS

- (1) *Catinus* Klein. (2) *Sigaretus* Lamarck.

- (1) *Sigaretus Delesserti* Recluz, Luzon.
- (1) *Sigaretus haliotideus* Linné, Méditerranée (COINDRE).
- (2) *Sigaretus concavus* Lmck, Amérique (M^{me} HERMITE).
[Syn. *Sigaretus haliotoides* Reeve ; *Sigaretus latifasciatus* Reeve ; *Sigaretus neritoides* Recluz.]
- Sigaretus javanicus* Gray, Java.
[Syn. : *Sigaretus insculptus* Ad. et Reeve].
- Sigaretus Grayi*? Desh., Golfe du Mexique.

FAMILLE DES SCALARIIDÆ

Genre **Scalaria** Lamarck

[Syn. : *Scala* Klein ; *Scalarus* Mft. ; *Acione* Leach ; *Acionea* Desh. ; *Cyclostoma* Schmeh., *Turbina* Brown. ; *Scalatarius* Dum.].

SECTIONS

- (1) *Scala* Klein.
- (2) *Clathrus* Oken.
- (3) *Opalia* H. A. Ad.
- (4) *Amæa* H. A. Ad.
- (5) *Cirsotrema* Mörch.
- (1) *Scalaria pulchella* Bivona, Alger (A. LETOURNEUX).
- (1) *Scalaria preciosa* Lamarck, Océan Indien.
[Syn. *Scalaria scalaris* Linné].
- (2) *Scalaria algeriana* Weinkf. [J. conch, 1866, p. 287]
Alger (JOLY).
[Syn. : *Scalaria unicostata* Hidlg.]
- (2) *Scalaria pseudoscalaris* Brocchi, Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Scalaria lamellosa* Jan.]
- (2) *Scalaria tenuicostata* Michaud, Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Scalaria planicosta* Bivon.]
- (2) *Scalaria Scacchii* Hörnes, Alger (JOLY).
[Syn. : *Scalaria hellenica* Forbes].
- (2) *Scalaria clathrus* Linné, Le Croisic (T. LETOURNEUX).
[Syn. : *Scalaria communis* Lamarck].
- (5) *Scalaria crenata* Linné, Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Scalaria raricostata* Cost.].
- Scalaria eburnea* Mich., Suez (JOLY).
- Scalaria* sp., Suez (A. LETOURNEUX).

Genre **Scaliola** A. Ad.

Scaliola elata Semper Suez (A. LETOURNEUX).

FAMILLE DES TEREBRIDÆ

Genre **Terebra**

[Syn. : *Terebrum* Mft. ; *Terebraria* Rfq. ; *Turricula* Herm.].

SECTIONS

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| (1) Subula Schmch. | (4) Euryta H. A. Ad. |
| Syn. <i>Acus</i> Humph. | (5) Terebra Adans. |
| (2) Abretia H. A. Ad. | (6) Myurella Hinds. |
| (3) Hastula H. A. Ad. | |

(1) *Terebra duplicata* Lmck, var. *Lamarcki* Kiener, Zanzibar.

(1) *Terebra crenulata* Linné, Océan Indien.

(1) *Terebra dimidiata* Linné, Océan Indien.

(1) *Terebra muscaria* Lmck, Océan Indien.

(1) *Terebra duplicata* Lmck, Océan Indien.
 [Syn. : *Terebra chalybæa* Lmck.].

(2) *Terebra cerithina* Lmck, Ile Timor (IOBA).
 [Syn. : *Terebra pulchra* Hinds].

(4) *Terebra aciculata* Lmck, Algérie.

(6) *Terebra babylonica* Lmck, Océan Indien.
 [Syn. : *Terebra Deshayesi* Reeve].

(6) *Terebra subulata* Linné, Océan Indien, Nouvelle Calé-
donie.
 [Syn. : *Bulla terebellum* Linné].

(6) *Terebra oculata* Lmck, Océan Indien.
 [Syn. : *Terebra nebulosa* Lorois].

(6) *Terebra flammea* Lmck, Océan Indien.
Terebra cinerea Born, var. *jamaicensis* C.-B. Ad., Ile
Saint-Thomas.

Terebra maculata Linné, Océan Indien.

FAMILLE DES PYRAMIDELLIDÆ

Genre **Obeliscus** Humph.

Obeliscus maculosus Lmck [Encycl., pl. 452, fig. 1 ; Kiener,
pl. II, fig. 5], Vanikoro.
 [Syn. : *Pyramidella guttula* Lmck.].

Obeliscus ventricosus Guérin, Vanikoro.

Obeliscus Terebellum Müller [Kien., p. 2, pl. I, fig. 2 et 3],
Mers d'Amérique.

Genre **Ringicula** Desh.

[Syn. : *Auriculina* Grat. ; *Auricularia* Del. B.]

Ringicula acuta Philippi, Suez (A. LETOURNEUX).

Ringicula auriculata Men., Ile Maurice (LEPELTIER).

[Syn. : *Ringicula ringens* Lmck.].

Ringicula buccinea Broch. [Chenu, p. 222, fig. 1247], Alger.

Ringicula conformis Monterosato [J. de conch, 1877, p. 44,
pl. II, fig. 4], Alger.

Genre **Chemnitzia** d'Orbigny

[Syn. : *Turbonilla* Risso ; *Pyrgiscus* Philippi ; *Loxonema* Philipps ; *Orthostelis* Arad.].

Chemnitzia striatula Linné, Algérie (JOLY).

[Syn. : *Chemnitzia pallida* Philippi].

Chemnitzia elegantissima Montagu, Loire-Inférieure (CAILLIAUD), Algérie (A. LETOURNEUX).

Chemnitzia venusta Pease, Taïti.

Chemnitzia scalaris Philippi, Alger (JOLY).

Chemnitzia interstincta Mtg., var., Bourgneuf [Loire-Inférieure] (CAILLIAUD).

[Syn. : *Chemnitzia deshayesiana* Relz ; *Chemnitzia mamoi* Arad. ; *Chemnitzia oblonga* Macglv. ; *Chemnitzia obtusa* Brown. ; *Chemnitzia perlata* Req. ; *Chemnitzia striata* Philippi ; *Chemnitzia suturalis* Philippi].

Chemnitzia lactea Linné, Alger (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *Chemnitzia acuta* Donov. ; *Chemnitzia alba* Pennant ; *Chemnitzia subcarinata* A. Ad.].

Genre **Eulimella** Forbes

Sous-genre *Menestho* Möller

Menestho Humboldti Risso, Méditerranée.

[Syn. : *Eulimella lactea* Michaud ; *E. clathrata*, Phil. ; *E. turriculata* Calcara ; *E. Kuzmici* Bruzina ; *E. subventricosa* Phil. ; *E. brevis* Requien].

Genre **Odostomia** Flmg.

[Syn. : *Odontostomia* Philippi].

SECTIONS

- (1) *Otostomella* Bucq. (2) *Parthenina* Bucq.

Odostomia acicula Philippi, Alger (JOLY).

Odostomia conoidea Brocchi, Le Croisic (CAILLIAUD).

[Syn. : *Odostomia erythræa* Philippi ; *Odostomia monodon* Req. ; *Odostomia Naglo* Brusin. ; *Odostomia notata* Jeffr. ; *Odostomia plicata* Flmg. ; *Odostomia sicala* Philippi].

Odostomia decorata Jeffr., Suez (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *Odostomia obliqua* Ald.].

Odostomia turrita Hanley, La Banche [Loire-Inférieure] (CAILLIAUD).

[Syn. : *Odostomia striolata* Ald.].

Odostomia plicata Mtg., Ilot du Four [Loire-Inférieure] (CAILLIAUD).

[Syn. : *Odostomia plicatula* Dillw. ; *Odostomia truncatula* Jeffr. ; *Odostomia unidens* Req.].

Odostomia unidentata Mtg., Le Croisic [Loire-Inférieure] (CAILLIAUD).

Odostomia Humboldti Risso, Sidi-Ferruch (JOLY).

Genre **Eulimella** Forb.

Eulimella arabica Issel, Suez (A. LETOURNEUX).

Genre **Aclis** Loven

[Syn. : *Ebala* Gray ; *Graphis* Jeffr.].

Aclis ascaris Turt., Alger. (JOLY),

[Syn. : *Aclis acutissima* Brown.].

FAMILLE DES EULIMIDÆ

Genre **Eulima** Risso

[Syn. : *Pasithea* Lea. ; *Balcis* Leach. ; *Polyphemopsis* Portl].

Eulima intermedia Cantraine, Alger (JOLY).

[Syn. : *Eulima nitida* Philippi ; *Eulima sinuosa* Seach.].

Eulima distorta Defr., Alger (JOLY).

[Syn. : *Eulima curvata* Chierg.; *Eulima gracilis* Jeffr.; *Eulima Philippii* Wkf.].

Eulima polita Linné, Algérie (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *Eulima alba* DONOV.; *Eulima anglica* Sow.; *Eulima Boscii* Payr., Corse, pl. V, fig. 15-16; *Eulima brevis* Req.; *Eulima elegantissima* Risso; *Eulima glaberrima* Risso; *Eulima lævis* Pennant; *Eulima Gervillei* Coll.].

Eulima cingulata Req., Suez (A. LETOURNEUX).

Genre **Leiostraca** H. A. Ad.

[Syn. : *Subularia* Monteros].

Leiostraca subulata DONOV., Alger (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *Leiostraca Donovanii* Forb.; *Leiostraca flavocincta* Mhl.; *Leiostraca glaber* Cost.].

Leiostraca Metcalfei A. Ad. [Chenu, p. 230, fig. 1325], la Réunion (EUDEL).

Leiostraca acuta Sow. [Chenu, p. 230, fig. 1326], la Réunion (EUDEL).

FAMILLE DES STYLIFERIDÆ

Genre **Stylifer** Brod.

[Syn. : *Stylina* Flmg.].

Stylifer sp., Alger [sur les oursins] (A. LETOURNEUX).

FAMILLE DES CERITHIOPSISIDÆ

Genre **Cerithiopsis** Forb.

Cerithiopsis bacillum Issel., Suez.

Cerithiopsis scaber Olivi, Algérie (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *Cerithiopsis ferruginea* Brug.; *Cerithiopsis reticulata* Mtg.; *Cerithium lima* Brug.; *Cerithium Latreillei* Payr. pl. VIII, fig. 9-10].

Cerithiopsis lactea Philippi, Algérie (A. LETOURNEUX).

Cerithiopsis metaxia Delle Chiaje, Alger (JOLY).

[Syn. : *Cerithiopsis exilissima* Monteros; *Cerithiopsis rugulosa* Sow.; *Cerithiopsis subcylindrica* Brus].

Cerithiopsis tubercularis Montagu, Alger (JOLY).

[Syn. : *Cerithiopsis aciculata* Locc ; *Cerithiopsis Henkelinsi* Nyst. ; *Cerithiopsis pulchella* Jeffr. ; *Cerithiopsis pygmæa* Philippi].

Cerithiopsis trilineata Philippi, Algérie (JOLY).

[Syn. : *Cerithiopsis terebralis* C. B. Ad. ; *Cerithiopsis interrupta* Mke ; *Cerithiopsis terebellum* C. B. Ad.].

Genre **Alaba** H. A. Ad.

Alaba semistriata Philippi, Suez (A. LETOURNEUX).

FAMILLE DES SOLARIIDÆ

Genre **Solarium** Lamarck

[Syn. : *Architectonica* Bolt. ; *Physeter* Humph.].

SECTIONS

(1) *Solarium* Lamarck. (3) *Philippia* Gray.

(2) *Torinia* Gray.

Syn. *Heliacus* d'Orbigny.

(1) *Solarium granulatum* Lamarck, Océan Indien.

Soldrium perspectivum Linné, Océan Indien.

[Syn. : *Solarium formosum* Hinds ; *Solarium incisum* Philippi ; *Solarium trochleare* Hinds ; *Solarium zonatum* Philippi].

(2) *Solarium Chemnitzii* Kiener, la Réunion (EUDEL).

(2) *Solarium variegatum* Gmelin, Mers Australes.

[Syn. : *Solarium areola* Gmelin ; *Solarium gyra* Meusch. ; *Solarium tessellatum* Deshayes].

(2) *Solarium cylindraceum* Chem., Saint-Thomas (M^{me} HERMITE).

Solarium Fischeri Deshayes, la Réunion (EUDEL).

FAMILLE DES CONIDÆ

Genre **Conus** Linné

[Syn. : *Rhombus* Mft. ; *Conulus* Rfq. ; *Cucullus* Bolt.].

SECTIONS

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| (1) <i>Conus</i> Linné. | (8) <i>Lithoconus</i> Mörch. |
| (2) <i>Stephanoconus</i> Mörch. | (9) <i>Leptoconus</i> Sow. |
| (3) <i>Puncticulus</i> Sow. | (10) <i>Rhizoconus</i> Mörch. |
| (3) <i>Coronaxis</i> Sow. | (11) <i>Cheliconus</i> Mörch. |
| (5) <i>Cylindrella</i> Sow. | Syn. <i>Pionoconus</i> Mörch. |
| (6) <i>Nubecula</i> Klein. | — <i>Phasmoconus</i> Mörch. |
| Syn. <i>Rollus</i> Mft. | (12) <i>Cylinder</i> Mft. |
| — <i>Tuliparia</i> Sow. | Syn. <i>Textilia</i> Sow. |
| — <i>Utriculus</i> Schmch. | (13) <i>Hermes</i> Mft. |
| (7) <i>Dendroconus</i> Sow. | Syn. <i>Theliconus</i> Sow. |

- (1) *Conus arachnoideus* Gmelin, Océan Indien.
[Syn. : *Conus araneosus* Brug. ; *Cone Esplandian*].
- (1) *Conus imperialis* Linné [Lmck, XI, 11; Encycl., pl. 319],
Océan Indien (LEPELTIER).
- (1) *Conus imperialis* Linné, var. *fuscatus* Lamarck [Lmck,
XI, 12; Encycl., pl. 319, fig. 4-7], Océan Indien
(IOBA).
- (1) *Conus imperialis* Linné, var. *viridulus* Lamarck
[Lmck, XI, 13; Encycl., pl. 319, fig. 3], Océan
Austral.
- (1) *Conus marmoreus* Linné, [Lmck, XI, 19; Encycl.,
pl. 315-317], Océan Indien (M^{me} HERMITE).
- (1) *Conus araneosus* Brug., var. *nicobaricus* Brug. [Lmck,
XI, 10; Encycl., pl. 318, fig. 9], Océan Indien.
[Syn. : *Conus marmoreus* Dillw.].
- (2) *Conus distans* Brug. [Lmck, XI, 33; Kien, pl. III,
fig. 1], la Réunion (EUDEL).
- (2) *Conus lividus* Brug. [Lmck, XI, 30; Encycl., pl. 321,
fig. 5], la Réunion (EUDEL).
- (3) *Conus arenatus* Brug. [Lmck, XI, 22; Encycl., pl. 321,
fig. 1, 8] Océan Asiatique (EUDEL).
- (3) *Conus pulicarius* Brug. Océan Indien.
- (3) *Conus pulicarius* Brug. var. *fustigatus* Brug. Océan
Indien.

- (3) *Conus stercus-muscarum* Linné [Lmck, XI, 107; Encycl., pl. 341, fig. 6], Océan Asiatique.
- (4) *Conus hebræus* Linné, Mer des Indes.
- (6) *Conus geographus* Linné [Lmck, XI, 27; Encycl., pl. 322, fig. 12], Océan Asiatique.
- (6) *Conus striatus* Linné [Lmck, XI, 99; Encycl., pl. 340, fig. 1-2], Océan Indien.
[Syn. : *Conus terminus* Kien.]
- (6) *Conus terminus* Lamarck [Lmck, XI, 98], Océan Asiatique.
- (6) *Conus tulipa* Linné [Lmck, XI, 26; Encycl., pl. 322, fig. 11], Océan Indien.
- (7) *Conus betulinus* Linné [Lmck, XI, 67; Encycl., pl. 333-335], Océan Indien.
- (7) *Conus figulinus* Linné [Lmck, XI, 68; Encycl., pl. 382, fig. 1, 2, 9], Océan Indien.
- (7) *Conus figulinus* Linné, var. *Loroisii* Kiener [p. 91, pl. 65, fig. 1], Océan Indien (LEPELTIER).
- (7) *Conus quercinus* Brug. [Lmck, XI, 69; Encycl., pl. 332, fig. 6], Océan Indien.
- (8) *Conus flavidus* Lmck, Tahiti.
- (8) *Conus litteratus* Linné [Lmck, XI, 39], Océan Indien (IOBA).
Syn. : *Conus arabicus* Lamarck.
- (8) *Conus litteratus* Linné, var. *millepunctatus* Lmck Océan Indien (IOBA).
- (8) *Conus papilionaceus* Brug. [Lmck, XI, 57; Encycl., pl. 330, fig. 1, 2, 5, 8], Côtes de Guinée (IOBA).
[Syn. : *Conus pseudo-Thomæ* Chemn.]
- (8) *Conus tessellatus* Brug. [Lmck, XI, 39; Encycl., pl. 326, fig. 7 et 9], la Réunion.
- (10) *Conus capitaneus* Linné, Océan Indien.
- (10) *Conus consors* Sow. [Kiener, p. 101, pl. 73, fig. 5], Mers de Chine.
- (10) *Conus lineatus* Chemn. [Lmck, XI, 42; Encycl., pl. 326, fi. 2], Océan Asiatique.

- (10) *Conus generalis* Linné, var. *maldivus* Brug., Océan Indien (LEPELTIER).
- (10) *Conus miles* Linné [Lmck, XI, 52 ; Encycl., pl. 329 fig. 7], Océan Indien.
- (10) *Conus mustelinus* Brug. [Lmck, XI, 50 ; Encycl., pl. 327,, fig. 6], Océan Indien, Cochinchine (VESCO).
[Syn. : *Conus Ceciliæ* Chen.].
- (10) *Conus nemocanus* Brug. [Lmck, XI, 91 ; Encycl., pl. 338, fig. 5 ; Kien., p. 82, pl. 35, fig. 5], Océan Indien.
- (10) *Conus vexillum* Gmel. [Lmck, XI, 51 ; Encycl., pl. 336, fig. 8], Océan Indien.
[Syn. : *Conus Robillardii* Bern.].
- (10) *Conus virgo* Linné [Lmck, XI, 46 ; Encycl., pl. 326, fig. 2], Océan Indien.
[Syn. : *Conus pastinaca* Lmck.].
- (11) *Conus achatinus* Chemn. [Lmck, XI, 62 ; Encycl., pl. 330, fig. 6, 331, fig. 9], Océan Indien.
[Syn. : *Conus minimus* Gmel. ; *Conus ranunculus* Brug.].
- (11) *Conus catus* Brug. [Lmck, XI, 87 ; Encycl., pl. 332, fig. 3, 4], la Réunion.
[Syn. : *Conus eques* Brug.].
- (11) *Conus columba* Brug., Océan Indien.
- (11) *Conus mediterraneus* Brug. [Lmck., XI, 34 ; Encycl., pl. 330, fig. 4], Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Conus capitaneus* Ren. ; *Conus cinereus* Poli ; *Conus erosus* Ren. ; *Conus olivaceus* Salis ; *Conus pyrulum* Broch. ; *Conus turriculus* Broch.].
- (11) *Conus mercator* Linné [Lmck., XI, 66 ; Encycl., pl. 333, fig. 7-9], Amérique, Afrique et Indes.
[Syn. : *Conus cuneus* Kiener].
- (11) *Conus testudinarius* Martini [Lmck, XI, 77 ; Encycl., pl. 335, fig. 5 et 6 ; Kiener, pl. 57], les Antilles.
[Syn. : *Conus aspersus* Sow.].
- (11) *Conus verulosus* Brug. (Lmck, XI, 102 ; Encycl., pl. 341, fig. 7], Amérique.
[Syn. : *Conus fusus* Dillw.].
- (12) *Conus amadis* Chemn. [Lmck, XI, 75 ; Encycl., pl. 335], Océan Indien.

- (12) *Conus episcopus* Brug. [Lmck, XI, 121 ; Encycl., pl. 345 ; Kien, pl. 91], Océan Indien.
- (12) *Conus textile* Linné [Lmck, XI, 123 ; Encycl., pl. 344, 345, 346, 347], Océan Indien.
[Syn. : *Conus euetrios* Kien. ; *Conus vicarius* Lamarck.]
- (13) *Conus australis* Chemnitz [Lmck, XI, 226], Océan Austral.
- (13) *Conus missatella* Linné [Lmck, XI, 113 ; Encycl., pl. 342, fig. 2-8 ; Kiener, pl. 53, fig. 2], Océan Indien.

FAMILLE DES STROMBIDÆ

Genre **Strombus** Linné

[Syn. : *Alatus* Humph. ; *Cassida* Linné ; *Conchilium* Brown ; *Pugil* Fabr. ; *Pyramea* Linck.]

SECTIONS

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) <i>Strombus</i> Linné. | (4) <i>Canarium</i> Schmch. |
| (2) <i>Monodactylus</i> Klein. | Syn. <i>Strombidea</i> Sow. |
| (3) <i>Gallinula</i> Klein. | — <i>Strombella</i> Schlüter. |
| | (5) <i>Conomurex</i> Bayle. |
- (1) *Strombus urceus* Linné, Océan Indien.
[Syn. : *Strombus incisus* Wood ; *Strombus ustulatus* Schmch.]
- (1) *Strombus dentatus* Linné, var. *plicatus* Lmck, Océan Indien.
- (1) *Strombus epidromis* Linné, Océan Indien.
- (1) *Strombus gracilior* Wood., Californie (LEPELTIER).
- (1) *Strombus pugilis* Linné, Grésil (GUERBETTE).
- (1) *Strombus lentiginosus* Linné, Océan Indien (GUERBETTE, IOBA).
- (2) *Strombus gallus* Linné, Océan Indien (M^{me} HERMITE).
- (2) *Strombus guttatus* Martini, Océan Indien.
- (2) *Strombus lobatus* Sow., Antilles.
[Syn. : *Strombus bituberculatus* Lmck.]'

- (2) *Strombus auris-Dianæ* Linné, Océan Indien (GUERBETTE.
[Syn. : *Strombus striato-granosus* Mörch.].
- (2) *Strombus tricornis* Lamarck, Suez (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Strombus Orientalis* Johns ; *Strombus pertinax* Duclos].
- (3) *Strombus isabella* Lamarck, Océan Indien.
- (3) *Strombus canarium* Linné, Océan Indien.
- (3) *Strombus vittatus* Linné, Océan Indien.
- (3) *Strombus minimus* Linné, Océan Indien.
[Syn. : *Strombus Troglodyte* Lmck.].
- (4) *Strombus gibberulus* Linné, Océan Indien.
[Syn. : *Strombus mauritianus* Issel].
- (4) *Strombus floridus* Lamarck, Océan Indien.
[Syn. : *Strombus epimellus* Duclos ; *Strombus flammeus* Mörch. ; *Strombus gibberulus* Meusch.].
- (4) *Strombus fasciatus* Born, Suez (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Strombus flavidulus* Meusch., *Strombus ismarius* Ducl. ; *Strombus lineatus* Lmck. ; *Strombus persicus*, Sow. ; *Strombus polyfasciatus* Chemn. ; *Strombus subulatus* Herbst.].
- (5) *Strombus luhuanus* Linné, Nouvelle Calédonie (M^{me} HERMITE).
[Syn. : *Strombus Lucanus* Linné ; *Strombus labrosus* Mke].
- (5) *Strombus cylindricus* Chemnitz, Ile Maurice.
[Syn. : *Strombus mauritianus* Lmck.].
- Strombus* sp., Suez.
- Strombus* sp., la Réunion (EUDEL).

Genre **Pterocera** Lamarck

[Syn. : *Harpago* Klein. ; *Digitata* Fabr.].

SECTIONS

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| (1) <i>Harpago</i> Klein. | (3) <i>Heptadactylus</i> Klein. |
| (2) <i>Millepes</i> Klein. | |
- (1) *Pterocera rugosa* Sowerby, Nossi-Bé (EUDEL).
[Syn. : *Pterocera arthritica* Bolt.]

- (1) *Pterocera chiragra* Linné, Océan Indien.
- (2) *Pterocera scorpio* Linné, Nossi-Bé (EUDEL).
[Syn. : *Pterocera nodosa* Sowerby].
- (3) *Pterocera aurantia* Lamarck, Nossi-Bé (EUDEL).
- (3) *Pterocera lambis* Linné, Nossi-Bé (EUDEL)
[Syn. : *Pterocera crocata* Link.].
- (3) *Pterocera sebæ* Valenc., Océan Indien.
[Syn. : *Pterocera bryonia* Chemn. ; *Pterocera Sowerbyi* Mörch. ; *Pterocera truncata* Lmck.].

Genre **Rostellaria** Lamarck

[Syn. : *Gladius* Klein ; *Tibia* Bolt ; *Rostellum* Mft.].

SECTIONS

- (1) *Rostellaria* Lamarck.
- (2) *Rimella* Agassiz.
- (1) *Rostellaria curvirostris* Lamarck, Moluque.
[Syn. : *Rostellaria brevirostra* Schmch. ; *Rostellaria dentata* Perry ; *Rostellaria fusus* Gmelin ; *Rostellaria magna* Chemnitz].

Genre **Aporrhais** Dacosta

[Syn. : *Tritonidium* Müll. ; *Chenopus* Philippi].

- Aporrhais serresianus* Mich., Ile Shetland, Marseille (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Aporrhais pes-carbonis* Brug.].
- Aporrhais pes-pelicans* Linné, La Rochelle, Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Aporrhais quadrifidus* Cost.].

Genre **Struthiolaria** Lamarck

SECTIONS

- (1) *Struthiolaria* Lmck.
- (2) *Pellicaria* Gray.
- (1) *Struthiolaria papulosa* Martyn., Nouvelle Hollande.
[Syn. : *Struthiolaria coronarium* Soland ; *Struthiolaria nodosa* Gray ; *Struthiolaria nodulosa* Lmck. ; *Struthiolaria papillosa* Gray].

Genre **Terebellum** Lamarck

[Syn. : *Seraphs* Mft. ; *Serapsis* Link. ; *Seraps* Fer. ;
Seraphys Gray ; *Terebrina* Rfq. ; *Lucis* Gistl ;
Artopoja Gistl.].

Terebellum subulatum Lamarck, Océan Indien.

FAMILLE DES CYPRÆIDÆ

Genre **Cypræa** Linné

[Syn. : *Peribolus* Adans ; *Cypriarius* Dum. ; *Erythræa*
Barcl.].

SECTIONS

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) <i>Cypræa</i> Linné. | (4) <i>Cypræovula</i> Gray. |
| (2) <i>Aricia</i> Gray. | Syn. <i>Cypræova</i> Sow. |
| (3) <i>Luponia</i> Gray. | — <i>Cypræovulum</i> Sow. |
| Syn. <i>Cyprædia</i> Sow. | — <i>Cypræovula</i> Flmg. |
- (1) *Cypræa felina* Gmelin, var. *ursellus* Gmelin [Lmck, X, 528 ; Encycl., pl. 356, fig. 6 ; Kiener, pl. XXXIII, fig. 4], la Réunion (EUDEL).
- (1) *Cypræa Oweni* Sow., la Réunion (EUDEL).
[Syn. : *Cypræa menkeana* Desh.].
- (1) *Cypræa tabescens* Solander [Lmck, X, 555 ; Kiener, pl. V, fig. 3], la Réunion (EUDEL).
- (1) *Cypræa microdon* Gray [Lmck, X, 564], Océan Pacifique.
- (1) *Cypræa lurida* Linné, Algérie (A. LETOURNEUX).
- (1) *Cypræa caurica* Linné, Océan Indien.
[Syn. : *Cypræa obscura* Gask.].
- (1) *Cypræa caurica* Linné, var. *Dracæna* Born., Océan Indien (LEPELTIER).
- (1) *Cypræa stolidia* Linné [Kiener, pl. XXXI, fig. 1 ; Lmck, X, 321], Mers de Chine.
[Syn. : *Cypræa rubiginosa* Gmelin].
- (1) *Cypræa hirundo* Linné [Lmck, X, 522 ; Encycl., pl. 356, fig. 6 et 15 ; Kien., pl. XXXII, fig. 1], Océan Indien (MALDIVE, M^{me} HERMITE).
- (1) *Cypræa Isabella* Linné, Océan Indien.
[Syn. : *Cypræa controversa* Gray.].
- (1) *Cypræa exanthema* Linné, Antilles (IOBA).
[Syn. : *Cypræa bifasciata* Gmelin ; *Cypræa zebra* Linné].

- (1) *Cypræa cervinetta* Kien., Océan Indien (IOBA).
- (1) *Cypræa scurra* Chemnitz, Océan Indien.
[Syn. : *Cypræa indica* Gmelin].
- (1) *Cypræa Argus* Linné, Océan Indien.
- (1) *Cypræa cruentata* Gmelin, var. *variolaria* Lamarck.
- (1) *Cypræa carneola* Linné, Océan Indien.
[Syn. : *Cypræa crassa* Gmelin].
- (1) *Cypræa cylindrica* Born [Lmck, X, 554 ; Kien., pl. XVI, fig. 3], Océan de Chine.
- (1) *Cypræa cinerea* Gmelin [Kien., pl. XXVI, fig. 2], Océan Indien (BOURGAULT-DUCOUDRAY).
[Syn. : *Cypræa sordida* Lmck.].
- (1) *Cypræa talpa* Linné, Océan Indien.
- (1) *Cypræa cervus* Linné, Antilles (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Cypræa cervina* Lmck., *Cypræa dubia* Gmelin ;
Cypræa plumbea Gmelin ; *Cypræa oculata* Gmelin].
- (2) *Cypræa moneta* Linné, Méditerranée.
- (2) *Cypræa histrio* Gmelin, Madagascar.
[Syn. : *Cypræa arlequina* Chemnitz].
- (2) *Cypræa arabica* Linné, Océan Indien.
[Syn. : *Cypræa amethystea* Linné ; *Cypræa fragilis* Linné].
- (2) *Cypræa arabica* Linné, var. *eglantina* Ducl., Mozambique.
- (2) *Cypræa arabicula* Lamarck [Lmck, X, 534 ; Kien, pl. 28, fig. 3], Mexique.
- (2) *Cypræa ventricula* Lamarck, Nouvelle Hollande.
[Syn. : *Cypræa achatina* Solander ; *Cypræa carneola* Martyn.].
- (2) *Cypræa obvelata* Lamarck [Lmck, X, 538], Nouvelle Hollande (LEPELTIER).
- (2) *Cypræa mappa* Linné, Océan Indien.
[Syn. : *Cypræa alga* Perry].
- (2) *Cypræa Scottii* Broderip, Iles Moluques,
[Syn. : *Cypræa Friendsi* Gray].
- (2) *Cypræa mauritiana* Linné, Ile Maurice (IOBA).
[Syn. : *Cypræa fragilis* Born. ; *Cypræa trifasciata* Gmelin ; *Cypræa undata* Chemnitz].

- (2) *Cypræa mauritiana* Linné, var. très jeune, Mer Rouge (M^{me} HERMITE).
- (2) *Cypræa annulus* Linné, Méditerranée.
[Syn. *Cypræa Hamyi* Rochbr. ; *Cypræa harmandiana* Rochbr. ; *Cypræa Perrieri* Rochbr.].
- (2) *Cypræa mus* Linné [Lmck, X, 500 ; Encycl., pl. 354, fig. 1 ; Chenu, I, p. 266, fig. 160], Océan Atlantique (Côtes d'Amérique).
[Syn. : *Cypræa bicornis* Sow.].
- (2) *Cypræa caput-serpentis* Linné, Océan Indien.
[Syn. : *Cypræa caput-anguis* Phil.].
- (2) *Cypræa stercoraria* Linné, var. *rattus* Lamarck, Océan Africain.
- (3) *Cypræa punctata* Linné [Encycl., pl. 355, fig. 10 ; Kiener, pl. 39, fig. 2], Indes (Ioba).
[Syn. : *Cypræa trizonata* Sow. ; *Cypræa stercus-muscarum* Lmck. ; *Cypræa atomaria* Gmelin].
- (3) *Cypræa cribraria* Linné [Lmck, X, 519 ; Encycl., pl. 355, fig. 5 ; Kien., pl. XXIX, fig. 1], Indes.
- (3) *Cypræa erronea* Linné, Océan Indien (M^{me} HERMITE, LEPELTIER).
[Syn. : *Cypræa olivacea* Lamarck ; *Cypræa ovum* Gmelin ; *Cypræa subflava* Gmelin].
- (3) *Cypræa onyx* Linné, Mers d'Asie, Mer Rouge (M^{me} HERMITE).
[Syn. : *Cypræa Nymphæ* Ducl. ; *Cypræa pulla* Gmel. ; *Cypræa succincta* Linné ; *Cypræa carnicolor* Ducl. ; *Cypræa adusta* Lmck.].
- (3) *Cypræa Zic-Zac* Linné [Lmck, X, 524 ; Encycl., pl. 356, fig. 8 ; Kiener, pl. XXXI, fig. 2], Zanzibar.
- (3) *Cypræa clandestina* Linné, Océan Asiatique.
[Syn. : *Cypræa Artuffeli* Jous. ; *Cypræa candida* Pse ; *Cypræa moniliaris* Lmck., 529].
- (3) *Cypræa diluculum* Reeve [Lmck, XI, 524 ; Enc., pl. 356, fig. 11 ; Kiener, pl. XXX, fig. 3], Océan Indien, Philippines (LE SOURD).
[Syn. : *Cypræa undata* Lmck.].
- (3) *Cypræa spurca* Linné, Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Cypræa lota* Linné ; *Cypræa flaveola* Lmck. ; *Cypræa acicularis* Gmelin].

- (3) *Cypræa poraria* Linné [Lmck, X, 527 ; Kiener, pl. 49, fig. 2 ; Encycl., pl. 356, fig. 4], Sénégal.
- (3) *Cypræa physis* Brocchi, Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Cypræa Grayi* Kiener ; *Cypræa achatidea* Sow.]
- (3) *Cypræa gangrenosa* Dillw. [Lmck, X, 561 ; Kiener, pl. L, fig. 2], Chine.
[Syn. : *Cypræa Reentsi* Dkr.]
- (3) *Cypræa punctulata* Gray [Lmck, X, 563 ; Kien., pl. XXI, fig. 2], Panama.
- (3) *Cypræa sanguinolenta* Gmelin [Lmck, X, 526 ; Encycl., pl. 356, fig. 12 ; Kiener, pl. 33, fig. 1], Indes.
- (3) *Cypræa turdus* Lamarck, Océan Indien (A. LETOURNEUX).
- (3) *Cypræa pyrum* Gmelin, Algérie (A. LETOURNEUX), Terracine (E. LETOURNEUX).
[Syn. : *Cypræa rufa* Lmck. ; *Cypræa petitiana* Cross. ; *Cypræa pumilio* Bucq. ; *Cypræa flaveola* Born., *Cypræa flavescens* Born. ; *Cypræa cinnamomea* Oliv.]
- (3) *Cypræa picta* Gray, Algérie (A. LETOURNEUX).
- (3) *Cypræa gracilis* Gask, la Réunion (EUDEL).
- (3) *Cypræa miliaris* Gmelin, Océan Indien.
- (3) *Cypræa erosa* Linné, Océan Indien (M^{me} HERMITE).
- (3) *Cypræa fusco-dentata* Gray, Zanzibar.
- (3) *Cypræa zonata* Chemnitz [Lmck, X, 510], Guinée.
[Syn. : *Cypræa zonaria* Gmelin].
- (3) *Cypræa pantherina* Solander, Océan Indien (IOBA).
[Syn. : *Cypræa guttata* Lmck. ; *Cypræa tigrina* Lmck.]
- (3) *Cypræa lynx* Linné, Océan Indien (M^{me} HERMITE).
[Syn. : *Cypræa squalina* Gmel. ; *Cypræa Vanelli* Linné.]
- (3) *Cypræa Cameleopardalis* Perry [Kiener, pl. XXIV], Zanzibar (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Cypræa melanostoma* Leath.]
- (3) *Cypræa vitellus* Linné, Océan Indien.
- (3) *Cypræa helvola* Linné [Lmck, X, 533 ; Encycl., pl. 356, fig. 3 ; Kien., pl. XXVIII, fig. 1], Océan Indien.
[Syn. : *Cyn. : Cypræa albella* Lmck.]

- (3) *Cypræa ocellata* Linné, Océan Indien.
 (3) *Cypræa asellus* Linné [Lmck, X, 528 ; Encycl., pl. 356, fig. 5 ; Kiener, pl. 31, fig. 3].
 [Syn. : *Cypræa fusco-maculata* Sow.].
Cypræa baladina s. a. et s. l.

Genre **Trivia** Gray

[Syn. : *Coccinella* Leach. ; *Trivea* Sow.].

SECTIONS

- (1) *Trivia* Gray. (3) *Epona* H. A. Ad.
 (2) *Pustularia* Gray.
 (1) *Trivia candidula* Gask., Alger (A. LETOURNEUX, JOLY).
 [Syn. : *Trivia approximans* Bk. ; *Trivia olorina* Ducl.].
 (1) *Trivia staphylæa* Linné, var. *limacina* Lmck [Lmck, X, 536 ; Kiener, pl. XXII, fig. 2 et XXV, fig. 1], Océan Indien.
 (1) *Trivia suffusa* Gray [Lmck, X 566], Bahama (LE SOURD).
 [Syn. : *Trivia armandina* Ducl.].
 (1) *Trivia australis* Lamarek [Lmck, X, 545 ; Kien., pl. 48, fig. 2], Nouvelle Hollande, Californie (LE SOURD).
 (1) *Trivia staphylæa* Linné [Lmck, X, 536 ; Encycl., pl. 355, fig. 3 ; Kiener, pl. III, fig. 2], Océan Indien (EUDEL).
 [Syn. : *Cypræa nucleus* Quoy ; *Cypræa interstincta* Wood.].
 (1) *Trivia Oryza* Lamarek [Lmck, X, 543], la Réunion (EUDEL).
 [Syn. : *Trivia intermedia* Kiener ; *Cypræa scabriuscula* Gray].
 (1) *Trivia pulex* Solander [Lmck, X, 569 ; Kien., pl. 53, fig. 1], Algérie (A. LETOURNEUX).
 [Syn. : *Trivia triticea* Bowdh. ; *Cypræa rosea* Req. ; *Cypræa lacrymalis* Mke ; *Cypræa lathyrus* Blainv ; *Cypræa mediterranea* Risso].
 (1) *Trivia Solandri* Gray [Kiener, p, 130, pl. 47, fig. 3].
 Océan Pacifique.

- (1) *Trivia ovulata* Lmck, var. *carnea* Lmck., X, 533 ; Encycl., pl. 355, fig. 2 ; Kiener, pl. 51, fig. 3, Océan Indien.
- (1) *Trivia europæa* Montagu, [Encycl., pl. 356, fig. 1 ; Kiener, pl. 40, fig. 2], Le Croisic (France), les Antilles Algérie (A. LETOURNEUX, JOLLY).
[Syn. : *Cypræa pediculus* Payr. ; *Cypræa sphæricula* Lmck ; *Cypræa quadripunctata* Sow. ; *Cypræa oryza* Cost. ; *Cypræa sulcata* Dillw. ; *Cypræa coccinella* Lmck., X, 544].
- (1) *Trivia Childreni* Gray, [Lmck, X, 566 ; Kiener, pl. XL, fig. 3], Océan Indien.
- (1) *Trivia insecta* Mighl. [Kiener, p. 149, pl. 54, fig. 5], la Réunion (EUDEL).
[Syn. : *Trivia hordeacea* Kiener].
- (1) *Trivia quadripunctata* Gray [Lmck, X, 369], Ile Saint-Thomas (LEPELTIER).
[Syn. : *Trivia rotunda* Kiener].
- (1) *Trivia exigua* Gray [Kien., p. 154, pl. 53, fig. 4], la Réunion (EUDEL).
[Syn. : *Trivia tremeza* Ducl.].
- (2) *Trivia staphylæa* Linné [Lmck, X, 534; Encycl., pl. 356, fig. 9 ; Kiener, pl. XXXVI, fig. 2], Océan Indien.
(Syn. : *Trivia interstincta* Wood ; *Trivia limacina* Lmck ; *Trivia nucleus* Quoy.)
- (2) *Trivia radians* Lamarck [Lmck, X, 540 ; Kiener, pl. XXIII, fig. 3], Mexique.
- (2) *Trivia pustulata* Lamarck [Lmck, X, 535 ; Kiener, pl. II, fig. 3], Mexique.
- (3) *Trivia cicercula* Linné [Lmck, X, 530 ; Encycl., pl. 355, fig. 1 ; Kiener, pl. L, fig. 3,4], Océan Indien.
- (3) *Trivia globulus* Linné [Lmck, X, 532 ; Encycl., pl. 356, fig. 2], Océan Indien.
[Syn. : *Cypræa affinis* Gmelin ; *Cypræa cicercula* var. Kien].

FAMILLE DES AMPHIPERASIDÆ

Genre **Ovula** Bruguière

[Syn. : *Conchilium* Tournf. ; *Licium* Humph. ; *Semiporcellana* Da Costa ; *Birostris* Fabr. ; *Ovulum* Sow. ; *Ovulus* Mft. ; *Amphiperas* Gronov.].

Ovula ovum Linné, Iles Moluques.

[Syn. : *Ovula alba* Schmeh. ; *Ovula oviformis* Lmck].

Ovula adriatica Sow. [Lmck, X, 476 ; Kien., pl. II, fig. 4], Adriatique.

[Syn. : *Ovula Virginea* Cantr.].

Ovula carnea Poir, Algérie.

[Syn. : *Ovula lactea* Cost. ; *Ovula triticea* Cost.].

Genre **Calpurnus** Mft.

[Syn. : *Cypræella* Sow.].

Calpurnus verrucosus Linné [Lmck, X, 469 ; Encycl., pl. 357, fig. 5 ; Kiener, pl. II, fig. 3], Océan Indien (LEPELTIER).

Genre **Cyphoma** Bolt.

[Syn. : *Ultimus* Mft. ; *Carinea* Sow. ; *Binovoluta* Schlüter].

Cyphoma gibbosa Linné [Encycl., pl. 357 ; fig. 4 ; Kiener, pl. II, fig. 2], Brésil.

[Syn. : *Cyphoma dorsata* Bolt. ; *Cyphoma pharetra* Perry].

Cyphoma intermedia Sowerby [Lmck, X, 476 ; Kiener, pl. IV, fig. 2], Rio de Janeiro (A. CLEMENSON).

Genre **Birostra** Lowerby

[Syn. : *Volva* Bolt. ; *Radius* Mft. ; *Rhizorus* Mft.].

Birostra volva Linné, Mers de Chine.

Genre **Simnia** Risso

[Syn. : *Volva* Flmg. ; *Neosimnia* Fsch. ; *Scymnia* Leach. ; *Calpurna* Flmg.].

Simnia spelta Linné [Lmck, XI, 43 ; Kien., pl. V, fig. 4], Algérie, (A. LETOURNEUX).

FAMILLE DES CANCELLARIIDÆ

Genre **Cancellaria** Lamarck

[Syn. : *Cancellarius* Mft. ; *Buccinella* Perry ; *Plicaria* Fabr.].

SECTIONS

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| (1) Cancellaria Lamarck. | (5) Merica H. A. Ad. |
| (2) Trigonostoma Blainville. | (6) Narona H. A. Ad. |
| (3) Aphaera H. A. Ad. | (7) Massyla H. A. Ad. |
| (4) Euclia H. A. Ad. | (8) Admete Kröyer. |
- (1) *Cancellaria cancellata* Linné, Alger (A. LETOURNEUX).

FAMILLE DES CERITHIDÆ

I. Subfamille des Cerithiinae

Genre **Cerithium** Brug.

[Syn. : *Anas* Klein ; *Clava* Humph ; *Camillus* Mft.].

Cerithium tuberculatum Linné, Mer Rouge (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Cerithium Janelli* Hombr., *Cerithium petrosus* Wood].

Cerithium stercus-muscarum Say, Floride (PETIT DE LA SAUSSAYE), Taïti (M^{me} HERMITE).

Cerithium litteratum Born, Antilles.
[Syn. : *Cerithium augustum* Ant.].

Cerithium sp., Égypte.

Cerithium mediterraneum Deshayes, Alger (A. LETOURNEUX).
(Syn. *Cerithium fuscum* Costa).

Cerithium nodulosum Bruguière, Nouvelle Zélande (M^{me} HERMITE).
[Syn. : *Cerithium aluco* Born. ; *Cerithium augustissimum* Wkf. ; *Cerithium tuberosum* Dillw.].

Cerithium Rüppelli Philippi, Suez (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Cerithium alucoides* Broch. ; *Cerithium Savignyi* Fsch. ; J. de conchyl, 1865, p. 144].

Cerithium erythræense Lamarck, Suez (VESCO, A. LETOURNEUX).

Cerithium uncinatum Gmelin, la Réunion (EUDEL).
[Syn. : *Cerithium famelicum* C. B. Ad.].

Cerithium vulgatum Brug., Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Cerithium alucoides* Oliv. ; *Cerithium Goumier* Adans. ; *Cerithium Legoumieri* Adans. ; *Cerithium Milne-Edwardsi* Calc. ; *Cerithium molucca-*

num Ren. ; *Cerithium Murex* Ant. ; *Cerithium nerinaceus* Riss. ; *Cerithium nodosum* Schrött ; *Cerithium subnodosum* Adans. ; *Cerithium thymetus* Meusch.].

Cerithium sp., Chine Boréale (VESCO).

Cerithium sp., Cochinchine (VESCO).

Cerithium rubus Martyn., Mer Rouge.

[Syn. : *Cerithium eximium* Sowerby ; *Cerithium mitræforme* Sowerby ; *Cerithium granosum* Kiener ; *Cerithium serratum* Wood. ; *Cerithium sordidulum* Gld.].

Cerithium Borni Sowerby, Cochinchine.

Cerithium ferrugineum Sa., var. *versicolor* C. B. Ad., Saint-Thomas (M^{me} HERMITE).

[Syn. : *Cerithium erienne* Valenc.].

Cerithium atratum Born., Antilles.

Cerithium touranense Soul., Touranne.

Cerithium janthinum Gld., la Réunion.

[Syn. : *Cerithium aspersum* Deshayes].

Cerithium conulus Ant., Alexandrie.

Cerithium morus Lamarck, la Réunion (EUDEL).

[Syn. : *Cerithium breve* Quoy ; *Cerithium carbonarium* Sow. ; *Cerithium concisum* Hombr. ; *Cerithium gemmulatum* Brug. ; *Cerithium moniliferum* Dufr. ; *Cerithium obscurum* Sow. ; *Cerithium variegatum* Quoy.].

Cerithium zebra Kiener, la Réunion (EUDEL).

Cerithium nodiferum Kiener, Suez.

Cerithium turritella Quoy, Océanie.

Cerithium papillosum Sowerby, la Réunion (EUDEL).

Cerithium zonale Kiener, Hong-Kong.

Cerithium apliense d'Orbigny, Algérie.

Cerithium sp., Suez (A. LETOURNEUX).

Cerithium sp., Suez (A. LETOURNEUX).

Cerithium sp., Touranne (VESCO).

Genre **Vertagus** Klein

[Syn. : *Aluco* Link ; *Rhinoclavis* Sowerby].

Vertagus cedo-nulli Sowerby, la Réunion (EUDEL).

[Syn. : *Vertagus cordigerus* Bayle].

Vertagus Cumingi A. Ad., Hong-Kong, Chine Boréale (EUDÉL).

Vertagus obeliscus Bruguières, les Antilles.

Vertagus fasciatus Bruguières, var. *procerum* Klein, s. l.

Vertagus subulatus Lamarek, Océan Indien.

Vertagus asper Linné, var. *lineatum* Lamarek, Australie.

Vertagus vulgaris Schmeh., Océan Indien.

[Syn. : *Vertagus vertagus* Linné].

II. Sous-famille des Potamidinæ

Genre **Bittium** Leach.

Bittium mamillatum Risso, Adriatique.

[Syn. : *Bittium conicum* Blainville; *Cerithium costatum* Risso; *Bittium acuminatum* Pse.; *Bittium afer* Sandri; *Bittium augustum* Desh.; *Bittium baccatum* Cost.; *Bittium danicum* BK.; *Bittium elongatum* Sow.; *Bittium ferrugineum* Middl.; *Bittium granulatum* Cost.; *Bittium granulosum* Risso; *Bittium lima* Brug.; *Bittium reticulatum* Cost.; *Bittium spina* Tiberi; *Bittium vulgatissimum* Clark.].

Genre **Triforis** Deshayes

[Syn. : *Tristoma* Blvll.; *Triphora* Sowerby; *Mastonia* Hinds].

SECTIONS

(1) *Triforis* Deshayes.

(3) *Sychar* Hinds.

(2) *Ino* Hinds.

(1) *Triforis Hindsii* Deshayes, la Réunion (EUDÉL).

(1) *Triforis perversus* Linné [Chenu, p. 284, fig. 1914] Algérie (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *Triforis granulosus* Seach.; *Triforis inversus* Cost.; *Triforis maroccanus* Brug.; *Triforis pallescens* Sow.; *Triforis seriatus* Mhlfd.; *Triforis striatus* Mhlfd.].

(1) *Triforis monilifer* Hinds, la Réunion (EUDÉL).

(1) *Triforis Adamsi* Deshayes, la Réunion (EUDÉL).

Triforis perlatus Issel, Suez.

Genre **Lampania** Gray

Lampania zonale Bruguières, Inde et Chine.

[Syn. : *Lampania pirenalis* Quoy ; *Lampania striatella* Dillw.].

Lampania australe Quoy, Sidney.

Genre **Potamides** Bruguières

[Syn. : *Potamida* Schweig. ; *Potamideum* Flmg. ; *Potamis* Sow. ; *Potomis* Sow.].

Potamides ebeninum Bruguières, Australie.

Genre **Tympanotomus** Klein

[Syn. : *Tympanostoma* Sow. ; *Potamis* Sow.].

Tympanotomus fluviatilis Potiez, Ceylan (IOBA).

[Syn. : *Tympanotomus alatus* Phil. ; *Tympanotomus incisus* Hombr. ; *Tympanotomus micropterus* Kie-ner ; *Tympanotomus radix* Duf.].

Tympanotomus fuscatus Linné, Gambie.

[Syn. : *Tympanotomus cingulatus* Gmelin ; *Cerithium granulatum* Lmck.].

Tympanotomus fuscatus Linné, var. *radula* Linné, Gambie.

[Syn. : *Tympanotomus aculeatus* Gmel. ; *Tympanotomus fluviatilis* Gmel. ; *Tympanotomus granulatus* Brug. ; *Tympanotomus terebella* Gmel.].

Genre **Pyrasmus** Mft.

[Syn. : *Terebralia* Sowerby].

Pyrasmus palustris Linné, Batavia (EUDEL).

Pyrasmus Caillaudi Pot. et Mich., Suez (A. LETOURNEUX).

Pyrasmus sulcatus Brug., Océan Indien.

[Syn. : *Pyrasmus fuscus* Gmel ; *Pyrasmus Mangiorum* Schröt.].

Genre **Telescopium** Chemnitz

Telescopium fuscum Schmch., Océan Indien.

[Syn. : *Cerithium telescopium* Linné ; *Telescopium indicator* Mft.].

Genre **Cerithidea** Sowerby

SECTIONS

- (1) *Cerithidea* Sowerby. (2) *Pirenella* Gray.
- (1) *Cerithidea varicosa* Sowerby, Inde.
[Syn. : *Cerithidea forticula* Bayle].
- (1) *Cerithidea Montagnei* d'Orbigny, Chili.
- (1) *Cerithidea Mærchi* A. Adams, Hong-Kong.
- (1) *Cerithidea obtusa* Lamarek, Cochinchine (VESCO).
[Syn. : *Cerithidea quadrata* Sow.].
- (1) *Cerithidea decollata* Linné, Baie de Lagos.
[Syn. : *Cerithidea pulcher* Dillw.].
- (1) *Cerithidea Lafondi* Mich., la Havane (CALVERT).
- (2) *Cerithidea sacrata* Gould., Monterey (DUPUY).
[Syn. : *Cerithidea californica* Hldm. ; *Cerithidea pul-
lata* Gould.].

FAMILLE DES LITTORINIDÆ

Genre **Littorina**

[Syn. : *Bacalia* Gray]

SECTIONS

- (1) *Littorina* Férussac. (3) *Neritoides* Brown.
- (2) *Melaraophe* Mhlfd. (4) *Cremnoconchus* Stolicz.
- (1) *Littorina malaccana* Philippi, Poulo-Penang.
- (1) *Littorina tenebrosa* Mtg., Le Croisic.
- (1) *Littorina rudis* Mat., Pornichet.
[Syn. : *Littorina compressa* Sow. ; *Littorina globosa*
Dkr. ; *Littorina lævis* Sow. ; *Littorina rudissima*
Bean ; *Littorina similis* Sow. ; *Littorina sulcata*
Leach. ; *Littorina zonaria* Bean.].
- (1) *Littorina littorea* Linné, Le Croisic.
Syn. : *Littorina communis* Thomps ; *Littorina pau-
percula* Sow. ; *Littorina sinistrorsa* Sow. ; *Littorina*
turrita A. Adams ; *Littorina vulgaris* Sow.].

- (1) *Littorina obesa* Sowerby, Nouka-Iva.
 - (1) *Littorina grælandica* Chemnitz, Groënland.
 - (1) *Littorina lævis* Philippi, la Réunion.
 - (2) *Littorina undulata* Gray, Antilles.
[Syn. : *Littorina contracta* Nevil.].
 - (2) *Littorina grano-costata* Reeve, Australie.
 - (2) *Littorina angulifera* Lamarek, Antilles, Saint-Thomas.
[Syn. : *Buccinum lineatum* Gmelin.]
 - (2) *Littorina araucana* d'Orbigny, Araucanie.
 - (2) *Littorina ambigua* Nuttal, Saïgon.
 - (2) *Littorina punctata* Gmelin, Gorée, la Réunion, Égypte.
[Syn. : *Littorina marmata* Adams].
 - (2) *Littorina zebra* Woodward, Pérou.
[Syn. : *Littorina peruviana* Lamarek.].
 - (2) *Littorina pintado* Woodward, la Réunion.
[Syn. : *Littorina tenebrata* Nuttall].
 - (2) *Littorina mauritiana* Lamarek, la Réunion, Sydney.
 - (2) *Littorina mauritiana* Lamarek, variété, la Réunion.
 - (2) *Littorina reticulata* Ant., la Réunion.
 - (2) *Littorina lineata* d'Orbigny, les Antilles.
 - (2) *Littorina syriaca* Philippi, Saïda.
 - (2) *Littorina carinifera* Mke, Philippines.
[Syn. : *Littorina perdix* King.].
 - (2) *Littorina ziczac* Chemnitz, la Réunion.
 - (3) *Littorina arctica* Müller, Groënland.
 - (3) *Littorina irrorata* Say, Floride.
 - (3) *Littorina neritoides* Linné, Le Croisic.
[Syn. : *Littorina cærulea* Cost.; *Littorina cærulea* Cost.
Littorina elegans Risso ; *Littorina glabrata* Mhlfd. ;
Littorina labiata Brown. ; *Littorina Lemani* Dll.
Ch. ; *Littorina melanostoma* Kryn. ; *Littorina*
petreus Montagu ; *Littorina petricola* Leach. ; *Litto-*
rina petrosa Gray. ; *Littorina saxatilis* Oliv.].
 - (3) *Littorina neritoides* Linné, var. *Basteroti* Payr., Au-
triche.
- Littorina cærulescens* Lamarek, Le Croisic, Alger.
[Syn. : *Littorina cærulescens* Lmck].

Littorina obtusata Linné, Le Croisic.

[Syn. : *Littorina ustulata* Bivona ; *Littorina æstuaris* Jeffreys ; *Littorina compacta* Carp.

Littorina retusa Lamarek, Le Croisic.

Littorina sp., Suez.

Littorina sp., Nouvelle Zélande.

Genre **Tectarius** Valenciennes

[Syn. : *Tectaria* Guérin ; *Pagodus* Gray ; *Pagodella* Sow. ; *Tectus* Mft.]

Tectarius nodulosus Gmelin, la Guadeloupe.

Tectarius muricatus Linné, les Antilles

Tectarius armatus Issel, Suez.

Genre **Risella** Gray

[Syn. : *Bembicium* Philippi].

SECTIONS

(1) *Risella* Gray.

(2) *Sensiella*.

Risella infracostata Issel, Suez.

Genre **Lacuna** Turt.

[Syn. : *Temana* Leach.].

SECTIONS

(1) *Lacuna* Turt.

(2) *Medoria* Leach.

(2) *Epheria* Leach.

(1) *Lacuna puteola* Turt., Le Pouliguen (France).

[Syn. : *Lacuna auricularia* Turt. ; *Lacuna clausa* Sow. ; *Lacuna conica* Sow. ; *Lacuna expansa* Sow. ; *Lacuna lactea* Sow. ; *Lacuna Montagnei* Sow. ; *Lacuna plicata* Sow. ; *Lacuna rufa* Montagu ; *Lacuna sulcata* Macgillv.].

(1) *Lacuna pallidula* Cost., Piriac (Loire-Inférieure).

(1) *Lacuna arctica* Philippi, Groenland.

(2) *Lacuna vineta* Montagu, Le Croisic (Loire-Inférieure).

(2) *Lacuna divaricata* Fabr., Côtes de France.

[Syn. : *Lacuna pertusa* Fabr.].

FAMILLE DE RISSOIDÆ

Subfamille des Rissoininae

Genre **Rissoina** d'Orbigny

SECTIONS

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| (1) <i>Rissoina</i> d'Orbigny. | (6) <i>Moerchiella</i> Nevil. |
| (2) <i>Zebina</i> H. A. Ad. | (7) <i>Pyramidelloides</i> Nevil. |
| (3) <i>Schwartziella</i> Nevil. | (8) <i>Travadia</i> Blfd. |
| (4) <i>Phosinella</i> Mörch. | (9) <i>Isseliella</i> Nevil. |
| (5) <i>Zebinella</i> Mörch. | |

(1) *Rissoina myosoroides* Recluz., la Réunion.

(1) *Rissoina Bertheloti* Audouin, Suez.

(1) *Rissoina Bruguieri* Payr., Alger.

[Syn. : *R. conifera* Mtg. ; *R. roseotincta* Bucq.].

(1) *Rissoina cerithina* Philippi, Suez.

(2) *Rissoina bidentata* Philippi, la Réunion.

(2) *Rissoina coronata* Recluz, la Réunion.

(3) *Rissoina scalariformis* C.-B. Adams, la Réunion.

(4) *Rissoina seguenziana* Issel, Suez.

Rissoina distans Antony, la Réunion.

Genre **Barleia** Clark.

Barleia rubra A. Adams, Côtes d'Algérie.

[Syn. : *B. albescens* Monteros, *B. aurantiaca* Brus, *B. elongata* Poey, *B. fulva* Mich., *B. pallida* Monteros, *B. trifasciata* A. Adams, *B. unifasciata* Montagu, *Turbo ruber* A. Ad.].

Subfamille des Rissoinae

Genre **Rissoa** Fremvill.

[Syn. : *Loxostoma* Biv., *Lamarckia* Leach., *Rissoaria* Agass., *Gonostoma* Mhlfd., *Anatasia* Gistl.].

SECTIONS

(1) *Rissoa* Fremv.

(2) *Acme* Hrtm.

Syn. *Zippora* Leach.

- (1) *Rissoa rudis* Philippi, Alger.
- (1) *Rissoa monodonta* Biv., Alger.
[Syn. : *Rissoa subcarinata* Cantr.].
- (1) *Rissoa octona* Sars., Danemarck.
- (1) *Rissoa variabilis* Mhlfd., Alger.
[Syn. : *R. costulata* Risso, *R. Demaresti* Forb., *R. Desmaresti* Recluz, *R. rissoana* Dll. Ch.].
- (1) *Rissoa similis* Scacchi, Alger, Le Croisic (France).
[Syn. : *R. apiculata* Sandri, *R. arata* Recluz, *R. ova-*
tella Forb.].
- (1) *Rissoa rufilabris* Leach., var. *lilacina* Recluz, Ajaccio.
- (1) *Rissoa ventricosa* Desm., Mer Adriatique, Mer Méditerranée.
[Syn. : *Rissoa membranacea* Arad., *R. punctata* Monterosato, *R. subventricosa* Cantr.].
- (1) *Rissoa parva* Da Costa, Alger.
[Syn. : *R. alba* Flmg., *R. cerasina* Brusin, *R. discrepans* Brown., *R. fasciata* Brown., *R. matoniana* Recluz, *R. Philippsii* Da Costa, *R. semicostula* Ant., *R. sublutea* A. Adams, *Turbo aerens* Adams, *T. albulus* Adams, *T. costatus* Lmck., *T. lacteus* Donov., *T. parvus* Mat.].
- (1) *Rissoa lineolata* Mich., Alger.
[Syn. : *R. ænonensis* Brusina, *R. Ehrenbergii* Philippi].
- (1) *Rissoa Guerini* Recluz., var. *decorata* Philippi, Mer Adriatique.
- (1) *Rissoa splendida* Eichw., Mer Adriatique.
[Syn. : *R. violastoma* Kryn., *R. ornata* Philippi].
- (1) *Rissoa Algeriana* Monterosato, Alger.
- (2) *Rissoa auriscalpium* Linné, Alger.
[Syn. : *R. acuta* Desm., *R. Drummondi* Leach., *R. expansilabris* Bucq., *R. marginata* Mtg., *R. pulchella* Risso, *R. Vitrea* Req., *Turbo marginatus* Wd.].
- (2) *Rissoa membranacea* A. Adams, Mer Adriatique.
[Syn. : *R. costata* A. Adams. *R. fragilis* Mich., *R. pulla* Brown., *R. souleyetiana* Recluz].
- Rissoa reticulata* Montagu, Alger.
- Rissoa Gougeti* Mich., Gorée.
- Rissoa rosea* Hutt., la Réunion.

Rissoa vulgaris, Mer Adriatique.

Rissoa nitens Ben., la Réunion.

Genre **Cingula**

[Syn. : *Sabinæa* Leach.].

Cingula tiberiana Issel, Suez.

Cingula glabrata Muhlf., Alger.

[Syn. : *C. punctulata* Phl.].

Cingula seminulum Monterosato, Côtes d'Algérie.

[Syn. : *C. seminuda* Monterosato].

Cingula cancellata Cost., Algérie.

[Syn. : *Cingula cimex* Flmg., *C. crenulata* Mich., *Alvania verrucosa* Risso].

Cingula semistriata Montagu, Alger.

Cingula inconspicua C.-B. Alder, Alger.

[Syn. : *Rissoa granulum* Phl.].

Genre **Alvania** Risso

[Syn. : *Persephona* Leach., *Cyclostrema* Flmg., *Turbona* Leach.].

Alvania labiata Philippi, Alger.

[Syn. : *A. monilis* Turt.].

Alvania lactea Michelin, Alger.

[Syn. : *Rissoa textilis* Sandri, *Turbo cancellatus* Lmck.].

Alvania Lanziæ Calc., Alger.

Alvania violacea Desm., Alger.

[Syn. : *Rissoa tricolor* Risso, *R. amethystina* Ren., *R. porifera* Loven, *R. punctata* Mich., *Turbo mavors* Brusin].

Alvania dictyophora Philippi, Alger.

Alvania Montagui Payr., Côtes d'Algérie.

[Syn. : *Alvania Montacuti* Jeffr., *Rissoa buccinoides* Desh., *Alvania costata* Seach., *A. Nicolosiana* Arad., *A. Sardea* Risso, *A. schwartziana* Brus., *A. tereticosta* Biv.].

Alvania pagodula Bucq., var. *philippiana* Jeffreys, Côtes d'Algérie.

Alvania melanostoma Req., Alger.

Alvania cimax Linné, Algérie.

[Syn. : *Rissoa cancellata* Desm., *Alvania Freminvillei* Risso].

Alvania Mariæ d'Orbigny, Mer Adriatique.

[Syn. : *Alvania Cimax* Brocchi, *Turbo calathiscus* Mtg.].

Subfamille des Skeneinæ

Genre **Skenea** Flmg.

Skenea planorbis Fabr., Algérie.

[Syn. : *Skenea depressa* Mtg.]

Subfamille des Pomatiopsinæ

Genre **Pomatiopsis** Tryon

Pomatiopsis lapidaria Say, Clermont (Ohio).

FAMILLE DES TURRITELLIDÆ

Genre **Turritella** Lamarck.

[Syn. : *Monoceros* Meusch., *Xyclohelyx* Ch., *Terebellum* Gray, *Turris* Humph., *Terebra* Fabr., *Epitonium* Klein, *Aculea* Perry, *Turritiles* Mft.].

SECTIONS

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| (1) <i>Turritella</i> Lamarck. | (5) <i>Mesalia</i> Gray. |
| (2) <i>Haustator</i> Mft. | (6) <i>Eglisia</i> Gray. |
| (3) <i>Torcula</i> Gray. | (7) <i>Mathilda</i> Brown. |
| (4) <i>Zaria</i> Gray. | |

(1) *Turritella communis* Risso, Le Croisic.

(1) *Turritella communis* Risso, var. *ungulina* Linné, Kat-tégat.

(1) *Turritella terebra* Linné, Océan Indien.

(4) *Turritella duplicata* Linné, var. *replicata* Linné, Océan Indien.

(5) *Turritella lactea* Möll, var. *reticulata* Mighl., Groenland.

(6) *Turritella cingulata* Sowerby, Californie.

Turritella triplicata Studer, Algérie.

[Syn. : *Turr.* : *imbricata* Seach.].

FAMILLE DES CÆCIDÆ

Genre **Cæcum** Flmg.

[Syn. : *Brochus* Brown., *Odontidium* Philippi, *Cor-
nuoides* Brown., *Cæcalium* Macgilv., *Odontina*
Zborz., *Odontostoma* Cantr.].

Cæcum trachea Montagu, Le Croisic.

[Syn. : *Cæcum imperforata* A. Ad., *C. striatus* Mtg.,
C. trachiformis Mtg.].

Cæcum annulatum Brown., Suez.

FAMILLE DES VERMETIDÆ

Genre **Vermiculus** Lamarck.

[Syn. : *Tubulus* Sismond, *Vermicularis* Lmck., *Ver-
metus* Gray.].

Vermiculus lumbricalis Gmelin, Sénégal.

Vermiculus bicarinatus Desh., Sénégal.

[Syn. : *Vermiculus Knorri* Deshayes. *Vermiculus
lumbricalis* d'Orb.].

Genre **Vermetus** Adans

[Syn. : *Campulotus* Guett.].

SECTIONS

(1) *Vermetus* Adans.

(3) *Macrophragma* Crptr.

(2) *Petalconchus* Lea.

(4) *Aletes* Crptr.

Vermetus roseus Quoy et Gaimard.

FAMILLE DES ONUSTIDÆ

[Syn. : *Phoridæ*].

Genre **Xenophora** Fschr.

[Syn. : *Phorus* Mft., *Xenophorus* Phl.].

Xenophora conchyliophora Born., Antilles.

[Syn. : *X. agglutinans* Lmck., *X. lævigata* Fischer,
X. meandrina Fschr., *X. onusta* Reeve, *X. tricos-
tata* Fschr., *X. trochiformis* Born., *X. vulcanica*
Fschr.].

FAMILLE DES CALYPTRÆIDÆ

Genre **Calyptræa** Lamarck.

[Syn. : *Calyptraea* Humph., *Calyptrus* Mft., *Calyptria* Owen, *Mitularia* Schmch., *Lithedaphus* Owen, *Litholepas* Owen].

Calyptræa equestris Linné, la Réunion.

[Syn. : *C. cancellata* Ad. et Rv., *C. Dillwyni* Gray, *C. longirostris* Owen, *C. pileopsis* Quoy, *C. radiosa* Gld., *C. Roissyi* Duf.].

Genre **Crucibulum** Schmch.

[Syn. : *Biconia* Sow., *Calypeopsis* Brod.].

SECTIONS

- (1) *Crucibulum* Schmch. (2) *Dispotæa* Say.
Syn. *Calypeopsis* Less.

- (1) *Crucibulum scutellatum* Gray, Amérique.
[Syn. : *Crucibulum gemmaceum* Val., *Cr. pectinatum* Crptr., *Cr. planatum* Mörch, *Cr. rude* Brod., *Cr. rugosum* Less., *Calyptraea umbrella* Desh.].

Genre **Trochita** Schmch.

[Syn. : *Luna* Klein, *infundibulum* d'Orb., *Trocharella* Less., *Trochulina* Gray.].

SECTIONS

- (1) *Trochita* Schmch. (2) *Haliotideia* Sowerby.
- (1) *Trochita radians* Deshayes, Pérou.
[Syn. : *Tr. ventricosa* Crptr.].
- (2) *Trochita sinensis* Linné, Piriac (France).
[Syn. : *Tr. carinaria* Bon., *Tr. chinensis* Linné, *Tr. Sismaschko* Lmck., *Tr. spinulosa* Chemnitz, *Tr. squama* Desh.].

Genre **Crepidula**

[Syn. : *Crypta* Humph., *Crepidulus* Mft., *Sandalium* Schmch., *Prozenula* Perry].

SECTIONS

- (1) *Crypta* Humph. (4) *Ergea* H. A. Ad.
Syn. *Siphopatella* Less.
- (2) *Crepidatella* Less.
- (3) *Janacus* Mörch.

- (1) *Crepidula fornicata* Linné, Barbades.
[Syn. : *Cr. depressa* Say, *Cr. gibbosa* Defr., *Cr. maculosa* Conr., *Cr. nauratami* Mörch., *Cr. Russi* Dkr..]
- (1) *Crepidula Moulinsi* Michaud, Alger.
[Syn. : *Cr. pulchella* Arad., *Cr. fornicata* Cost., *Cr. gibbosa* Phil.]
- (3) *Crepidula unguiformis* Lamarek, Algérie.
[Syn. : *Cr. calceolina* Desh., *Cr. candida* Risso, *Cr. cochlear* Linné, *Cr. italica* Defr., *Cr. sinuosa* Turton].
- (4) *Crepidula plana* Ad. et Reeve, Renang.

FAMILLE DES PILEOPSIDÆ

Genre **Pileopsis** Lamarek

[Syn. : *Capulus* Mft., *Galerita* Brogn., *Actica* Fschr., *Spiracella* Rang., *Acroculia* Philpps.]

SECTIONS

- (1) *Capulus* Mft. (3) *Thyca* H. A. Ad.
(2) *Capulacmea* Sars.
Syn. : *Piliscus* Loven.
- (1) *Pileopsis Hungaricus* Linné, Algérie.
[Syn. : *P. compressa*, *P. militaris* Macgil., *Hipponyx maximus* Schmch.].

Genre **Hipponyx** Defrance

[Syn. : *Cochlolepas* Klein, *Cochlearia* Klein.]

SECTIONS

- (1) *Hipponyx* Defr. (2) *Amalthea* Schmch.
Syn. *Sabia* Gray.

Hipponyx cassida Deshayes, la Réunion (Eudel).

Hipponyx incurva Deshayes, la Réunion (Eudel).

FAMILLE DES NERITOPSIDÆ

Genre **Neritopsis** Grtlp.

[Syn. : *Radula* Gray.].

Neritopsis radula Linné, la Réunion (Eudel).

FAMILLE DES NERITIDÆ

Genre **Nerita** Linné

[Syn. : *Odontostoma* Klein, *Neritarius* Dum.]

SECTIONS

(1) *Nerita* Linné. (3) *Thelicostyla* Mörch.

(2) *Peloronta* Oken.
Syn. *Pila* Klein.

(1) *Nerita lineata* Chemnitz, Penang.

(1) *Nerita histrio* Linné, Océan Indien.

(1) *Nerita polita* Linné, Océan Indien.

(2) *Nerita Deshayesi* Recluz, Nouvelle Calédonie.

(2) *Nerita Antillarum* Gmelin, la Réunion (EUDEL).

(2) *Nerita plicata* Linné, Océan Indien.

(3) *Nerita atropurpurea* Recluz, Penang.

(3) *Nerita albicilla* Linné, Madagascar.

(3) *Nerita exuvia* Linné, Océan Indien.

(3) *Nerita atrata* Chemnitz, la Réunion (EUDEL).

Nerita undata Linné, Océan Indien.

Nerita peloronta Linné, Saint-Thomas.

Nerita sp., Taïti.

Nerita Mauritiæ Recluz, Sidney.

[Syn. : *Nerita atrata* Seguenz., *N. nigerrima* Chemnitz].

Nerita sp., Nouvelle Calédonie.

Nerita erythræa Mus. P., Suez.

Genre **Navicella** Lamarck.

[Syn. : *Catillus* Humph., *Cimber* Mft., *Cibota* Brown.]

SECTIONS

(1) *Navicella* Lmck.

(4) *Paria* Gray.

(2) *Septaria* Fer.

(5) *Stenopoma* Gray.

(3) *Elara* H. A. Ad.

(1) *Navicella porcellana* Linné, Ile Maurice.

FAMILLE DES TROCHIDÆ

Subfamille des Phasianellinæ

[Syn. : *Eutropiinæ*].

Genre **Phasianella** Lamarck.

[Syn. : *Eutropia* Humph., *Phasianus* Mft., *Orthopnæa* Gistl.].

SECTIONS

- | | |
|--|----------------------------|
| (1) <i>Eutropia</i> Humph. | (3) <i>Eucosmia</i> Crptr. |
| (2) <i>Tricolia</i> Risso. | |
| (2) <i>Phasianella capensis</i> Dkr., la Réunion (Eudel). | |
| (2) <i>Phasianella pullus</i> Linné, Le Croisic. | |
| (2) <i>Phasianella tenuis</i> Mich., Adriatique. | |
| (2) <i>Phasianella tenuis</i> Mich., var. <i>intermedia</i> Scach., Algérie, | |
| (2) <i>Phasianella umbilicata</i> d'Orbigny, Antilles. | |
| (2) <i>Phasianella speciosa</i> Mhlfd., var. <i>Vieuxi</i> Payr., Algérie. | |
| (2) <i>Phasianella tessellata</i> C. B. Ad., Océan Indien. | |
| <i>Phasianella bulimoides</i> Lamarck, Australie. | |

Subfamille des Turbininæ

Genre **Turbo** Linné

[Syn. : *Fornax* Klein, *Olearia* Klein, *Saccus* Klein, *Lunaria* Fabr., *Cidaris* Ch.].

SECTIONS

- | | |
|--|----------------------------------|
| (1) <i>Turbo</i> Linné. | (4) <i>Marmorostoma</i> Sowerby. |
| (2) <i>Senectus</i> Humph. | Syn. <i>Lunella</i> Bolt. |
| Syn. <i>Lunatica</i> Bolt. | (5) <i>modelia</i> Gray. |
| — <i>Batillus</i> Schmch. | (6) <i>Prisogaster</i> Mörch. |
| (3) <i>Sarmatus</i> Gray. | (7) <i>Callopoma</i> Gray. |
| Syn. <i>Cidaris</i> Sowerby. | (8) <i>Ninella</i> Gray. |
| (1) <i>Turbo filifer</i> Deshayes, la Réunion (Eudel). | |
| (1) <i>Turbo imperialis</i> Gmelin, Chine. | |

- (1) *Turbo petholatus* Linné, Indes.
- (2) *Turbo ticanoicus* Reeve, Bimlipatam.
- (2) *Turbo margaritaceus* Linné, la Réunion.
- (2) *Turbo chemnitzianus* Reeve, Suez.
- (2) *Turbo argyrostomus* Linné, la Réunion.
[Syn. : *Turbo margaritaceus* Reeve].
- (4) *Turbo granulatus* Gmelin, Hong-Kong.
- (4) *Turbo coronatus* Gmelin, Nossi-Bé.
- (6) *Turbo araucanus* Chemnitz, Chili.
Turbo semi-lugubris Deshayes, la Réunion.
Turbo diaphanus Gmelin, Nouvelle-Zélande.
Turbo sp., Gabon.

Subfamille des Astralinæ

Genre **Astralium** Link.

[Syn. : *Imperator* Mft., *Hercoles* Mft., *Canthorbis* Sowerby, *Tubicanthus* Sowerby].

SECTIONS

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (1) <i>Astralium</i> Link. | — <i>Cyclocantha</i> Sow. |
| (2) <i>Stella</i> Klein. | — <i>Sol.</i> Klein. |
| Syn. <i>Calcar</i> Mft. | — <i>Stellaria</i> Schmdt. |
- Australium longispinum* Lamarck, Suez, Océan Indien.

Genre **Pachypoma** Gray.

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| (1) <i>Pachypoma</i> Gray. | (4) <i>Cookia</i> Less. |
| (2) <i>Lithopoma</i> Gray. | (5) <i>Bolma</i> Risso. |
| (3) <i>Pomaulax</i> Gray. | |
- (5) *Pachypoma rugosa* Linné, Algérie.
[Syn. : *Turbo cumanensis* Val., *Pachypoma solaris* Broch.].

Subfamille des Liotinæ

Genre **Circulus** Jeffr.

Circulus striatus Philippi, Alger.
[Syn. : *Skenea striata* Arad., *Skenea striatula* Wkf.]

Genre **Adeorbis** S. Wood

Adeorbis subcarinata Mtg., Alger.

Subfamille des *Rotellinæ*

[Syn. : *Umboninæ*].

Genre **Rotella** Lamarck .

[Syn. : *Umbonium* Link., *Globulus* Schmeh., *Helicina* Gray, *Pitonillus* Mft., *Ptychomphalus* Agas.]

SECTIONS

(1) *Rotella* Lamarck.

(2) *Ethalia* H. A. Ad.

Syn. *Pseudorotella* Fisch.

(1) *Rotella suturalis* Lamarck, Inde.

(1) *Rotella vestiaria* Linné, var. *rosea* Lamarck, Océan Indien.

(1) *Rotella vestiaria* Linné, var. *lineolata* Lamarck, Océan Indien.

Rotella sp., Océan Indien.

Rotella sp., Océan Indien.

Subfamille des *Trochinæ*

Genre **Delphinula** Lamarck

[Syn. : *Angaria* Bolt., *Delphinulus* Mft., *Scalator* Gistl.].

Delphinula laciniata Lamarck, Océan Indien.

Genre **Livona** Gray

[Syn. : *Turbo* Adans, *Tigris* Klein., *Meleagris* Mft., *Meleager* Grffth., *Cittarium* Philippi].

Livona pica Linné, Mers équatoriales.

Genre **Trochus** Linné

Trochus auratus Quoy, Sydney.

Trochus tinei, Calcare.

Syn. : *Tr. otavianus* H. et A. Ad.

Trochus modulus Linné, Mer Rouge.

Trochus australis Deshayes, Suez.

Trochus sp., Maroc.

Trochus sp., Suez.

Genre **Pyramidea** Sowerby

[Syn. : *Tectus* Mft., *Pyramis* Schmeh.].

Pyramidea dentata Forsk, Suez.

Genre **Polydonta** Schmeh.

[Syn. : *Lamperostoma* Sowerby].

SECTIONS

(1) *Polydonta* Schmeh.

(2) *Carinidea* Sowerby.

Syn. *Infundibulum* Mft

(1) *Polydonta viridis* Gmelin, Golfe d'Anjouan.

(2) *Polydonta concava* Gmelin, la Réunion (EUDEL).

Genre **Clanculus** Mft.

[Syn. : *Clangulus* Blvll., *Fragella* Sowerby, *Otavia* Risso].

Clanculus Jussieui Payr., Alger.

[Syn. : *Cl. Blainvillei* Cantr., *Cl. glomus* Philippi. *Cl. petholatus* Gmelin].

Clanculus floridus Philippi, la Réunion (EUDEL).

Clanculus Vielloti Payraudeau, Alger.

Clanculus pharaonis Linné, Suez.

Clanculus villanus Philippi, Alger.

Clanculus puniceus Philippi, Suez.

Genre **Monodonta** Gmelin

[Syn. : *Labio* Oken, *Monodontes* Mft., *Odontis* Sowerby, *Trochidon* Sowerby, *Monodon* Schwg., *Unidens* Schinz.]

Monodonta turbinata Born., Sydney, Alger.

[Syn. : *M. lineata* Pult., *M. punctulata* Bl., *M. sutis* Recluz., *M. tessellata* Ch.].

Monodonta dama Philippi, Suez.

Monodonta labio Linné, Côtes d'Afrique.

Monodonta tridentata Pot. et Mich., Valparaiso.

Genre **Euchelus** Philippi

[Syn. : *Aradasia* Gray].

SECTIONS

(1) *Euchelus* Philippi.

(2) *Perinia* H. A. Adans

Euchelus fimbriatus Pse, Nouvelle Hollande.

Euchelus indicus A. Adams, Océan Indien.

Genre **Thalotia** Gray

Thalotia conica Gray, var. *Lehmanni* Mrts, Nouvelle Hollande.

Genre **Zizyphinus** Leach

[Syn. : *Trochilus* Humph., *Conulus* Nardo, *Calliostoma* Söwerby, *Callistomus* Herms].

Zizyphinus corallinus Monterosato, Côtes d'Algérie.

Zizyphinus Laugierii Payraudeau, Algérie.

Zizyphinus Gualtieri Philippi, Mer Méditerranée.

[Syn. : *Zizyphinus lævigatus* Philippi].

Zizyphinus millegranus Philippi, Marseille.

[Syn. : *Zizyphinus Cleandi* Wood., *Zizyphinus Martinii* E. Smth., *Zizyphinus miliaris* Scach.].

Zizyphinus Montacuti Wood Alger.

[Syn. : *Z. cyrneus* Req., *Z. damnoniensis* Leach., *Z. Racketti* Payr., *Z. Montagui* Gray.]

Zizyphinus exasperatus Pennant, Algérie.

[Syn. : *Z. bicolor* Risso, *Z. crenulatus* Brocchi, *Z. elegans* Blainville, *Z. erythroleucus* Lmck., *Z. exiguus* Pultn., *Z. Jacobii* Arad., *Z. Matoni* Payr., *Z. pyramidatus* Lmck., *Z. tricolor*. Risso].

Zizyphinus bicingulatus Lamarck var. *bicinctus* Philippi, Suez.

Zizyphinus papillosus Cost., Alger.

Zizyphinus striatus Linné, Alger, Saint-Domingue.

[Syn. : *Z. conicus* Donovan., *Z. depictus* Deshayes, *Z. erythroleucus* Gmelin, *Z. flammulatus* Blainv., *Z.*

interruptus Wood, *Z. parvus* Cost., *Z. punctatus* Chemnitz, *Z. punctulatus* Gmelin, *Z. Sartorii* Arad.].

Zizyphinus jujubinus Gmelin, Le Croisic.

[Syn. : *Z. zizyphinus* Linné].

Zizyphinus conulus Linné, Le Croisic, Alger.

[Syn. : *Z. cingulatus* Bro., *Z. hyacinthus* Blvll., *Z. solidus* Blvll., *Z. vulgaris* Gray.]

Zizyphinus erythræus Chemnitz, Suez.

Zizyphinus conuloides Lamarek, Le Croisic.

[Syn. : *Z. agrestis* Philippi, *Z. albus* Wood, *Z. ciliaris* Mke, *Z. cranchianus* Sowerby, *Z. discrepans* Brown, *Z. granuliferus* Sowerby, *Z. humilior*, *Z. irregularis* Sowerby, *Z. Lyonsi* Leach., *Z. zizyphinus* Lamarek].

Zizyphinus annulatus Martyn., Nouvelle-Zélande.

[Syn. : *Z. virgineus* Chemnitz].

Genre **Bankivia** Beck.

Bankivia purpurascens Bk., La Réunion.

Bankivia varians Beck, Sydney.

Genre **Trochocochlea** Klein

[Syn. : *Trochius* Leach., *Gibbium* Gray., *Osilinus* Philippi, *Labio* Gray, *Melagraphia* Stentz].

SECTIONS

(1) *Trochocochlea* Klein. (2) *Tegula* Less.

(1) *Trochocochlea angulata* Quoy, Dalmatie.

Genre **Oxystele** Philippi

Oxystele merula Chemnitz, Chine.

Genre **Chlorostoma** Sowerby

Chlorostoma ater Less (*jeune*), Chili.

Chlorostoma argyrostomum Gmelin Mers australes.

Genre **Omphalius** Philippi

SECTIONS

(1) *Omphalius* Philippi.

(2) *Anadema* H A. Ad.

- (1) *Omphalius umbilicaris* Linné, Alger.
- (1) *Omphalius excavatus* Lamarck, Côtes d'Afrique.
- (2) *Omphalius cælatus* A. Adams, les Antilles.

Genre **Gibbula** Risso

[Syn. : *Phorcus* Risso, *Steromphala* Agass].

SECTIONS

- (1) *Gibbula* Risso.
- (2) *Forscalia* H. A. Adams.
- (1) *Gibbula Adansoni* Payraudeau, Marseille, Cette.
[Syn. : *G. varians* Desh.].
- (1) *Gibbula cineraria* Linné, Le Croisic.
[Syn. : *G. cinerea* Da Costa, *G. electissima* (Bean) Thorpe ; *G. lineata* Da Costa, *G. lineolata* Michaud, *G. littoralis* Brown, *G. perforata* E. Smith].
- (1) *Gibbula drepanensis* Brugnonne, Alger.
- (1) *Gibbula varia* Linné, Alger.
[Syn. : *G. Roissyi* Payr., *G. radiata* Ant. ; *Trochus pallidus* Forbes, *T. elata* Brusina, *T. gibbosula* Brusina.]
- (1) *Gibbula tessellata* Chemnitz, Algérie.
- (1) *Gibbula sanguinea* Linné, Marseille.
[Syn. : *G. Belliae* Payr., *G. coccinea* Desh., *G. minima*, *G. purpurea* Risso, *G. rosea* Chemn., *G. ruber* Dillw.].
- (1) *Gibbula divaricata* Linné, Alger.
[Syn. : *G. purpurata* Brus., *G. cineraria* Pet.].
- (1) *Gibbula Richardi* Payraudeau, Alger.
[Syn. : *G. margaritacea* Risso].
- (2) *Gibbula magus* Linné, Le Croisic.
[Syn. : *G. tuberculata* Cost.].

Genre **Margarita** Leach.

- Margarita undulata* Sowerby, Groënland.
- Margarita helicina* Fabr., Groënland.
[Syn. : *M. diaphana* Fabr., *M. fasciata* Fabr., *M. helicoides* Fabr., *M. inflecta* Toll., *M. margarita* Lask., *M. neritoidea* Gmelin].

Margarita cinerea Gld., Groënland.

[Syn. : *M. costata* Loven, *M. sordida* Hanc, *M. striata* Brod.].

Margarita groenlandica Bk., Groënland.

[Syn. : *M. fusca* Möll., *M. incarnata* Couth., *M. inflata* Chemnitz].

FAMILLE DES TROCHIDÆ

Subfamille Stomatellinæ

Genre **Stomatella** Lamarek.

Stomatella Doriæ Issel, Suez.

Stomatella pulchella A. Adams, la Réunion.

Stomatella imbricata Lamarek, Java.

Stomatella elata A. Adams, Chili.

Genre **Stomatia** Hblng.

[Syn. : *Haliotideia* Humph., *Stomax* Mft., *Sigaretus* Schmeh.]

Stomatia phymatis Helblng, Océan Indien.

Genre **Broderipia** Gray

Broderipia iridescens Brod., la Réunion.

FAMILLE DES HALIOTIDÆ

Genre **Haliotis** Linné

[Syn. : *Auris* Klein, *Deridobranchus* Ehrbg., *Ralia* Gray, *Haliotidarius* Dam.],

Haliotis revelata Deshayes, la Réunion.

Haliotis varia Linné, Philippines.

Haliotis tuberculata Linné, var. *lamellosa* Lamarck, Marseille.

[Syn. : *H. bistrata* Cost., *H. parva* Risso, *H. reticulata* Reeve].

Genre **Teinotis** H. A. Adams

Teinotis asinina Linné, Chine.

Genre **Padollus** Mft.

[Syn. : *Padolla* Oken, *Padola* Flmg.].

SECTIONS

(1) *Padollus* Mft. (2) *Sulculus* H. A. Adams.

(1) *Padollus ovinus* Chemnitz, Philippines.

(1) *Padollus pulcherrimus* Martyn., Nouvelle-Zélande.

FAMILLE DES FISSURELLIDÆ

Genre **Fissurella** Brug.

[Syn. : *Larva* Humph., *Caminata* Fabr., *Fissurellus* Mft., *Serra* Less.]

SECTIONS

(1) *Fissurella* Brug. (4) *Lucapina* Gray.

(2) *Cremides* H. A. Adams. (5) *Clypidella* Sowerby.

(3) *Fissuridea* Sowerby.

(1) *Fissurella picta* Gmelin, Détroit de Magellan.

(1) *Fissurella crassa* Lamarek, Pérou.

[Syn. : *F. depressa* Lmek.].

(1) *Fissurella rosea* Lamarek, Algérie.

(1) *Fissurella nimbose* Lamarek, Afrique occidentale.

(2) *Fissurella nodosa* Born., les Antilles.

(4) *Fissurella gibberula* Lamarek, Algérie, Marseille.

[Syn. : *F. costaria* Sow., *F. gibba* Phil., *F. minuta* Lamarek, *F. philippiana* Reeve.].

(4) *Fissurella Rüppeli* Sowerby, Suez.

(4) *Fissurella græca* Linné, Algérie.

[Syn. : *F. apertura* Mtg., *F. cancellata* Dall., *F. corrugata* Cost., *F. dominicana* Cost., *F. larvar-eticulata* Cost., *F. mamillata* Risso, *F. occitanica* Reclz., *F. radiata* Brown., *F. recurvata* Cost.].

(5) *Fissurella pustula* Lamarek, la Réunion.

Genre **Fissurellidæa** D'Orb.

Fissurellidæa hiantula Lamareck, Inde.

Genre **Emarginula** Lamareck

[Syn. : *Emarginulus* Mft., *Palmarium* Mft.].

SECTIONS

- (1) *Emarginula* Lamareck. Syn. *Montfortia* Recluz.
(2) *Subemarginula* Blainville. (3) *Cypidina* Gray.
Syn. *Hemitoma* Sow.

(1) *Emarginula solidula* Costa, Alger.

(1) *Emarginula scutulata* Desh., la Réunion.

(1) *Emarginula fissura* Linné, Algérie.

[Syn. : *E. elata* Sow., *E. incurva* Sow., *E. lævis* Penn.,
E. Mülleri Sow., *E. reticulata* Risso, *E. subdepressa*
Sow.].

(1) *Emarginula elongata* Costa, Alger.

(1) *Emarginula Huzardi* Payraudeau, Algérie.

[Syn. : *E. cusmichiana* Brus., *E. papillosa* Risso].

(1) *Emarginula cancellata* Philippi, Algérie.

[Syn. : *E. fissura* Payr., *E. rubra* Cost., *E. sicula*
Gray, *E. squamosa* Arad.].

(2) *Emarginula notata* Linné, Ceylan.

Genre **Parmophorus** Blainville

[Syn. : *Scutus* Mft., *Dascinus* Rfq., *Parmophora*
Desh., *Scutifera* Blainv., *Scutum* Sow.].

SECTIONS

- (1) *Parmophorus* Blvll. (2) *Tugalia* Gray.

(1) *Parmophorus abnormis* Nevil., Chandipour.

(1) *Parmophorus australis* Lamareck, Nouvelle-Hollande.

FAMILLE DES DENTALIIDÆ

Genre **Dentalium** Linné

[Syn. : *Tubulus* Scilla, *Dentale* List., *Dentalis* Lwyd.,
Syringites Auct., *Canalis* Argenv.].

Dentalium dentale Linné, Égypte.

Dentalium elephantinum Linné, Égypte.

Dentalium alternans Bucq., Côtes de la Loire-Inférieure.

[Syn. : *Dentalium dentale* Lmck., *D. fasciatum*
Lmck., *D. novem-costatum* Lmck., *D. pseudo-*
entale Seach.].

Dentalium panormitanum Chenu, Égypte.

[Syn. : *D. panormum* Chenu].

Genre **Antalis** Aldrov.

[Syn. : *Antalium* auct., *Entale* Tournf., *Entalium*
Detr., *Entalis* Sow.].

Antalis entalis Linné, Côtes de la Loire-Inférieure.

[Syn. : *Antalis antalis* Sow., *Antalis infundibulum*
Sow. *A. vulgaris* Cost.].

FAMILLE DES SCUTELLIDÆ

Genre **Patelloidea** Quoy

[Syn. : *Tectura* Audouin, *Acmaea* [Esch., *Lottia*
Gray].

Patelloidea parasitica d'Orb., Chili.

Patelloidea araucana d'Orb., Mazathan.

Patelloidea chitonoides Reeve, Ile de la Réunion.

Patelloidea sp., Chine Boréale.

Genre **Scutellina** Gray

[Syn. : *Scutella* Brod., *Pilidium* Forb.].

SECTIONS

(1) *Scutellina* Forb.

(2) *Jothia* Forb.

Syn. *Patelloida* Cantr.

(1) *Scutellina galathea* Lamarck, Bergen.

Genre **Lepeta** Gray

[Syn. : *Propilidium* Forb., *Pilidium* Müll. .

Lepeta cæca Müll., Groënland.

[Syn. : *L. candida* Couth.].

FAMILLE DES GADINIADÆ

Genre **Gadinia** Gray

[Syn. : *Mouretia* Sowerby, *Lyria* Gray, *Clypeus* Scach.].

Gadinia Garnoti Payraudeau, Algérie.

Gadinia afra Gray, la Réunion.

FAMILLE DES PATELLIDÆ

Genre **Patella** Linné

[Syn. : *Patellaria* Lwyd. *Eruca* Tournf., *Patellus* Mft., *Patellarius* Dum., *Goniceis* Rfq.].

SECTIONS

(1) *Patella* Linné. (3) *Cymbula* H. A. Ad.

(2) *Scutellastra* H. A. Ad. (4) *Olana* H. A. Ad.

(1) *Patella zebra* Reeve, Nouvelle-Hollande.

(1) *Patella lusitanica* Gmelin ; Payr., p. 88, pl. III, fig. 6-8 :
Algérie (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *P. nigro-punctata* Reeve, *P. granularis*
Schrött., *P. punctata* Lmck. VII, 537.]

(1) *Patella variegata* Reeve ; Sav. Eg. I, fig. 3 ; J. de
Conchyl., 1870, p. 167 ; Suez (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *P. aurifera* Dufo].

(1) *Patella magellanica* Gmelin, Chili (LEPELTIER).

(1) *Patella athletica* Lamarck, Cap de la Hague (M^{me} HER-
MITE).

(1) *Patella granatina* Linné ; Lmck, VII, 525 ; Chenu,
p. 379, fig. 2.836, Antilles.

(1) *Patella umbella* Gmelin, var. *miniata* Born. ; Lmck, VII, 529 ; Chenu, p. 377, fig. 283 ; Cap de Bonne-Espérance.

(1) *Patella tarentina* Lamarck, VII, 537. Le Croisic (CAILLIAUD).

[Syn. : *P. Bonnardii* Payr. Coq. Corse, p. 89, fig. 9-11]

(1) *Patella Argenvillei* Krss., Cap de Bonne-Espérance.

(1) *Patella rota* Chemnitz, la Réunion (EUDEL).

(1) *Patella costoso-plicata* Mart. var. *ferruginea* Gmelin Algérie (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *P. Lamarckii* Payr., coq. Corse, pl. IV, fig. 1-4, p. 90].

(1) *Patella scutellaris* Lamarck, Algérie (A. LETOURNEUX).

(2) *Patella plicata* Born. ; Lmck, VII, 526 ; Chenu, p. 377, fig. 3838 ; Magellan.

(2) *Patella oculus* Born. ; Lmck, VII, 726 ; Cap de Bonne-Espérance (LEPELTIER).

Patella Eudeli Deshayes, la Réunion (EUDEL).

Patella profunda Deshayes, la Réunion (EUDEL).

[Syn. : *P. testudinaria* Linné].

Patella viridis Dufo, Chili (PETIT DE LA SAUSSAYE).

Patella vulgata Linné, Le Croisic.

[Syn. : *P. cærulea* Sow., *P. depressa* Sow., *P. elevata* Sow., *P. intermedia* Sow., *P. picta* Sow.].

Patella cromosina Lmck, Sydney.

Patella pectinata Linné ; Lmck, VII, 539 ; Méditerranée, Cap de Bonne-Espérance (M^{me} HERMITE).

[Syn. : *P. pectunculus* Gmelin].

Patella scurra Lesson ; Chenu, fig. 2812 ; Chili (LEPELTIER).

Patella sp., Cap de Bonne-Espérance.

Genre **Nacella** Schmch.

[Syn. : *Patina* Leach., *Ansates* Sowerby].

Nacella pellucida Ancey ; Lmck, VII, 540 ; Le Croisic.

[Syn. : *N. bimaculata* Mtg., *N. cærulea* Mtg., *N. cærulenta* Cost., *N. cornea* Mich., *N. elliptica* Flmg., *N. elongata* Flmg., *N. intorta* Sow., *N. minor* Sow.],

Nacella cymbularia Lamarck ; Chenu, fig. 2846 ; Mers australes.

FAMILLE DES CHITONIDÆ

Genre **Chiton** Linné

SECTIONS

- | | |
|--|--|
| (1) Lophyrus Poli.
Syn. <i>Radsia</i> Gray.
— <i>Gymnoplax</i> Gray.
— <i>Lophurus</i> Gray. | (10 ¹) Fremblya H. A. Ad.
(11) Schizochiton Gray.
(12) Stenochiton H. A. Ad.
(13) Mopalia Gray.
(14) Katharina Gray.
(15) Cryptochiton Gray.
(16) Amicula Gray.
Syn. <i>Symetrogephyrus</i>
Middf. |
| (2) Callochiton Gray.
(3) Lepidopleurus Risso.
Syn. <i>Ischnochiton</i> Gray.
— <i>Ischnoradsia</i> Sh. | |
| (4) Leptochiton Gray.
Syn. <i>Stenosemus</i> Middf. | |
| (5) Tonicia Gray.
(6) Chiton Linné.
Syn. <i>Scutigerulus</i> Meusch.
— <i>Acanthopleura</i> Gldg.
— <i>Canthapleura</i> Sow.
— <i>Corephium</i> Gray. | (17) Plaxiphora Gray.
Syn. <i>Euplaxiphora</i> Sh.
(18) Cryptoconchus Blvll.
(19) Acanthochites Risso.
Syn. <i>Acanthochetes</i> Lea.
— <i>Acanthochiton</i> Gray
— <i>Acanthochitus</i> Phil.
— <i>Phakellopleura</i> Gld. |
| (7) Chaetopleura Sh.
Syn. <i>Eudoxochiton</i> Sh.
— <i>Craspedochiton</i> Sh. | |
| (8) Onithochiton Gray.
(9) Enoplochiton Gray. | (20) Chitonellus Lamarek.
Syn. <i>Chitonella</i> Deshay.
— <i>Cryptoplax</i> Blvll.
— <i>Chitoniscus</i> Herms
— <i>Ametrogephyrus</i>
Middf. |
| (10) Lorica H. A. Ad.
Syn. <i>Aulacochiton</i> Gray | |

(1) *Chiton Cumingii* Erenb., Valparaiso (LEPELTIER).

(1) *Chiton squamosus* Linné, Cap de Bonne-Espérance (EUEDEL).

(3) *Chiton marginatus* Penn., Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. : *Ch. carinatus* Leach., *Ch. cimex* Chemnitz.
Ch. cinereus Forb., *Ch. variegatus* Philippi].

(3) *Chiton cajetanus* Poli ; Lmck, VII, 495 ; Le Four
Océan Atlantique: (BOURGAULT).

(4) *Chiton asellus* Chemnitz, Piriac (Loire-Inférieure).

- (5) *Chiton marmoreus* Fabr., Groënland (Mörch.).
[Syn. : *Ch. flemingius* Sow., *Ch. fulminatus* Sow.,
Ch. laevigatus Flmg., *Ch. latus* Leach., *Ch. pictus*
Bean., *Ch. punctatus* Sow.].
- (6) *Chiton borbonicus* Desh., la Réunion (EUDEL).
- (6) *Chiton spiniger* Sowerby ; Journal de Conchyl., 1865,
p. 110 ; Suez (A. LETOURNEUX).
- (19) *Chiton fascicularis* Linné, Piriac (Loire-Inférieure),
Cap de la Hève (M^{me} HERMITE).
[Syn. : *Ch. vulgaris* Leach].
- (19) *Chiton discrepans* Brown., Algérie.
[Syn. : *Ch. carinatus* Risso, *Ch. crinitus* Thorp., *Ch.*
fascicularis Philippi].
- Chiton sculus* Gray, var. *Polii* Phl., Alger (A. LE-
TOURNEUX).

FAMILLE DES TORNATELLIDÆ

Genre **Tornatella** Lamarck

[Syn. : *Speo* Risso, *Kanilla* Silvers, *Myosota* Gray].

Tornatella tornatilis Linné, Le Croisic.

[Syn. : *T. bifasciata* Mart., *T. fasciata* Lmck., *T.*
globulina Forb., *T. ovalis* Cost., *T. pellucida* ,
T. pullus Forb., *T. pusilla* Forb.].

Genre **Buccinulus** Plano

[Syn. : *Pupa* Bolt., *Solidula* Fschr., *Dactylus* Schmch.

Buccinulus solidulus Linné, Océan Indien.

Buccinulus nitidulus Lamarck, Ile Maurice.

FAMILLE DES APLUSTRIDÆ

Genre **Hydatina** Schmch.

Hydatina albocincta Höwen ; Chenu, p. 387, 388, fig. 2.909,
2.910 ; Océan Indien.

Hydatina aplustre Linné ; Lmck, VII, 671 ; Encycl., pl. 359,
fig. 2 ; Chenu, p. 386, fig. 2.905 ; Indes.

[Syn. : *Hydatina Thallassiarchi* H. A. Ad., *Aplustrum*
fasciatum Schum].

FAMILLE DES CYLICHNIDÆ

Genre **Cylichna** Loven

SECTIONS

(1) *Cylichna* Loven. (2) *Mnestia* H. A. Ad.

(1) *Cylichna Jeffreysi* Mtg., Alger (JOLY).

(1) *Cylichna striatula* Forb., Alger (JOLY).

(1) *Cylichna umbilicata* Mtg., Alger (JOLY).

[Syn. : *Cyl. blainvilleana* Rclz., *Cyl. conulus* Desh.,
Cyl. strigella Loven, *Cyl. subcylindrica* Brwn.,
Cyl. truncatula Brusin].

;; *Cylichna Reinhardti* Holb., Groënland (MÖRCH.).

Genre **Utriculus** Brown

[Syn. : *Retusa* Brown.].

Utriculus mamillatus Phl., Alger.

[Syn. : *U. minutus* Magh., *U. pellucidus* Macgily.,
U. retusus Mat., *U. truncatulus* Brug., *U. truncatus* A. Ad.].

Genre **Tornatina** A. Ad.

Tornatina olivula A. Ad. ; Chenu, p. 388, fig. 2.932 ; Algérie
(A. LETOURNEUX).

FAMILLE DES BULLIDÆ

Genre **Bulla** Klein

[Syn. : *Bullus* Mft., *Ampulla* Paetel, *Cymbrium*
Latrll., *Bullea* Blvll., *Bullearius* Derm., *Vesica*
Sow.].

Bulla cylindracea Penn., Alger (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *B. ovulata* Broch.].

Bulla striata Brug. ; Lmck, VII, 668 ; Encycl., pl. 358,
fig. 2 ; Chenu, p. 389, fig. 2.939-2.941 ; Algérie (A. LE-
TOURNEUX).

Bulla akera Gmelin, Quiberon (LEBAHEZRE).

[Syn. : *Akera bullata* Müller, *Bulla norvegica* Roissy,
B. fragilis Lmck., VII, 672].

Bulla hydatidis Linné ; Piriac (TACITE LETOURNEUX), La Rochelle (D'ORBIGNY).

[Syn. : *Bulla cornea* Lamarek VII, 672 ; Chenu, p. 390, fig. 2.950).

Bulla cruentata A. Adams, la Réunion (EUDEL).

Bulla ampulla Linné ; Lmck, VII, 668 ; Encycl., p. 358, fig. 3 ; Chenu, p. 389, fig. 2.943, 2.944, 2.946, 2.947 ; Océan Indien.

Bulla Brochii Michelotti, Algérie (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *Cylichna strigella* Lov. Jeffr. Suppl. journ. conchyl. 1866, p. 238].

Genre **Haminea** Leach.

Haminea dilatata Leach., Alger (JOLY).

Haminea physis Linné ; Lmck, VII, 670 ; Encycl., pl. 359, fig. 4 ; Chenu, p. 387, fig. 2.911 ; Océan Indien.

Genre **Akera** O. Müll

[Syn. : *Acera* Latrll. ; *Eucampe* Leach ; *Vitrella* Sowerby].

Akera bullata Océan Atlantique.

[Syn. : *A. fragilis* Lmck., *A. globosa* Cantr., *A. jouensis* Penn., *A. nana* Sow., *A. norvegica* Brug.].

Genre **Scaphander** Mft.

[Syn. : *Assula* Schmch., *Bullaea* Roissy, *Bulla* Roissy].

Scaphander lignarius Linné ; Lmck, VII, 667 ; Encycl., pl. 359, fig. 3 ; Chenu, p. 390, fig. 2.958 ; La Rochelle, Algérie (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *Bulla Browni* Leach., *B. convolutus* Schmch., *B. giganteus* Risso., *B. turgionius* Risso].

Genre **Atys** Mft.

[Syn. : *Naucum* Schmch., *Alicula* Ehbgs., *Roxana* Leach.].

SECTIONS

(1) *Atys* Mft.

(3) *Sao* H. A. Ad.

(2) *Dinia* H. A. Ad.

(1) *Atys naucum* Linné ; Lmck, VII, 669 ; Chenu p. 391, fig. 2.959 ; Océan Indien.

FAMILLE DES PHILINIDÆ

[Syn. : *Bullæidæ*].

Genre **Philine** Ascan

[Syn. : *Bullæa* Lmck., *Lobaria* Müll. *Philina* Lmck].

Philine scabra Müller ; Lmck VII 697 ; Chenu p. 387, fig. 2.918 ; la Réunion (EUDEL).

[Syn. : *Bulla catenata* Leach., *Philine catenulifera* Macgill, *Philine denticulata* Ad., *Philine granulosa* Sars., *Ph. patulus* Risso, *Ph. pectinata* Dillw.].

Philine aperta Linné ; Lmck VII 664 ; Chenu p. 392, fig. 2.973-2.974 ; Les Sables-d'Olonne.

[Syn. : *Bulla bulla* Cost., *B. emarginata* A. Ad., *B. marina* Planc., *Philine planciana* Phl., *Ph. pullus* A. Ad., *Ph. quadrata* Müll., *Ph. quadrilobata* Gmel., *Ph. quadrilobus* Müll., *Ph. quadripartita* Ascan., *Ph. Schröteri* Phl., *Ph. sörmet* Adans].

Philine catena Mg., Alger (JOLY).

[Syn. : *Ph. angustata* Brown., *Ph. catina* Brown., *Ph. punctata* Phl.]

Genre **Chelinodura** A. Ad.

[Syn. : *Hirundinella* Gray].

Chelinodura hirundinina Quoy et G. ; Chenu, p. 392, fig. 2980-2981 ; Lmck. VII, 665 ; La Réunion (EUDEL).

FAMILLE DES LOPHOCERCIDÆ

Genre **Lophocercus** Krohn

[Syn. : *Icarus* Forb., *Oxyñoë* Rfq.].

Lophocercus Sieboldi Krohn. Alexandrie' (IOBA DE L'HÔTELLERIE).

[Syn. : *Loph. brachycephalum* Mörch, *Loph. Gargottae* Calc., *Loph. Gravesi* Forb., *Loph. olivacea* Rfq.].

FAMILLE DES APLYSIIDÆ

Genre **Dolabella** Lamarek

Dolabella Teremidi Rang. ; Lmck VII, 700 ; Chenu, p. 305, fig. 2.997-2.998 ; la Réunion (IOBA).

Dolabella Rumphii Lmck, VII, 699 ; Chenu, p. 305 fig. 2296, la Réunion (EUDEL).

Dolabella gigas Rang. ; Lmck, VII, 700 ; Chenu, p. 305, fig. 2299 ; la Réunion (EUDEL).

Genre **Dolabrifera** Gray

[Syn. : *Petalifera* Gray].

Dolabrifera Maillardi Desh., la Réunion (EUDEL).

Genre **Aplysia** Gmelin

Aplysia fasciata Poiret ; Lmck, VII 689 ; Alger (JOLY).
[Syn. : *A. Lepus* Phl., *A. vulgaris* Blvll.].

Aplysia depilans Linné ; Lmck, VII, 688 ; Chenu, p. 395, fig. 3.003 ; Piriac.
[Syn. : *Dolabella lepus* Phl., *A. leporina* Dlle].

FAMILLE DES PLEUROBRANCHIDÆ

I. *Subfamille des Pleurobranchinæ*

Genre **Pleurobranchus** Cuvier

[Syn. : *Bertella* Blvll. ; *Discoides* Ren. ; *Cleanthus* Leach.].

Pleurobranchus plumulus Mtg., Noirmoutier (LEPELTIER).
[Syn. : *Pl. porosus* Blvll.].

II. *Subfamille des Umbrellinæ*

[Syn. : *Operculatinae*.]

Genre **Umbrella** Lamarck

[Syn. : *Umbraculum* Schmeh, *Gastroplax* Blvll.,
Umbella Orb., *Acardo* Lmck., *Ombrella* Blvll.].

Umbrella mediterranea Lmck, Palerme (IOBA DE L'HÔTEL-LERIE).

[Syn. : *U. patelloidea* Cantr.].

Umbrella indica Lmck, VII, 573 ; Chenu, p. 398, fig. 3.019-3.021 ; Océan Indien.

CLASSE DES PÉLÉCYPODES

FAMILLE DES PHOLADIDÆ

Subfamille des Pholadinæ

Genre **Pholas** Linné

Pholas costata Linné. Europe australe.

Pholas costata Linné (pièce accessoire). Europe australe.

Genre **Dactylina** Gray

[Syn. *Thovana* Leach]

Dactylina dactylus Linné. Préfaillies (France).

[Syn. *Pholas hians* Pult. ; *Pholas muricata* Cost.]

Genre **Barnea** Risso

[Syn. *Barnia* Leach]

Barnea parva Leach. Le Pouliguen (France) (CAILLIAUD).

[Syn. *B. dactyloidea* Lmck., *Pholas dactylus* var. Desh.]

Barnea candida Linné. [Lmck, VI, 44 ; Encycl., pl. 168, fig. 11]. La Tranche (France).

[Syn. *B. spinosa* Risso].

Genre **Jouannetia** Desml.

[Syn. *Pholadopsis* Conr., *Triumphalia* Sow.]

Jouannetia Cumingi Sowerby. Mers australes.

Genre **Martesia** Leach.

[Syn. *Penitella* Conr.]

Martesia striata Linné. [Encycl., pl. 169, fig. 8-10² ; Chenu, II, 8, fig. 49]. Amérique.

[Syn. *M. clavata* Lmck. VI, 46 ; *M. conoidea* Flmmg. ; *M. lignorum* Spglr. ; *M. nana* Pult. ; *M. pusilla* Linné].

Subfamille des Teredinæ

Genre **Teredo** Linné

[Syn. *Fistulana* Lmck. ; *Clausaria* Mke ; *Cloissonaria* Fér.]

SECTIONS

- (1) *Teredo* Linné.
- (2) *Xylotria* Leach.
Syn. *Bankia* Gray.
- (3) *Uperotis* Guett.
Syn. *Guettera* Gray.
- (1) *Teredo navalis* Linné. [Lmck, VI, 38 ; Encycl., pl. 167, fig. 1-5 ; Chenu, p. 10, fig. 59]. Le Croisic (France).
- (1) *Teredo norvegica* Spengler. Alger.
[Syn. *T. Brugierei* Dll. ; *T. Deshayesi* Qtrfg. ; *T. fatalis* Qtrfgr. ; *T. maritima* Loven., *T. navium* Sell. ; *T. nigra* Blvll.]
- (3) *Teredo corniformis* Lmck. Golfe du Bengale.

FAMILLE DES GASTROCHÆNIDÆ

Genre **Fistulana** Brug.

(Syn. *Gastrochaena* Spglr., *Chaena* Retz.)

Fistulana clava Lmck. Océan Indien.

Genre **Gastrochæna** Lmck.

[Syn. *Roccellaria* Fl. de B. ; *Roxellaria* Mke ; *Trapezium* Blvll. ; *Quoyia* Dsh. ; *Rupellaria* Agass.]

Gastrochæna dubia Penn. [Encycl., pl. 219, fig. 3-4 ; Chenu pp. 15 et 16, fig. 74-77.] La Rochelle (LE TOURNEUX).
[Syn. *G. faba* Pult. ; *G. modiolina* Lmck. VI, 49 ; *G. parva* Cost. ; *G. pelagica* Riss. ; *G. pholadis* Mft. ; *G. Polii* Phl. ; *G. pusilla* Olivi ; *G. tarentina* Cost.]

Gastrochæna cymbium Spglr. Alger.

Gastrochæna chemnitziana d'Orb. [Chenu, p. 16, fig. 75-76.]
Australie (Duché).

Gastrochæna cuneiformis Lmck, VI, 49 [Chenu, p. 11, fig. 15.]
Ile Maurice.

Genre **Aspergillum** Lmck.

[Syn. *Brechites* Guett. ; *Verpa* Bolt. ; *Clepsydra* Meusch. ; *Penicillus* Brug. ; *Aquaria* Perry ; *Arytaena* Oken ; *Adaspergillum* Mke ; *Tubulus* Gualt. ; *Warnea* Gray.)

SECTIONS

- (1) *Aspergillum* Lmck. (2) *Foëgia* Gray.
 (1) *Aspergillum javanum* Lmck. Océan Indien.
 [Syn. *Serpula penis* Linné ; *Penicellus javanus* Brug.]
 (1) *Aspergillum vaginiferum* Lmck., VI, 21. Mer Rouge
 (A. LETOURNEUX).

FAMILLE DES SOLENIDÆ

Subfamille des *Soleninæ*

Genre **Solen** Linné

[Syn. *Fistula* Mart. ; *Vagina* Mhlfd. ; *Solenarius* Dum. ; *Hypogaea* Poli ; *Listera* Leach.]

SECTIONS

- (1) *Solen* Linné. (2) *Solena* Brown.
 (1) *Solen corneus* Lmck. Hong-Kong (EUDEL).
 (1) *Solen vagina* Linné, Lmck., VI, 53 ; *Encycl.*, pl. 222, fig. 1 ; Chenu, p. 20, fig. 84-85.] Océan Atlantique
 (Côtes de France).
 [Syn. *S. marginatus* Pennant.]
 (1) *Solen siliqua* Linné. [Lmck., VI, 55 ; *Encycl.*, pl. 222, fig. 2 ; Chenu, p. 21, fig. 89-90.] Les Sables-d'Olonne.
 [Syn. *Solen ligula* Lmck.]
Solen Gaudichaudi Chenu, p. 21, fig. 92. Océan Pacifique

Genre **Ensis** Schmch.

[Syn. *Ensattella* Sowerby]

- Ensis ensis* Linné [Lmck., VI, 55 ; *Encycl.*, pl. 223, fig. 1, 2, 3 ; Chenu, p. 21, fig. 87-88.]
Ensis vaginoides Lmck. Sydney.

FAMILLE DES SOLENIDÆ

Subfamille des *Pharinæ*

Genre **Ceratisolen** Forb.

[Syn. *Pharus* Gray]

Ceratisolen legumen Linné. [Lmck, VI, 57 ; Encycl., pl. 225, fig. 3 ; Chenu, p. 22, fig. 95.] Algérie (A. LETOURNEUX).

[Syn. *Ceratisolen hirundo* Poli ; *Cultellus legumen* Linné ; *Pharus legumen* Leach.]

Genre **Pharella** Gray

[Syn. *Solecurtoides* Desm., *Polia* d'Orb.]

Pharella olivacea Mtlf. Singapour.

Genre **Cultellus** Schm.

[Syn. *Ensiculus* H. Ad. ; *Macha* Conr. ; *Leguminum* Ch.]

Cultellus cultellus Linné [Lmck, VI, 56 ; Encycl., pl. 223, fig. 4 ; Chenu, p. 23, fig. 98, 99.] Océan Indien.

Genre **Machæra** [Gld.

[Syn. *Siliqua* Mhlfd. ; *Leguminaria* Schmch. ; *Aulus* Oken ; *Leguminum* Ch.]

Machæra radiata Linné. Océan Indien.

Genre **Solecurtus** Blvll.

[Syn. *Macha* Oken ; *Solenocurtus* Sow. ; *Psammosolen* Riss. ; *Cyrtosolen* Herms.]

SECTIONS

(1) *Solecurtus* Blvll.

(2) *Azor* Gray.

(1) *Solecurtus strigilatus* Linné in Blainv. [Lmck., VI, 60, 63 ; Encycl. pl. 224, fig. 3 ; Chenu p. 24, fig. 205.] Méditerranée (Em. LETOURNEUX).

(2) *Solecurtus coarctatus* Gmelin [Lmck, VI, 59.] Algérie (A. LETOURNEUX).

[Syn. *S. antiquatus* Pulteney.]

Solecurtus Quoyi Desh. [Lmck, VI, 63.] Océan Pacifique austral.

Genre **Tagelus** Gray

[Syn. *Siliquaria* Schmch. ; *Laconsilla* Rfq.]

Tagelus Dombeyi Lmck, VI, 58. [Encycl., pl. 224, fig. 1; Chenu, p. 24, fig. 108.] Côtes du Pérou.

Tagelus gibbus Spglr. Antilles.

[Syn. *Tagelus caribæus* Lmck. VI, 58 ; Encycl., pl. 225, fig. 1 ; *Tagelus guineensis* Chemnitz.]

FAMILLE DES SAXICAVIDÆ

Genre **Saxicava** Fl. de B.

[Syn. *Chamaepholas* List. ; *Glycimerus* Schmch. ; *Didonta* Schmch. ; *Agina* Turton ; *Rhombus* Blvll. ; *Rhomboides* Blvll. ; *Byssomya* Cuv. ; *Clotho* Faujas ; *Pholeobia* Leach ; *Biapholius* Leach. ; *Hiatella* Daud. ; *Arcinella* Phl.]

Saxicava arctica Linné. Le Croisie (Ilot du Four) (CAILLIAUD).
Alger (A. LETOURNEUX).

[Syn. *S. bicarinata* Schmch. ; *S. elongata* Brown. ; *S. hiatella* Lmck. ; *S. minuta* Müll. ; *S. præcisa* Brown. ; *S. purpurea* Turt. ; *S. rhomboides* Poli].

Saxicava rugosa Lmck [Chenu, p. 25, fig. 111.] Mer du Nord
[Syn. *S. byssifera* Fabr. ; *S. distorta* Gld. ; *S. gallicana* Lmck. ; *S. groenlandica* Mich. ; *S. pholadis* Müll.]

Genre **Glycimeris** Lmck.

[Syn. *Cyrtodaria* Daud.]

Glycimeris siliqua Chemnitz. Terre neuve.

FAMILLE DES MYIDÆ

Genre **Mya** Linné

[Syn. *Laternula* Bolt.]

SECTIONS

1) *Mya* Linné.

(2) *Platyodon* Conr.

(1) *Mya truncata* Linné. Groënland (MÖRCH).

[Syn. : *M. Swainsoni* Turton, *M. ovalis* Turt.]

(1) *Mya arenaria* Linné [Lmck, VI, 74 ; Encycl., pl. 229, fig. 1 ; Chenu, p. 31, fig. 123-129.] Le Croisic (T. LETOURNEUX).

[Syn. *M. mercenaria* Say.]

FAMILLE DES CORBULIDÆ

Genre **Corbula** Brug.

[Syn. *Aloides* Mhlfd. ; *Agina* Turt. ; *Erodina* Daud. ; *Paxyodon* Bk. ; *Lentidium* Jan. ; *Tomala* Gray ; *Raleta* Gray.]

Corbula gibba Olivi. Alger (JOLY).

[Syn. *C. Fabricii* Möll. ; *C. inæquivalvis* Mtg. ; *C. nucleus* Lmck VI, 139 ; *C. reflexa* Costa ; *C. rosea* Brown.]

Corbula sulcata Lmck, VI, 133 .[Encycl., pl. 230, fig. 1 ; Chenu, p. 32, fig. 132-133.] Océan Indien.

Genre **Azara** d'Orbigny

[Syn. *Potamomya* Hinds]

Azara nimbose Reev. Montévidéo.

Genre **Corbulomya** Nyst.

Corbulomya mediterranea Costa. Alger (A. LETOURNEUX).

[Syn. *Corbula mediterranea* Costa ; *C. pathenopæa* Doll.]

Corbulomya ovata Forbes. Norvège (MÖRCH).

[Syn. *Corbula ovata* Forbes].

Genre **Cæcella** Gray

Cæcella sp. Chine boréale.

FAMILLE DES ANATINIDÆ

Genre **Anatina** Lmck.

[Syn. *Laternala* Bolt. ; *Auriscalpium* Mhlfd ; *Butor* Gistl. ; *Cyathodonta* Conr.]

Anatina subrostrata Lmck [Encycl., pl. 228, fig. 3 ; Chenu, p. 36, fig. 156, 157, 158, 160.] Australie, Océan Indien.

[Syn. *Solen anatinus* Linné.]

Anatina linicola Reeve. Hong-Kong.

Anatina laterna Lmck., VI, 77. [Chenu, p. 36, fig. 159.] Océan Indien.

Genre **Periploma** Schmch.

[Syn. *Bontia* Leach. ; *Ligula* Relz.]

SECTIONS

(1) *Periploma* Schmch.

(2) *Cochlodesma* Couth.

(1) *Periploma trapezoides* Lmck., VI, 81 [Encycl., pl. 230, fig. 6 ; Chenu, p. 38, fig. 167-168.] Océan Atlantique.

Genre **Lyonsia** Turt.

[Syn. *Periploma* Rang. ; *Osteodesma* Desh. ; *Magdala* Leach. ; *Pandorina* Scacc. ; *Hiatella* Brown. ; *Tetragonostea* Desh.]

SECTIONS

(1) *Lyonsia* Turt.

(3) *Lyonsiella* Sars.

(2) *Entodesma* Phl.

(4) *Silenia* Smth.

(1) *Lyonsia norwegica* Chemn., Pornichet (CAILLIAUD).

[Syn. *L. elongata* Gray ; *L. nitida* Fabr. ; *L. pellucida* Brown. ; *Amphidesma corbuloides* Lmck VI, 129].

(1) *Lyonsia corruscans* Scacc., Alger (JOLY).

Genre **Thracia** Leach.

[Syn. *Odontocinetus* Cost. ; *Odontocincta* Agassiz ; *Odontocyneta* Cantr. ; *Cinctodonta* Herms. ; *Osteodesma* Blvll.]

SECTIONS

(1) *Thracia* Leach.

(3) *Ligula* Relz.

(2) *Rupicola* Fl. de B.

(1) *Thracia papyracea* Poli. [Kiener, pl. 2, fig. 4.] Le Pouliguen (CAILLIAUD).

[Syn. *T. declivis* Penn. ; *T. fragilis* Penn. ; *T. intermedia* Clark. ; *T. ovata* Brown. ; *T. phaseolina* Lmck. VI, 129 ; *T. villosiuscula* Macgill.]

(1) *Thracia corbuloides* Desh., in Lmck, VI, 83. [Kiener, pl. 2 fig. 1 ; Chenu, p. 40, fig. 180.] Toulon.

Genre **Neæra** Gray

[Syn. *Cuspidaria* Nardo ; *Sphena* d'Orb.]

Neæra cuspidata Olivi, Alger (JOLY).

[Syn. *Neæra brevirostris* Brown.]

Genre **Pandora** Brug.

[Syn. *Calopodium* Bolt. ; *Trutina* Brown.]

Pandora inæqualis Linné. [Encycl., pl. 250, fig. 1 ; Chenu, p. 51, fig. 213.] Le Croisic, Alger (A. LETOURNEUX).

[Syn. *P. rostrata* Lmck VI, 145 ; *P. margaritacea* Lmck.]

Pandora pinna Mtg. La Tranche (Vendée) (LEPELTIER).

[Syn. *P. obtusa* Lmck VI, 145 ; *P. truncata* Turt.]

FAMILLE DES MACTRIDÆ

Subfamille des *Mactrinæ*

Genre **Mactra** Linné

[Syn. *Callistoderma* Poli ; *Trigonella* Costa]

Mactra stultorum Linné. [Lmck, VI, 99 ; Encycl., pl. 256, fig. 2.] Le Croisic (T. LETOURNEUX), Algérie (A. LETOURNEUX).

[Syn. *M. cinerea* Mtg., *M. epidermica* Desh. ; *M. rufa* Lmck.]

Mactra stultorum Linné, var. *lactea* Poli. Le Croisic.

Mactra lactea Gmelin. [Lmck, VI, 103.] Algérie (A. LETOURNEUX), Adriatique (BOURGAULT DUCOUDRAY), Venise (IOBA).

[Syn. : *M. corallina* Linné, *M. inflata* Bronn. ; *M. intermedia* Arad. *M. Paulucciæ* Arad. et Ben. ; *M. radiata* Cost.]

Mactra olorina Phl. [Journal de Conchyl., 1865.] Suez (A. LETOURNEUX).

Mactra sp. Tchefou (Chine).

Mactra sp. Cochinchine (Cap Saint-Jacques) (EUDEL).

Genre **Mactrella** Gray

Mactrella carinata Lmck, VI, 98. [Encycl., pl. 251, fig. 2, — 252, fig. 1 ; Chenu, p. 55, fig. 237-238.] Océan Indien.
[Syn. *Mactrella alata* Spglr.]

Genre **Hemimactra** Sowerby

[Syn. *Spisula* H. et A. Ad. non Gray]

SECTIONS

(1) *Hemimactra* Sowerby. (2) *Oxyperas* Mörch.

(1) *Hemimactra solida* Linné. [Lmck, VI, 104 ; Encycl., pl. 258, fig. 1 ; Chenu, p. 56, fig. 232.] Le Croisic
(T. LETOURNEUX).

[Syn. *H. lactea* Poli ; *H. elliptica* Brown. ; *H. crassatella* Lmck. ; *H. crassa* Turt. ; *H. zonaria* Cost.]

(1) *Hemimactra subtruncata* Cost. [Chenu, p. 56, fig. 233.]
Alger (IOBA).

[Syn. *H. deltoidalis* Lmck. ; *H. triangula* Brocchi]

Genre **Rangia** Desmoulins

[Syn. *Gnatodon* Gray ; *Clathrodon* Conr.]

Rangia cyrenoides Desmoulins. Amérique septentrionale
(D'ORBIGNY).

FAMILLE DES MACTRIDÆ

Subfamille des *Lutrariinæ*

Genre **Lutraria** Lmck.

[Syn. *Cacophona* Gistl. ; *Cultellus* Sow. ; *Lutaria* Phl. ; *Lutricola* Blvll.]

Lutraria oblonga Chemnitz. Le Croisic (T. LETOURNEUX).
[Syn. *L. solenoides* Lmck. VI, 90].

Lutraria elliptica Lmck, VI, 92. [Encycl., pl. 258, fig. 3.]
Côtes de France.

[Syn. *L. magna* Cost. ; *Mactra lutraria* Linné.]

Lutraria Cottardi Payr. [p. 28, pl. I, fig. 1 et 2 ; Desh in
Lmck, VI, 94.] Corse.

Lutraria compressa Lmck, VI, 91. [Encycl., pl. 257, fig. 4.]
Océan Atlantique. [Vulgairement appelé Lavignon, Navillon.]

Genre **Eastonia** Gray

Eastonia rugosa Gmelin. [Lmck, VI, 91 ; Encycl., pl. 254, fig. 2.] Alger (JOLY).

Genre **Lazaria**

Lazaria pectunculus Gray. [Chenu, p. 136, fig. 655, 656 ; Encycl. n° 12.] Océan Indien.

FAMILLE DES TELLINIDÆ

Subfamille des Tellininae

Genre **Asaphis** Modeer

[Syn. *Capsula* Schmeh. ; *Sanguinolaria* Lmck. ; *Isarcha* Gistl.]

Asaphis rugosa Modeer. [Encycl., pl. 231, fig. 3-4 ; Chenu, p. 53, fig. 256.] Océan Indien, Suez (A. LETOURNEUX).
[Syn. *Venus deflorata* Linné.]

Genre **Psammobia** Lmck.

[Syn. *Gari* Schmeh. ; *Lutricola* Blvll. ; *Gatan* Adans. ; *Psammosolen* Brown.]

SECTIONS

- | | |
|--|---------------------------------|
| (1) <i>Gari</i> Schmeh. | (3) <i>Amphichaena</i> Phl. |
| (2) <i>Psammocola</i> Blvll. | [Syn. <i>Psammobella</i> Gray.] |
| [Syn. <i>Azor</i> Leach.] | |
| (2) <i>Psammobia vespertina</i> Lmck, VI, 173. Le Croisie (T. LETOURNEUX), calle de radoub d'Alger (A. LETOURNEUX). | |
| [Syn. <i>P. variabilis</i> Pult. ; <i>P. vespertinalis</i> Blvll. ; <i>P. picta</i> Spglr. ; <i>P. fragilis</i> Lmck. ; <i>P. florida</i> Lmck. ; <i>P. depressa</i> Penn. ; <i>P. albina</i> Dillw.] | |
| <i>Psammobia feroensis</i> Chemn. [Lmck, VI, 173 ; Chenu, p. 64, fig. 258.] Algérie (A. LETOURNEUX). | |
| [Syn. <i>P. Faroensis</i> Wkf. ; <i>P. angulata</i> Born. ; <i>P. Borni</i> Gmelin ; <i>P. incarnata</i> Pennant ; <i>P. muricata</i> Seacc. ; <i>P. trifasciata</i> Donovan. ; <i>P. truncata</i> Spglr.] | |

Psammobia sp. Suez (A. LETOURNEUX).

Psammobia virgata Lmck, VI, 171. Océan Indien.

Psammobia insignis Desh. [Chenu, p. 64, fig. 257.]
Océan Indien.

Genre **Sanguinolaria** Lmck.

[Syn. *Lobaria* Schmch.]

Sanguinolaria rosea Lmck., VI, 169. [Encycl., pl. 227, fig. 1 ;
Chenu, p. 65, fig. 265.] La Jamaïque (LEPELTIER).

Sanguinolaria violacea Desh., in Lmck., VI, 181. Mer Rouge
(M^{me} HERMITE).

Genre **Soletellina** Blvll.

[Syn. *Hiatula* Modeer.]

SECTIONS

- | | |
|--|------------------------------|
| (1) <i>Soletellina</i> Blvll. | (3) <i>Psammotella</i> Desh. |
| (2) <i>Psammotæa</i> Lmck.
Syn. <i>Capsella</i> Desh. | |
| (2) <i>Soletellina violacea</i> Lmck. Manille. | |

Genre **Tellina** Linné

SECTIONS

- | | |
|---|---|
| (1) <i>Musculus</i> Mart. | (8) <i>Tellinides</i> Lmck. |
| (2) <i>Tellinella</i> Gray. | (9) <i>Homala</i> Mörch. |
| (3) <i>Peronæoderma</i> Mörch.] | (10) <i>Peronæa</i> Poli. |
| (4) <i>Moera</i> H. A. Ad.
[Syn. <i>Donacilla</i> Gray.] | [Syn. <i>Psammotella</i> Blvll ;
<i>Omala</i> Schmch.] |
| (5) <i>Acropagia</i> Leach. | (11) <i>Metis</i> H. A. Ad. |
| (6) <i>Phylloda</i> Schmch. | |
| (7) <i>Tellinula</i> Chemnitz.
[Syn. <i>Fabulina</i> Gray ; <i>Angulus</i> Mhlfd.] | |
- (1) *Tellina radiata* Linné. [Lmck, VI, 187 ; Encycl., pl. 289,
fig. 2 ; Chenu, p. 66, fig. 272.] Côtes d'Amérique,
Suez (A. LETOURNEUX).
- (1) *Tellina radiata* Linné, var. *unimaculata* Lmck. Côtes
d'Amérique.

- (1) *Tellina serrata* Brocchi, Marseille (J. DE L'HOTELLERIE).
[Syn. *T. Brocchii* Cantr.]
- (2) *Tellina rugosa* Born. [Lmck, VI, 203 ; Encycl., pl. 290, fig. 1.] Taïti (M^m HERMITE).
- (2) *Tellina virgata* Linné. [Lmck, VI, 189 ; Encycl., pl. 288, fig. 2-4 ; Chenu, p. 67, fig. 273-274.] Océan Indien.
[Syn. *T. marginalis* Hanl. ; *T. jubar* Hanl.]
- (2) *Tellina donacina* Linné. [Lmck, VI, 198 ; Chenu, pp. 67-68, fig. 280-282.] Alger (A. LETOURNEUX, JOLY), Dalmatie (LECOMTE).
[Syn. *T. Lantivy* Payr. ; *T. subcarinata* Broch. ; *T. trifasciata* Penn. ; *T. variegata* Poli.]
- (2) *Tellina sulcata* Wood. Suez (A. LETOURNEUX).
- (2) *Tellina pulchella* Lmck, VI, 196. Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. *T. hybrida* Phl. ; *T. rostrata* Poli.]
- (2) *Tellina lingua-felis* Linné. [Lmck, VI, 202 ; Encycl., pl. 289, fig. 6.] Océan Indien.
- (2) *Tellina rostrata* Linné. [Lmck, VI, 61 ; Encycl., pl. 226, fig. 1 ; Chenu, p. 65, fig. 266.] Océan Indien.
[Syn. *T. radiata* Blainv.]
- (3) *Tellina punicea* Born. [Lmck, VI, 196 ; Chenu, p. 67, fig. 178-179.] Méditerranée.
- (4) *Tellina pygmæa* Phlp. Alger (A. LETOURNEUX).
- (5) *Tellina crassa* Pennant. [Lmck, VI, 201 ; Encycl., pl. 291, fig. 5.] Le Croisic (T. LETOURNEUX), Alger (JOLY).
[Syn. *T. depressa* Costa ; *T. maculata* Turt. ; *T. ovata* Brown. ; *T. rigida* Poli ; *T. subrotunda* Desh.]
- (5) *Tellina scobinata* Linné. [Lmck, VI, 201 ; Encycl., pl. 291, fig. 4 ; Chenu, p. 68, fig. 285.] Océan Indien.
- (5) *Tellina balaustina* Linné. [Lmck, VI, 209.] Adriatique (LE COMTE), Alger (JOLY).
- (5) *Tellina carnaria* Linné. Les Antilles.
- (5) *Tellina fausta* Pult. Océan Indien.
[Syn. *T. lævis*, Wood ; *T. striatula* Lmck, *T. remies* Lmck, VI, 199, non Linn ; Encycl., pl. 290, fig. 2].
- (7) *Tellina erythræa* Römer. Égypte.

- (7) *Tellina fabula* Linné. Alger (A. LETOURNEUX), La Tranche (Vendée) (T. LETOURNEUX).
[Syn. *T. fragilissima* Chemn. ; *T. vitrea* Gmelin.]
- (7) *Tellina incarnata* Lmck, VI, 196. Algérie (A. LETOURNEUX), Adriatique (LE COMTE).
[Syn. *T. depressa* Gmelin ; *T. squalida* Mont. ; *T. stazina* Gregor.]
- (7) *Tellina fabuliformis* Gronovius. Le Croisic.
- (7) *Tellina tenuis* Lmck, VI, 197. Le Croisic (T. LETOURNEUX).
[Syn. *T. incarnata* Linn. ex Weink.]
- (7) *Tellina exigua* Poli. Le Croisic.
[Syn. *T. aita* Gregor. ; *T. Browni* Gregor ; *T. Ludmilla* Gregor. ; *T. tenuis* Donovan.]
- (10) *Tellina planata* Linné. [Lmck., VI, 195 ; Encycl., pl. 289, fig. 4.] Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *T. nivea* Chemnitz ; *T. complanata* Gmelin ; *T. antilla* Gregor.]
- (10) *Tellina nitida* Poli. [Lmck., VI, 199.] Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *T. danilliana* Brus.]
- (10) *Tellina strigosa* Gmelin. Sénégal.
Tellina Blainvillei. Pondichéry.
Tellina solidula Solander. [Lmck, VI, 206.] Le Croisic (T. LETOURNEUX).
Tellina insignis Desh. Océan Indien.
Tellina sp. Pondichéry (EUEDEL).

Genre **Strigilla** Turt.

- Strigilla carnaria* Turton. [Chenu, p. 69, fig. 294-295.] La Guadeloupe (EUEDEL).

Genre **Macoma** Leach

- Macoma calcarea* Chemn. Groënland (MÖRCH).
[Syn. *M. lata* Gmelin ; *M. proxima* Brown ; *M. sabulosa* Spglr. ; *M. sordida* Couth. ; *M. tenera* Leach.]
- Macoma baltica* Linné. Danemarck (MÖRCH).
[Syn. *M. rubra* Cost. ; *M. solidula* Pult. ; *M. zonata* Dillw. ; *Tellina balicia* Linné.]

Macoma cumana Costa. Alger (JOLY, A. LETOURNEUX).
[Syn. *Tellina Costae* Phl.]

Genre **Gastrana** Schmeh.

[Syn. : *Fragilia* Desh. ; *Diodonta* Desh.]

Gastrana fragilis Linné. Marseille, Quiberon (LEBAHEZRE),
Alger (A. LETOURNEUX).

[Syn. : *G. nigella* Gregor. ; *G. ochroleuca* Payr. ; *G. striatula* Oliv. ; *G. tarentina* Lmck.]

Gastrana ochroleuca Desh. [Lmck, VI, 157 ; Payr., pl. I,
fig. 9-10 ; Chenu, p. 70, fig. 298-299.] Le Croisic (CAIL-
LIAUD).

Genre **Lucinopsis** Forb.

[Syn. *Dosinia* Gray ; *Mysia* Gray ; *Cyclina* Gray ; *Lajonkairia*
Desh.]

Lucinopsis undata Penn., Forbes et Hanley, Lmck. VI,
229 ; Chenu, p. 71, 302 ; Pornichet (CAILLIAUD).

[Syn. *L. incompta* Phl. ; *L. lactea* Lmck.]

Subfamille des Donacinæ

Genre **Donax** Linné

[Syn. *Chione* Mhlfld. ; *Donaciarius* Dumeril ; *Egeria* de Roissy ;
Cunerus Costa]

SECTIONS

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| (1) <i>Hecuba</i> Schmeh. | (4) <i>Machærodonax</i> Römer. |
| (2) <i>Chione</i> Scop. | (5) <i>Latona</i> Schmeh. |
| (3) <i>Serrula</i> Chemnitz. | (6) <i>Capsella</i> Gray. |
| [Syn. <i>Cuneus</i> , Gray.] | (7) <i>Heterodonax</i> Römer. |
- (2) *Donax rugosus* Linné, Lmck., VI, 244, Encycl. pl. 262,
fig. 5, Chenu, p. 72, fig. 306, Les Antilles.
- (2) *Donax denticulatus* Linné. [Lmck, VI, 246 ; Encycl.,
pl. 262, fig. 7 ; Chenu, p. 72, fig. 304-305.] Méditer-
ranée.
- (2) *Donax elongatus* Lmck, VI, 245. [Encycl., pl. 262, fig. 3.]
Côtes d'Afrique.

- (3) *Donax anatinus* Lmck, VI, 249. [Chenu, p. 73, fig. 317.]
Le Croisic (T. LETOURNEUX).
[Syn. *Donax fabagella* Lmck. ; *D. venustus* Poli ;
D. vittatus Lmck.]
- (3) *Donax semistriatus* Poli. Alger (A. LETOURNEUX).
- (3) *Donax californicus* Conr. Californie.
[Syn. *D. laevigatus* Desh. ; *D. obesus* Phl.]
- (3) *Donax serra* Chemnitz. [Encycl., pl. 260, fig. 3 ; Chenu,
p. 73, fig. 316.] Cap de Bonne-Espérance (IOBA).
[Syn. *D. ringens* Lmck.]
- (3) *Donax trunculus* Linné. [Lmck, VI, 248 ; Encycl.,
pl. 262, fig. 1 ; Chenu, p. 72, fig. 314.] Algérie (A. LE-
TOURNEUX).
- (5) *Donax faba* Chemnitz. [Lmck, VI, 241 ; Encycl.,
pl. 261, fig. 7 ; Chenu, p. 72, fig. 310.] Océan Indien
(LEPELTIER).
[Syn. *D. radians* Lmck.]
- (5) *Donax Lessoni* Desh. [In Lmck, VI, 250.] Chili, Pérou
(M^{me} HERMITE).
- (6) *Donax vinaceus* Gmelin. [Lmck., VI, 249.] Le Croisic
(CAILLIAUD).
[Syn. *D. complanatus* Mtg. ; *D. politus* Poli ; *D. va-
riegatus* Gmelin.]
- Donax Meroe* Lmck. [Encycl., pl. 361, fig. 1 ; Chenu, p. 88,
fig. 300-302.] Suez (A. LETOURNEUX).

Genre **Iphigenia** Schmch.

[Syn. *Capsa* Lmck. ; *Donacina* Fér. ; *Procos* Gistl.]

Iphigenia laevigata Lmck., VI, 254. Océan Indien.

Subfamille des *Scrobicularinæ*

Genre **Scrobicularia** Schmch.

[Syn. *Arenaria* Mhlfd. ; *Ligula* Mtg. ; *Laevignonus* Fér. ; *Lutraria*
Sow. ; *Calcinella* Desh.]

SECTIONS

- (1) *Scrobicularia* Schmch. (3) *Jacra* H. A. Ad.
(2) *Capsa* Bosc.

- (1) *Scrobicularia plana* Costa. Algérie (A. LETOURNEUX).
 [Syn. *S. arenaria* Schmch. ; *S. atterina* Gregor. ;
S. calcinella Adans ; *S. callosa* Oliv. ; *S. compressa*
 Lmck. ; *S. gaditana* Gmelin ; *S. orbiculata* Spglr. ;
S. piperata Lmck. VI, 92.]
- (2) *Scrobicularia Chemnitzii* Desh. [In Lmck., VI, 134.]
 Australie.
 [Syn. *Mya Novæ-Zelandæ* Chemn., Chenu, p. 76,
 fig. 331.]

Genre **Syndosmya** Recluz.

[Syn. *Abra* Leach. ; *Erycina* Lmck.]

Syndosmya alba Wood. [Lmck., VI, 128.] La Bernerie,
 (CAILLIAUD), Alger (JOLY, A. LETOURNEUX).

[Syn. *S. apesa* Gregor ; *S. Aradae* Biondi ; *S. Boissyi*
 Lmck. ; *S. opalina* Ren. ; *S. pellucida* Brus. ; *S.*
profundissima Forb. ; *S. radiata* Loven ; *S. Renieri*
 Bron. ; *S. semiradiata* Scacc ; *S. tumida* Brus.]

Syndosmya tenuis Mtg. [Lmck, VI, 128.] Marais salants du
 Croisic (CAILLIAUD).

[Syn. *S. trigona* Brus. ; *S. Bielzi* Brus.]

Syndosmya ovata Philippi. Espagne.

[Syn. *S. trigona* Sandri ; *S. vitrea* Sandri.]

Syndosmya intermedia Thomps., sl.

[Syn. *S. nitida* Müll.]

Syndosmya prismatica Montagu. Alger.

[Syn. *S. angulosa* Ren.]

Syndosmia triangularis Recluz. Vasières des marais salants
 du Croisic.

Syndosmia nebrastrala, s. n. d'a. Égypte (A. LETOURNEUX).

Syndosmia apelina Ren. Marais salants du Croisic (CAIL-
 LIAUD).

Subfamille des *Paphiinae*

Genre **Paphia** Bolt.

[Syn. *Eryx* Sowerby]

SECTIONS

(1) *Paphia* Bolt.

(2) *Taria* Gray.

(1) *Paphia glabrata* Desh. Sumatra.

Genre **Mesodesma** Deshayes.

[Syn. *Machaena* Leach.]

Mesodesma cornea. Poli, s. l.

Genre **Ceronia** Gray.

Ceronia donacia Gray. [Lmck, VI, 106 ; Chenu, fig. 341.]
Golfe de Magellan (LEPELTIER).

Genre **Ervilia** Turt.

Ervilia scaliola Issel. Suez (A. LETOURNEUX).

FAMILLE DES VENERIDÆ

Subfamille des Venerinæ

DIVISION DES CITHEREA Lmck.

Genre **Tivela** Lmck.

[Syn. *Trigona* Mhlfd ; *Trigonella* Conr.]

Tivela tripla Lmck., VI, 302. [Encycl., pl. 269, fig. 4 ; Chenu, p. 88, fig. 389.] Océan Pacifique.

Tivela radiata Gray. [Chenu, p. 88, fig. 388.] Amérique.
[Syn. *T. byronensis* d'Orbigny].

Genre **Meretrix** Lamarck

Meretrix impudica Chemnitz. [Lmck., VI, 299 ; Encycl., pl. 269, fig. 1.] Océan Indien.

[Syn. *Cytherea meretrix* Paetel, var.]

Meretrix impudica Chemnitz, var. *zonaria*. [Lmck., VI, 299.]
Océan Indien.

[Syn. *Meretrix zonaria* Lamarck.]

Meretrix impudica Chemnitz, var. *castanea*. Lmck., VI, 299 ; [Desh., in Lmck., VI, 298 ; Encycl., pl. 269, fig. 2.]
Océan Indien.

Genre **Callista** Poli

Callista Chione Linné. [Lmck., VI, 305 ; Encycl., pl. 266, fig. 1.] Méditerranée (D'ORBIGNY père).

[Syn. *C. glaber* Cost. ; *C. nitidula* Lmck. ; *C. vulgaris* Gray.]

Callista maculata Linné. [Lmck., VI, 306 ; Encycl., pl. 265, fig. 4 ; Chenu, p. 87, fig. 384.] Amérique, Océan Pacifique.

Callista erycina Linné. [Lmck., VI, 303 ; Encycl., pl. 264, fig. 2.] Océan Indien.

[Syn. *C. cedo-nulli* Meusch.]

Callista umbonella Lmck., VI, 319. Brésil.

Genre **Caryatis** Röm.

Caryatis rudis Poli. Alger (JOLY).

[Syn. *C. nux* Röm. ; *C. ochropicta* Kryn. ; *C. pectunculus* Brochi ; *C. venetiana* Lmck. VI, 310.]

Caryatis albina Lmck., VI, 307. La Guadeloupe (M^{me} HERMITE).

Genre **Dione** Gray

SECTIONS

(1) *Dione* Gray.

(2) *Amiantis* Conr.

(1) *Dione circinata* Born. Côtes d'Afrique.

[Syn. *D. guineensis* Gmelin ; Lmck. VI, 311 ; Encycl. pl. 265, fig. 1 ; Chenu, p. 86, fig. 381 ; *D. rubra* Gmelin.]

(1) *Dione multispinosa* Sowerby. [Lmck., VI, 312 ; Encycl., pl. 275, fig. 1 ; Chenu, p. 86, fig. 378-379.] Océan Pacifique.

[Syn. *Cytherea Dione* Linné ; *Dione longispina* Mörch.]

Genre **Lioconcha** Mörch.

Lioconcha arabica Chemnitz. [Lmck., VI, 312.] Mer Rouge (A. LETOURNEUX).

[Syn. *L. bicolorata* Chemnitz ; *L. Doritis* Röm.]

Lioconcha impressa Hanley, Hong-Kong (EUDEL).

Genre **Crista** Röm.

Crista pectinata Linné. Suez (A. LETOURNEUX).

Crista divaricata Chemnitz. [Lmck. VI 324 ; Encycl., pl. 273 fig. 5 ; Chenu p. 88 fig. 393-394.] Océan Indien.
[Syn. *C. incrustata* Born. ; *C. persicitis* Meusch. ; *C. testudinalis* Lmck.]

Crista gibbia Lmck VI 323. [Encycl. pl. 271 fig. 4.] Océan Indien.

(Syn. *C. angulata* Bolt. ; *C. pectinata* Born. ; *C. ranella* Desh. ; *C. tumida* Bolt.)

Genre **Circe** Schmch

Circe rugifera Lmck. VI 326. Mer Rouge (M^{me} HERMITE).
[Syn. *C. corrugata* Chemnitz.]

Circe minima Montagu. Alger (JOLY).
[Syn. *C. apicalis* Philippi ; *C. Cyrilli* Philippi ; *C. minuta* Brown. ; *C. pumila* Lmck. VI, 370.]

Circe scripta Linné. [Lmck. VI 320 ; Encycl. pl. 273 et 274. fig. 1.] Penang.

[Syn. *C. fulgurata* Reeve ; *C. orbica* Reeve ; *C. personata* Reeve ; *C. sugillata* Reeve.]

Circe intermedia Reeve. Penang.

Circe picta Schm. [Lmck. VI 309 ; Encycl. pl. 273 fig. 2.] Océan Indien.

DIVISION DES VENUS

Genre **Tapes** Mhlfd.

[Syn. *Pullastra* Sowerby]

SECTIONS

- | | |
|---|---------------------------|
| (1) <i>Textrix</i> Röm. | (3) <i>Amygdala</i> Röm. |
| (2) <i>Parembola</i> Röm. | (4) <i>Hemitapes</i> Röm. |
| (1) <i>Tapes textrix</i> Chemnitz. [Lmck., VI, 354 ; Encycl., pl. 283, fig. 1.] Suez (A. LETOURNEUX), Océan Indien.
[Syn. <i>T. textile</i> Gmelin ; <i>T. undulata</i> Born.] | |
| (1) <i>Tapes malabarica</i> Chemnitz. Penang (EUDEL).
[Syn. <i>T. gallus</i> Spglr. ; <i>T. rhombifera</i> Hanl. ; <i>T. turgidula</i> Reeve.] | |
| (1) <i>Tapes papilionacea</i> Lmck., VI, 354. [Encycl., pl. 281, fig. 3. Chenu, p. 93, fig. 414.] Océan Indien.
[Syn. <i>Venus rotundata</i> Linn.]. | |

- (2) *Tapes sulcaria* Lmck., VI, 354. Bornéo (IOBA).
- (3) *Tapes truncata* Lmck., VI, 358. Tchéfou (VESCO).
- (3) *Tapes Philippinarum* Ad. et Reeve. La Réunion.
- (3) *Tapes aurea* Forbes. [Lmck., VI, 360 ; Encycl., pl. 283, fig. 3.] Le Croisic (CAILLIAUD), Constantinople, Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. *T. ænea* Turt.]
- (3) *Tapes pullastra* Wood. [Lmck., VI, 357.] Loire-Inférieure.
[Syn. *T. perforans* Mtg. ; *T. saxatilis* Flmmg. ; *T. plagia* Jeffr. ; *T. perforans* Mtg.]
- (3) *Tapes læta* Poli. Algérie (A. LETOURNEUX), Égypte (A. LETOURNEUX), Méditerranée.
[Syn. *T. phaseolina* Lmck. ; *T. petalina* Lmck. ; *T. florida* Lmck. VI, 364 ; *T. bicolor* Lmck. ; *T. catenifera* Lmck.]
- (3) *Tapes decussata* Linné. [Lmck., VI, 356 ; Encycl., pl. 283, fig. 4 ; Chenu, p. 94, fig. 419.] Le Croisic, Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. *T. deflorata* Born. ; *T. fusca* Gmelin ; *T. literata* Penn. ; *T. obscura* Gmel. ; *T. reticulata* Cost. ; *T. rhomboides* Gmelin ; *T. sanguinolenta* Gmelin.]
- (3) *Tapes geographica* Gmelin. [Lmck., VI, 355 ; Chenu, p. 94, fig. 420.] Algérie.
[Syn. *T. glandina* Krss. ; *T. punctulata* Gmelin ; *T. retifera* Lmck. ; *T. saxicola* Dan. et S. ; *T. Tenori* Cost.]
- (4) *Tapes virginea* Linné. Loire-Inférieure.
[Syn. *T. callipyga* Lmck. ; *T. fasciata* Cost. ; *T. flammiculata* Lmck. ; *T. inominata* Dan. ; *T. rhomboides* Penn.]
- (4) *Tapes virginea* Linné, var. *rimularis* Lmck. Hong-Kong (EUDEL).
- (4) *Tapes pinguis* Chemnitz. Pondichéry.
[Syn. *T. opima* Gmelin ; *T. triradiata* Chemnitz.]
- Tapes rœmeriana* Issel. Suez (A. LETOURNEUX).
- Tapes punctifera* Lmck., VI, 353. [Chenu p. 93, fig. 418] sl.
- Tapes* sp. Cochinchine.
- Tapes* sp. Mer Rouge (A. LETOURNEUX).
- Tapes* sp. Alger (A. LETOURNEUX).

Genre **Mercenaria** Schmch.

Mercenaria mercenaria Linné. [Lmck., VI, 346 ; Encycl., pl. 263 ; Chenu, p. 82, fig. 356-358.] Amérique boréale.
[Syn. *M. violacea* Schmch.]

Genre **Anaitis** Röm.

Anaitis casina Linné. [Lmck., VI, 340 ; Encycl., pl. 275, fig. 6. Alger (A. LETOURNEUX).

[Syn. *Venus casinula* Desh. ; *Venus consobrina* Desh. ; *V. discina* Lmck. ; *V. lactea* Donov. ; *V. membranacea* Cost. ; *V. reflexa* Mtg.]

Anaitis paphia Linné. [Lmck., VI, 371 ; Encycl., pl. 275, fig. 5.] Amérique, Océan Indien.

Anaitis thiara Dillw. [Lmck., VI, 372 ; Encycl., pl. 275, fig. 4.] Océan Indien.

[Syn. *Venus alta* Reeve].

Anaitis fasciata Donov. [Lmck., VI, 370 ; Encycl., pl. 276, fig. 2.] Le Croisic (BOURGAULT-DUCOUDRAY).

[Syn. *Venus biradiata* Risso ; *Venus Brongnarti* Payr. pl. I, fig. 23-25.]

Anaitis plicata Gmelin. [Lmck., VI, 341 ; Encycl., pl. 275, fig. 3 ; Chenu, p. 84, fig. 365.] Océan Indien.

Genre **Cryptogramma** Mörch

Cryptogramma squamosa Linné. [Lmck., VI, 328 ; Chenu, p. 83, fig. 361.] Océan Indien.

Cryptogramma flexuosa Linné. [Lmck., VI, 326 ; Encycl., pl. 266, fig. 6-7, pl. 267, fig. 1.] Océan Indien.

[Syn. *Venus lunularis* Lmck. ; *Venus Phryne* Mke.]

Cryptogramma subrugosa Ant., Panama.

Genre **Chione** Mhlfld.

SECTIONS

(1) *Omphaloclathrum* Klein. (3) *Chamelæa* Klein.

(2) *Leucoma* Röm. (4) *Ventricola* Klein.

(1) *Chione scabra* Hanley. Pondichéry.

(1) *Chione Listeri* Gray. La Réunion (EUDEL), Suez (A. LETOURNEUX).

- (1) *Chione reticulata* Linné. [Lmck., VI, 335 ; Encycl., pl. 267, fig. 4-7 ; Chenu, p. 82, fig. 355.] Océan Indien. Bornéo (IOBA).
[Syn. *Venus corbis* Lmck., VI, 337.]
- (1) *Chione ovata* Penn. [Lmck., VI, 370.] Alger (JOLY).
(Syn. *Venus pectinula* Lmck.)
- (1) *Chione cochinchinensis* Sowerby. Pondichéry.
- (1) *Chione Dombeyi* Lmck., VI, 346. Chili (LEPELTIER).
- (1) *Chione puerpera* Linné. [Lmck., VI, 333 ; Encycl., pl. 278, fig. 1-2 ; Chenu, p. 82, fig. 351-353.] Océan Indien.
- (1) *Chione toreuma* Gld. Australie.
[Syn. *Ch. crebrisulca* Sowerby.]
- (1) *Chione cancellata* Chemnitz. [Lmck., VI, 341 ; Encycl., pl. 268, fig. 4.] Amérique.
- (2) *Chione granulata* Gmelin. [Lmck., VI, 344 ; Encycl., pl. 272, fig. 3, pl. 274, fig. 5.]
- (3) *Chione gallina* Linné. [Lmck., VI, 347 ; Encycl., pl. 268, fig. 3.] Côtes de France (T. LETOURNEUX), Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *Venus laminosa* Mtg.]
- (4) *Chione verrucosa* Linné. [Lmck., VI, 338 ; Chenu, p. 81, fig. 348-350.] Le Croisic (T. LETOURNEUX), Algérie (A. LETOURNEUX).
(Syn. *Venus erycina* Penn. ; *V. strigosa* Cost. ; *V. subcordata* Mtg.)
- Chione modesta*. Desh. Amérique (PETIT DE LA SAUSSAYE).

Subfamille des Dosiniinæ

Genre **Dosinia** Scop.

[Syn. *Artemis* Poli, *Orbiculus* Mhlfd., *Exoleta* Brown.,
Asa Leach., *Arctoæ* Riss., *Taras* Riss.]

Dosinia exoleta Linné. [Lmck., VI, 314 ; Encycl., pl. 279, fig. 5, pl. 280, fig. 1.] Le Croisic.
(Syn. *D. capillacea* Costa ; *D. sinuata* Gmelin.)

Dosinia variegata Gray. La Réunion (EUDEL).
(Syn. *D. australis* Quoy.)

Dosinia lupinus Poli. Alger (JOLY).

(Syn. *Cytherea lunaris* Lmck. VI, 314.)

Dosinia lincta Pult. [Lmck., VI.] Loire-Inférieure (CAILLIAUD). Alger (A. LETOURNEUX).

(Syn. *D. sinuata* Turt.)

Dosinia radiata Reeve. Suez.

(Syn. *D. cotan* Adans.)

Dosinia concentrica Born. [Lmck., VI, 316 ; Encycl., pl. 279, fig. 2.] Côtes d'Amérique.

Genre **Cyclina**

Cyclina chinensis Chemnitz. [Chenu, p. 91, fig. 409.] Chine (VESCO).

(Syn. *C. tenuistriata* Lmck. VI, 291.)

Genre **Clementia** Gray

Clementia Cumingi Deshayes. Suez.

Subfamille des *Petricolidæ*

Genre **Venerupis** Lmck.

[Syn. *Irus* Oken ; *Rupellaria* Fl. de B.]

Venerupis Lajonkairi Payr. Alger (JOLY).

Venerupis perforans Lmck., VI, 162. La Rochelle (T. LETOURNEUX).

Venerupis Irus Linné. [Lmck., VI, 163 ; Chenu, p. 95, fig. 425.] Le Croisic (CAILLIAUD), Algérie (A. LETOURNEUX).

[Syn. *V. cancellata* Oliv. ; *V. cornubiensis* Penn. ; *V. foliata* Da Costa,]

Genre **Cypricardia** Lmck.

[Syn. *Libitina* Schmeh.]

Cypricardia Renieri Nardo. Alger (JOLLY).

Cypricardia rostrata Lmck., VI, 439. [Chenu, p. 96, fig. 430-431.] Nouvelle Hollande.

Cypricardia coralliophaga Chemnitz. [Lmck., VI, 439 ; Encycl., pl. 234, fig. 5 ; Chenu, p. 99, fig. 444-445.] Amérique.

[Syn. *Cypricardia hornbeckiana* d'Orb.]

Genre **Petricola** Lmck.

Petricola lithophaga Retz. Alger (JOLLY).

[Syn. *P. costellata* Lmck. ; *P. decussata* Montagu ;
P. roccellaria Lmck. ; *P. ruperella* Lmck. ; *P. striatu*
Lmck.]

FAMILLE DES CYPRINIDÆ

Genre **Cyprina** Lmck.

[Syn. *Cardia* Fér. ; *Arctica* Schmch. ; *Asmidia* Gistl. ; *Cyclas*
Link.]

Cyprina islandica Linné. [Lmck., VI, 290 ; Encycl., pl. 301,
fig. 1 ; Chenu, p. 102, fig. 458-460.] Islande.

[Syn. *C. bucardium* Born. ; *C. crassa* Cost. ; *C. mer-*
cenaria Penn. ; *C. vulgaris* Sow.]

FAMILLE DES CYRENIDÆ

Genre **Cyrena** Lmck.

[Syn. *Geloina* Gray ; *Pseudocyrena* Brgt. ; *Cyrenocyclas* Agassiz ;
Polymesoda Rfq.]

SECTIONS

(1) *Cyrena* Lmck.

(2) *Egeta* H. A. Ad.

Cyrena triangularis Mettcalf. Saïgon (Vesco).

Cyrena zeylanica Lmck., VI, 276. [Encycl., pl. 302, fig. 4 ;
Chenu, p. 103, fig. 462.] Cochinchine (Vesco).

Cyrena caroliniensis Lmck., VI, 276. Pensacola (PETIT DE LA
SAUSSAYE).

[Syn. *C. caroliniana* Barc.]

FAMILLE DES CARDIIDÆ

Genre **Cardium** Linné

(1) *Cardium* Linné.

(4) *Acanthocardia* Gray.

(2) *Bucardium* Gray.

(5) *Cerastoderma* Poli.

(3) *Trachycardium* Mörch.

(6) *Serripes* Bk.

- (1) *Cardium costatum* Linné. [Lmck., VI, 389; Encycl., pl. 292, fig. 1 ; Chenu, p. 107, fig. 483-484.] Sénégal.
- (1) *Cardium hians* Brocchi. [Chenu, p. 107, fig. 185.] Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *C. indicum* Lmck. VI, 390.]
- (3) *Cardium muricatum* Chemnitz. [Lmck., VI, 398; Encycl., pl. 297, fig. 1 ; Chenu, p. 108, fig. 487-489.] Amérique.
- (3) *Cardium leucostomum* Born. La Jamaïque.
[Syn. *C. marmoreum* Lmck. VI, 399 ; Encycl. pl. 297, fig. 3.]
- (4) *Cardium aculeatum* Linné. [Lmck., VI, 394 ; Encycl., pl. 298, fig. 4.] Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *C. ciliare* Penn. ; *C. parvum*, Cost.]
- (4) *Cardium erinaceum* Lmck., VI, 397. [Encycl., pl. 297, fig. 5.] Algérie (A. LETOURNEUX).
- (4) *Cardium echinatum* Linné. [Lmck., VI, 396; Encycl., pl. 298, fig. 3.] Loire-Inférieure (CAILLIAUD), Algérie (WEINKAUFF, JOLLY).
[Syn. *C. ciliare* Linné ; *C. Deshayesi* Payr. pl. 1, fig. 33-35 ; *C. mucronatum* Gmelin ; *C. paucicostatum* Sow. ; *C. spinosum* Mat.]
- (4) *Cardium isocardia* Linné. [Lmck., VI, 398; Encycl., pl. 297, fig. 4.] Côtes d'Amérique.
- (5) *Cardium islandicum* Chemnitz. Groënland (MÖRCH).
[Syn. *C. arcticum* Sowerby ; *C. ciliatum* Fab. ; *C. pubescens* Couth.]
- (5) *Cardium exiguum* Gmelin. [Lmck., VI, 408.] Alger (JOLY).
[Syn. *C. aquilinum* Mittr. ; *C. parasitum* Cost. ; *C. parvum* Phl. ; *C. pygmæum* Donow. ; *C. Siculum* Sowerby ; *C. subangulatum* Scace.]
- (5) *Cardium edule* Linné. [Lmck., VI, 406 ; Encycl., pl. 312, fig. 2 ; Chenu, p. 108, fig. 493-495.] Côtes de France (T. LETOURNEUX), Danemark (MÖRCH).
[Syn. : *C. balticum* Reeve ; *C. crenulatum* Lmck. ; *C. glaucum* Brug. ; *C. Lamarcki* Reeve ; *C. parvulum* Dkr. ; *C. pectinatum* Lmck. ; *C. rusticum* Chemn. ; *C. vulgare* Da Costa ; *C. zonatum* Brown.]

- (5) *Cardium papillosum* Poli. Algérie (JOLY, A. LETOURNEUX).
[*C. planatum* Ren.; *C. Polii* Payr.; *C. scobinatum* Lmck., VI, 408.]
- (6) *Cardium groënlandicum* Chemnitz. [Encycl., pl. 300, fig. 7; Chenu, p. 109, fig. 496-498.] Groënland. (MÖRCH).
[Syn. *C. boreale* Reeve; *C. columba* Lea; *C. edentulum* Mtg.; *C. Fabricii* Desh.; *C. radiatum* Donovan.]
- (6) *Cardium norwegicum* Spglr. [Lmck., VI, 402-403; Encycl., pl. 299, fig. 2, pl. 300, fig. 2.] Loire-Inférieure (CAILLIAUD, LEPELTIER).
[Syn. *C. laevigatum* Penn.; *C. Pennanti* Bk.; *C. serratum* Brug.]
- (6) *Cardium oblongum* Chemn. Corse (PAYRAUDEAU).
[Syn. *C. sulcatum* Lmck.; *C. crassum* Gmelin; *C. flavum* Born.)
- Cardium tuberculatum* Linné. [Lmck., VI, 397-405; Encycl., pl. 300, fig. 1; Chenu, p. 108, fig. 402.] Loire-Inférieure (CAILLIAUD), Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. *C. rusticum* Linné; *C. tuberculare* Sowerby.]
- Cardium* sp. Zanzibar.
- Cardium* sp. Égypte (A. LETOURNEUX).

Genre **Papyridea** Sowerby

- (1) *Papyridea* Sowerby. (2) *Fulvia* Gray.

Papyridea rugata Gronov. [Lmck., VI, 393; Encycl., pl. 296, fig. 5.] Océan Atlantique.
[Syn. *P. aperta* Chemnitz.]

Genre **Lævicardium** Sowerby

[Syn. *Liocardium* Mörch.]

Lævicardium lyratum Sow. [Chenu, p. 110, fig. 507.] Bornéo.

Genre **Hemicardium** Cuvier

[Syn. *Hemicardia* Klein; *Cor* Meusch.; *Corculum* Bolt.; *Cardissa* Mhlfd.; *Isocardia* Oken]

SECTIONS

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| (1) <i>Hemicardium</i> Cuvier. | (3) <i>Ctenocardia</i> H. A. Ad. |
| (2) <i>Fragum</i> Bolt. | (4) <i>Lumulicardia</i> Gray. |
- (1) *Hemicardium cardissa* Linné. [Lmck., VI, 411 ; Encycl., pl. 293, fig. 3 ; Chenu, p. 111, fig. 518.] Océan Indien.
- (2) *Hemicardium unedo* Linné. [Lmck., VI, 409 ; Encycl., pl. 295, fig. 4 ; Chenu, p. 112, fig. 522.] Hong-Kong (VESCO).
- (3) *Hemicardium fragum* Linné. [Lmck., VI, 410 ; Encycl., pl. 295, fig. 3.] Océan Indien.
- (3) *Hemicardium medium* Linné. [Lmck., VI, 409 ; Encycl., pl. 295, fig. 1.] Océan Indien.
- (4) *Hemicardium retusum* Linné. [Lmck., VI, 410 ; Encycl., pl. 294, fig. 3 ; Chenu, p. 112, fig. 524-525.] Mer Rouge (IOBA).
[Syn. *Cardium subretusum* Sowerby.]

FAMILLE DES ISOCARDIIDÆ

[Syn. *Bucardiidae*]

Genre **Isocardia** Lmck.

[Syn. *Glossoderma* Poli ; *Bucardium* Mhlfd.]

SECTIONS

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (1) <i>Tychocardia</i> Linné. | (2) <i>Meiocardia</i> H. A. Ad. |
|-------------------------------|---------------------------------|
- (1) *Isocardia cor* Linné. [Lmck., VI, 445 ; Encycl., pl. 232, fig. 1 ; Chenu, p. 113, fig. 530-532.] La Rochelle (D'ORBIGNY), Loire-Inférieure (CAILLIAUD), Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *Isocardia hibernica* Reeve.]
- (2) *Isocardia moltkiana* Spglr. [Lmck., VI, 447 ; Encycl., pl. 233, fig. 1 ; Chenu, p. 113, fig. 533.] Océan Indien.

FAMILLE DES CHAMIDÆ

Genre **Chama** Linné

[Syn. *Globus* Klein ; *Jataronus* Adans ; *Macrophyllum* Meusch. ; *Maceris* Modeer ; *Macrophylla* Mart. ; *Psilopus* Poli.]

SECTIONS

- (1) *Chama* Linné. (2) *Accinella* Schmch.
- (1) *Chama lazarus* Linné. [Encycl., pl. 196, fig. 4-5.] Océan Indien.
[Syn. *Ch. damaecornis* Lmck. VI, 580.]
- (1) *Chama gryphoides* Linné. [Lmck., VI, 521 ; Encycl., pl. 297, fig. 2.] Alger (JOLY).
[Syn. *Ch. asperella* Lmck. ; *Ch. morga* Gregor. ; *Ch. ridella* Gregor. ; *Ch. spongilla* Gregor. ; *Ch. squamosa* Lmck.]
- (1) *Chama sinistrorsa* Brocchi. Algérie (JOLY).
[Syn. *Ch. gryphina* Lmck. VI, 587.]
- (2) *Chama arcinella* Linné. [Lmck. VI, 584 ; Encycl., pl. 197 fig. 4 ; Chenu, p. 117, fig. 555.] Amérique.
Chama Corbieri Jonas. [J. de Conchyl., 1865, p. 117.] Suez (A. LETOURNEUX).
Chama aculeatum Linné. La Rochelle.

FAMILLE DES TRIDACNIDÆ

[Syn. *Chametrachæidæ*]

Genre **Tridacna** Costa

[Syn. *Labrum* Meusch. ; *Lavacrum* Mart. ; *Chametrachæa* Klein]

Tridacna elongata Lmck. Suez.

Tridacna gigas Lmck., VI, 8. [Encycl., pl. 235, fig. 1.] Océan Indien.

Genre **Hippopus** Lmck.

[Syn. *Pelvis* Mhlfd. ; *Cerceis* Gistl.]

Hippopus maculatus Lmck., VI, 11. [Encycl., pl. 236, fig. 2 ; Chenu, p. 118, fig. 564-565.] Océan Indien.

[Syn. *Chama hippopus* Linné.]

FAMILLE DES LUCINIDÆ

Genre **Lucina** Brug.

[Syn. *Phacoides* Blainville]

SECTIONS

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) <i>Lucina</i> Brug. | (4) <i>Miltha</i> H. A. Ad. |
| (2) <i>Cyclas</i> Klein. | (5) <i>Myrtea</i> Turt. |
| (3) <i>Codakia</i> Scop. | [Syn. <i>Cyrachaea</i> Leach.] |
| [Syn. <i>Chama</i> Mart. | |
| — <i>Lentillaria</i> Schmeh.] | |
- (1) *Lucina jamaicensis* Lmck., VI, 223. [Encycl., pl. 284, fig. 2.] Les Antilles.
- (2) *Lucina divaricata* Linné. [Lmck., VI, 226 ; Encycl., pl. 285, fig. 4 ; Chenu, p. 120, fig. 572.] Le Croisic (CAILLIAUD), Alger.
[Syn. *L. arcuata* Montagu ; *L. commutata* Chemnitz ; *L. discors* Montagu.]
- (3) *Lucina tigrina* Linné. [Lmck., VI, 318 ; Encycl., pl. 277, fig. 4.] Océan Indien.
- (3) *Lucina pecten* Lmck., VI, 230. Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *L. reticulata* Poli.]
- (3) *Lucina fibula* Reeve. La Réunion (EUEDEL).

Genre **Loripes** Poli.

[Syn. *Anodontia* Link.]

- Loripes leucoma* Turton. Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. *L. lactea* Poli ; *Lucina lucinalis* Lmck. ; *L. amphidesmoides* Desh. ; *L. Desmaresti* Payr.]
- Loripes lactea* Linné. Marseille (J. DE L'HÔTELLERIE), Le Croisic (CAILLIAUD), Alger (WEINKAUFF).
[Syn. *L. bullula* Reeve ; *L. fragilis* Philippi.]

Genre **Cryptodon** Turt.

[Syn. *Thyasira* Leach. ; *Beguania* Leach. ; *Axinus* Sow. ; *Ptychina* Phl. ; *Clausina* Jeffr.]

Cryptodon Gouldi Philippi. Groënland (MÖRCH).

Genre **Corbis** Cuvier.

- [Syn. *Gafrarium* Bolt. ; *Fimbria* Mhlfd. *Idothea* Schmeh.]
- Corbis fimbriata* Linné. (Lmck, VI, 218 ; Encycl., pl. 286, fig. 3 ; Chenu, p. 121, fig. 584.) Océan Indien.
[Syn. *Corbis magna* Mhlfd.]

FAMILLE DES UNGULINIDÆ

Genre **Ungulina** Daud. '

[Syn. *Clotho* Bast.]

Ungulina oblonga Daud. [Lmck., VI, 122 ; Chenu, 122, fig. 586.] Sénégal (RANG).

[Syn. *Ungulina transversa* Lmck.]

Genre **Diplodonta** Bronn

[Syn. *Mysia* Leach. ; *Sphaerella* Conr. ; *Mittrea* Gray.]

Diplodonta Savignyi Vaillant. Suez.

[Syn. *Lucina edentula* Eudel.]

Diplodonta rotundata Montagu. Loire-Inférieure (CAILLIAUD).

[Syn. *D. Barleei* Jeffr. ; *D. dilatata* Philippi ; *Lucina rotundata* Turt.]

FAMILLE DES LASEIDÆ

Genre **Lasea** Leach.

[Syn. *Poronia* Recluz.]

Lasea rubra Montagu. Marseille (DE L'HÔTELLERIE).

[Syn. *L. Fontainei* Mittr. ; *L. nucleola* Lmck. ; *L. seminula* Philippi ; *L. violacea* Scacc.]

Lasea purpurata Philippi. La Réunion (EUEDEL).

Genre **Kellia** Turt.

[Syn. *Bornia* Phl. ; *Chironia* Dsh. ; *Solecardia* Conr. ; *Erycina* Recluz.]

Kellia suborbicularis Mtg. [Chenu, p. 125, fig. 598.] Ilot-du-Four (CAILLIAUD).

Kellia miliaris Philippi. Mer Méditerranée (A. LETOURNEUX).

Kellia corbuloides Philippi. Alger (JOLY).

Kellia Geoffroyi Payr. [Pl. I, fig. 3-5 ; Lmck., VI, p. 118 ; Chenu, p. 124, fig. 594.] Algérie (A. LETOURNEUX).

Genre **Montacuta** Turt.

Montacuta ferruginosa Mtg. Morbihan (LEBAHEZRE).

Montacuta semistriata. Alger (A. LETOURNEUX).

FAMILLE DES GALEOMNIDÆ

Genre **Galeomna** Turt.

[Syn. *Parthenope* Scacc. ; *Hiatella* Cost.]

Galeomna Turtoni Sow. [Chenu, p. 128, fig. 611.] Le Croisic (CAILLIAUD).

[Syn. *G. Polii* Cost. ; *G. punctura* Scacc. ; *G. striolata* Delle.]

FAMILLE DES SOLEMYADÆ

[Syn. *Solemyidæ*]

Genre **Solemya** Lmck.

[Syn. *Solenomya* Mke ; *Solenymya* Sow.]

Solemya mediterranea Lmck., VI, 125. [Encycl., pl. 225, fig. 4.] Méditerranée.

[Syn. *Sol. togata* Poli.]

FAMILLE DES ASTARTIDÆ

[Syn. *Crassatellidæ*]

Genre **Astarte** Sow.

[Syn. *Crassina* Lmck. ; *Tridonta* Schmeh. ; *Maetrina* Brown. ; *Nicania* Leach.]

Astarte sulcata Da Costa. [Lmck., VI, 257 ; Chenu, p. 130, fig. 616.] Océan Britannique.

[Syn. *A. danmoniensis* Sow. ; *A. crassatella* Blvll. ; *A. scotica* Mtg.]

Astarte Banksi Leach., Groënland (MÖRCH).

[Syn. *A. compressa* Mtg. ; *A. globosa* Möll. ; *A. Montacuti* Turt. ; *A. multistriata* Macgill. ; *A. striata* Gray.]

Astarte compressa Linné. Groënland (MÖRCH).

[Syn. *A. ovata* Brown. ; *A. elliptica* Brown. ; *A. semisulcata* Gray ; *A. semisulcata* Möller ; *A. sulcata* Nils.]

Astarte semisulcata Leach. Groënland (MÖRCH).

[Syn. *A. arctica* Gray ; *A. borealis* Chemnitz ; *A. corrugata* Brown. ; *A. lactea* Brod., et Sow. ; *A. paucicostata* Krause ; *A. placenta* Mörch. ; *A. rhomboidalis* Leach.]

Astarte biplicata Philippi, Alger (A. LETOURNEUX).

Astarte fusca Poli, [Lmck., VI, 257.] Alger (JOLY).

[Syn. *A. affinis* Cantr. ; *A. incrassata* Brocchi ; *A. Petagnae* Da Costa ; *A. rugata* Sow.]

Genre **Woodia** Desh.

Woodia digitaria Linné. [Lmck., VI, 231.] Alger (A. LETOURNEUX, JOLY).

[Syn. *Lucina digitalis* Lmck. ; *L. digitaria* Linné.]

Genre **Gouldia** C. B. Al.

Gouldia bipartita Phl. Palerme (DE L'HÔTELLERIE).

Gouldia lamellosa Issel. Suez (A. LETOURNEUX).

Genre **Crassatella** Lmck.

[Syn. *Paphia* Roissy ; *Roissya* Less.]

Crassatella sulcata Lmck. Nouvelle-Hollande.

Genre **Cardita** Lmck.

[Syn. *Actinobulus* Klein ; *Agaria* Gray ; *Cardiocardites* Blvll. ; *Cardiola* Brod.]

Cardita bicolor Lmck. Pondichéry.

Cardita Ajar Brug. Sénégal (LE MAOUT).

Cardita turgida Lmck., VI, 427. Océan Indien.

Cardita sulcata Lmck., VI, 425. Alger (JOLY).

[Syn. *C. antiquata* Poli.]

Genre **Mytilicardia** Blvll.

[Syn. *Mytilicardita* Ant. ; *Jesonia* Gray.]

SECTIONS

- | | |
|--|-------------------------------|
| (1) <i>Mytilicardia</i> Blvll. | (3) <i>Glans</i> Mhlfld. |
| (2) <i>Beguina</i> Bolt.
Syn. <i>Azarella</i> Gray. | (4) <i>Thacalia</i> H. A. Ad. |

(1) *Mytilicardia calyculata* Linné. [Lmck., VI, 431; Encycl., pl. 233, fig. 6; Chenu, p. 135, fig. 650.] Alger (A. LETOURNEUX).

[Syn. *M. obsoleta* Linné; *M. sinuata* Lmck.]

(2) *Mytilicardia phrenitica* Lmck., VI, 430. [Encycl., pl. 233, fig. 4; Chenu, p. 135, fig. 649-651.] Océan Indien.

(3) *Mytilicardia trapezia* Linné. Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. *M. albida* Monters.; *M. rosea* Monters.]

Genre **Lazaria** Gray.

Lazaria pectunculus Brug. Océan Indien.

FAMILLE DES MYTILIDÆ

Subfamille des *Mytilinæ*

Genre **Mytilus** Linné

[Syn. *Mytulus* Rond.; *Musculus* Rond.; *Callitriche* Poli; *Callitrichoderma* Poli; *Perna* Schmeh.; *Chloromya* Mörch.]

SECTIONS

- | | |
|--|---------------------------|
| (1) <i>Mitylus</i> Linné. | (3) <i>Stavelia</i> Gray. |
| (2) <i>Aulacomya</i> Mörch.
[Syn. <i>Hormomya</i> Mörch.] | |

(1) *Mytilus elongatus* Chemnitz. [Lmck., VII, 40; Encycl., pl. 219, fig. 2.] Amérique.

(1) *Mytilus pictus* Born. [Lmck., VI, 44; Encycl., pl. 218, fig. 1; Chenu, p. 152, fig. 713.] Algérie (A. LETOURNEUX, POUELLIER).
[Syn. *M. afer* Gmelin; *M. africanus* Chemnitz.]

- (1) *Mytilus smaragdinus* Chemnitz. [Lmck., VI, 43.] Chine (VESCO).
[Syn. : *M. opalinus* Lmck.]
- (1) *Mytilus minimus* Poli. [Lmck., VII, 49.] Algérie (JOLY).
- (1) *Mytilus perna* Linné. Algoa-Bay (EUDEL).
- (1) *Mytilus edulis* Linné. [Lmck.; VII, 47 ; Encycl., pl. 218, fig. 2.] Côtes de France (T. LETOURNEUX), Mer du Nord (LE COMTE).
[Syn. *M. communis* Schmch. ; *M. retusus* Lmck. ; *M. subsaxatilis* Williams ; *M. vulgaris* Da Costa.]
- (1) *Mytilus edulis* Linné, var. *gallo-provincialis*. [Lmck., VII, 46. Ile de Wight, Algérie (A. LETOURNEUX), Loire-Inférieure (CAILLIAUD).
[Syn. *M. dilatatus* Gray.]
- (2) *Mytilus hirsutus* Lmck., VII, 38. Nouvelle-Hollande (LEPELTIER), Sydney (EUDEL).
- (2) *Mytilus hamatus* Say. Floride (PETIT DE LA SAUSSAYE).
[Syn. *M. striatus* Reim.]
- Mytilus opalus* Lmck., VII, 43. Océan Indien.
[Syn. *M. smaragdinus* Desh.]
- Mytilus pharaonis* Fischer. Suez (A. LETOURNEUX).
- Mytilus dactyloides* Hupé, Chili (LEPELTIER).
- Mytilus achatinus* Lmck., VII, 45. [Encycl., pl. 218, fig. 3.] Brésil (CAILLIAUD).
- Mytilus* sp. Ceylan (EUDEL).
- Mytilus* sp. Montevideo.

Subfamille des Crenellinæ

Genre **Crenella** Brown.

[Syn. *Myoparo* Lea ; *Stalagmium* Conr. ; *Nuculocardia* Orb.]

SECTIONS

- | | |
|---|---|
| (1) <i>Crenella</i> Brown. | (2) <i>Modiolaria</i> Bk.
[Syn. <i>Lanistes</i> Sow. ; <i>Lanistina</i> Gray.] |
| (1) <i>Crenella decussata</i> Mtg. Groënland (MÖRCH).
[Syn. <i>C. cicercula</i> Möll.] | |

- (1) *Crenella faba* O. Fabr. Groënland (MÖRCH).
[Syn. *C. arctica* Leach.]
- (2) *Crenella Petagnæ* Scacc. Algérie (JOLY).
[Syn. *Modiola barbatella* Cantr.]
- (2) *Crenella lævigata* Gray. Groënland (MÖRCH).
- (2) *Crenella marmorata* Forbes. Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *Modiolaria discrepans* Philippi.]
- Crenella Ehrenbergi* Issel. [J. Conchyl., 1871, p. 212.]
Suez

Genre **Modiola** Lmck.

[Syn. *Perna* Adans.; *Pholas* Klein; *Tamarindiiformis* Gevers;
Modiolus Riss.]

SECTIONS

- (1) *Modiola* Lmck. (3) *Adula* H. A. Ad.
- (2) *Brachidontes* Sow.
- (1) *Modiola albicosta* Lmck., VI, 19. [Chenu, p. 154, fig. 758.]
Océan Indien.
- (1) *Modiola auriculata* Krauss. La Réunion (EUDEL).
- (1) *Modiola barbata* Linné. [Lmck., VII, 22; Encycl.,
pl. 218, fig. 6; Chenu, p. 154, fig. 756.] Le Croisic
(T. LETOURNEUX), Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *M. ovalis* Sow.]
- (1) *Modiola cinnamomea* Lmck., VII, 25. [Encycl., pl. 224,
fig. 4.] La Guadeloupe.
- (1) *Modiola elegans* Gray, Chine (EUDEL).
- (1) *Modiola adriatica* Lmck., VII, 20. Le Croisic (BOUR-
GAULT-DUCOUDRAY).
[Syn. *M. Gibbsii* Leach.]
- (1) *Modiola agglutinans* Cantraine, Algérie (JOLY).
[Syn. *M. vestita* Phl.]
- (1) *Modiola arcuatula* Hanl. Singapour (EUDEL).
[Syn. *M. varicosa* Gld.]
- (2) *Modiola subsulcata* Dunker, Madras.

(2) *Modiola plicatula* Lmck., VII, 22. [Encycl., pl. 220, fig. 5; Chenu, p. 155, fig. 760.] Floride (PETIT DE LA SAUSSAYE).

Modiola purpurata Lmck., VII, 22. Chili (LEPELTIER).

Modiola sp. Suez (A. LETOURNEUX).

Modiola sp. Penang.

Subfamille des Lithophaginæ

Genre **Lithodomus**

[Syn. *Lithophaga* Bolt. ; *Tamarindiformis* Gevers ; *Perna* Oken ; *Lithophagus* Mhlfld.]

SECTIONS

(1) *Lithodomus* Cuvier.

(3) *Botula* Mörch.

(2) *Leiosolenus* Crptr.

(1) *Lithodomus lithophagus* Linné. Algérie.

[Syn. *Lit. dactylus* Cuvier ; *Lit. inflatus* Req.]

Lithodomus cristatus Dillw. Algérie.

[Syn. *Lit. Carpenteri* Mörch ; *Lit. caudigerus* Lmck. ; *Lit. ropan* Adans.]

Lithodomus lessepsianus Vaill. Suez.

FAMILLE DES MODIOLARCIDÆ

Genre **Modiolarca** Gray

[Syn. *Phaseolicama* Val. ; *Gaimardia* Gld.]

Modiolarca cænobita Cross. Suez (A. LETOURNEUX).

Modiolarca trapezina Gray. [Lmck, VII, 74 ; Chenu, fig. 777-779.] Magellan (LEPELTIER).

FAMILLE DES AVICULIDÆ

Genre **Avicula** Klein.

[Syn. *Pteria* Scop. ; *Anonica* Oken ; *Glaucus* Poli.]

Avicula radiata Pse. [Lmck. VII, 102.] Égypte, Suez (A. LETOURNEUX).

[Syn. *A. Peasei* Dkr.]

Avicula tarentina Lmck., VII, 99. [Encycl., pl. 177, fig. 8.] Algérie (A. LETOURNEUX).

A. aculeata Sow.; *A. anglica* Brown.; *A. falcata* Lmck.; *A. hirundo* Jeffr.]

Avicula atlantica Lmck., VII, 99. [Encycl., pl. 177, fig. 9.] Océan Atlantique.

Genre **Meleagrina** Lmck.

[Syn. *Margaritifera* Brown.; *Margaritophora* Mhlfd.; *Unio-nium* Link.; *Pinctada* Bolt.; *Perlamater* Schmeh.; *Margarita* Lea.]

Meleagrina crocata Sow. La Réunion (EUDEL).

Meleagrina margaritifera Linné. [Lmck., VII, 107; Encycl., pl. 177, fig. 1-4; Chenu, p. 160, fig. 794-797.] Océan Indien.

[Syn. *M. hystrix* Reeve; *M. radiata* Leach.]

Meleagrina sp. Suez (A. LETOURNEUX).

Genre **Perna** Brug.

[Syn. *Isognomon* Klein.; *Melina* Recluz; *Pedalion* Soland.; *Sutura* Mhlfd.; *Hippochaeta* Sangiov.; *Isogonum* Bolt.]

Perna isognomum Linné var. *femoralis* Blainv. [Lmck., VII, 76; Encycl., pl. 175, fig. 4-5; Chenu, p. 161, fig. 802.] Océan Indien (IOBA).

Perna marsupium Lmck., VII, 77. Océan Indien (LEPELTIER).

Perna Maillardi Desh., La Réunion.

Perna dentifera Krauss., La Réunion.

Perna ephippium Linné. [Lmck., VII, 74; Encycl., pl. 176, fig. 2; Chenu, p. 161, fig. 800.] Océan Indien.

Perna obliqua Lmck., VII, 75; La Réunion, Antilles (M^m HERMITE).

Perna sp. Penang (EUDEL).

Genre **Malleus** Lmck.

[Syn. *Himantopoda* Schmeh.; *Tudes* Oken]

Malleus normalis Lmck., VII, 92. Océan Indien.

Malleus vulgaris Lmck. VII, 91. [Chenu, p. 163, fig. 814.]
Océan Indien.

[Syn. *Ostrea malleus* Linné ; vulgairement *Le Marteau noir*.]

Malleus anatinus Lmck., Ile Nicobar.

Malleus albus Lmck., VII, 91. [Chenu, p. 163, fig. 815.]
Océan Indien.

[Syn. *Ostrea malleus-albus* Chemn.]

Genre **Crenatula** Lmck.

[Syn. *Dalacia* Gray.]

Crenatula phasianoptera Lmck., VII, 73. [Encycl., pl. 216,
fig. 2 ; Chenu, p. 164, fig. 817.] Suez (A. LETOURNEUX).

Crenatula sp. Suez.

Crenatula sp. Suez.

Genre **Pinna** Linné

[Syn. *Chimæra* Poli ; *Pinnaria* Brown. ; *Cyrtopinna* Mörch.]

SECTIONS

(1) *Pinna* Linné.

(2) *Atrina* Gray.

(1) *Pinna nobilis* Linné. Alger (A. LETOURNEUX).

[Syn. *P. bullata* Gmelin ; *P. lævis* DONOV. ; *P. marginata* Lmck. ; *P. muricata* Poli ; *P. rotundata* Reeve ; *P. squamosa* Gmelin ; *P. vitrea* Gmelin.]

Pinna Kraussii Hanley. La Réunion (EUDEL).

Pinna rudis Linné. [Lmck., VII 80 ; Encycl. pl. 199,
fig. 3 ; Chenu, p. 164, fig. 819.] Alger (A. LETOURNEUX).

Bissus de *Pinna rudis* Linné. Alger (A. LETOURNEUX).

Pinna ingens Pennant. [Lmck., VII, 66.] La Rochelle
(LEPELTIER).

FAMILLE DES TRIGONIDÆ

Genre **Trigonia** Brug.

Trigonia pectinata Lmck., VI, 514. [Chenu, p. 166, fig. 827-828.] Australie.

FAMILLE DES ARCIDÆ

Subfamille des Arcinæ

Genre **Arca** Linné

[Syn. *Daphne* Poli ; *Daphoderma* Poli ; *Navicula* Blvll. ; *Ciboia* Brown. ; *Byssarca* Sow.]

SECTIONS

- (1) *Arca* Linné. (2) *Litharca* Gray.

- (1) *Arca retusa* Issel, var. *a*, Suez.

- (1) *Arca tetragona* Poli. [Lmck., VI, 461 ; Encycl., pl. 308, fig. 3.] Ilot du Four (CAILLIAUD), Algérie (A. LETOURNEUX).

[Syn. *A. tortuosa* Pennant ; *A. papillosa* Brown ; *A. fusca* Donovan ; *A. britannica* Reeve.]

- (1) *Arca tortuosa* Linné. [Lmck., VI, 460 ; Encycl., pl. 305, fig. 1 ; Chenu, p. 174, fig. 871.] Océan Indien.

- (1) *Arca Noë* Linné. [Lmck., VI, 461 ; Encycl., pl. 303, fig. 1, pl. 305, fig. 2 ; Chenu, p. 172, fig. 154.] Algérie (A. LETOURNEUX).

- (1) *Arca Kraussi* Phil., La Réunion (EUDEL).

Arca sp. Penang.

Arca scapha Chemnitz, var. *b*, [Lmck., VI, 469 ; Encycl., pl. 306, fig. 1.] Océan Indien.

Arca sp. Penang.

Genre **Barbatia** Gray

SECTIONS

- (1) *Barbata* Gray. (2) *Calloarca* Gray.

- (2) *Acar* Gray. (4) *Venusta* Gray.

- (1) *Barbatia lacerata* Linné. Suez (A. LETOURNEUX).

- (1) *Barbatia tenella* Reeve. La Réunion (EUDEL).

- (1) *Barbatia barbata* Gray. [Lmck., VI, 465 ; Encycl., pl. 309, fig. 1.] Cette (M^{me} ROZET), Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. *B. reticulata* Turton.]

(1) *Barbatia fusca* Brug. [Lmck., VI, 466; Encycl., pl. 308, fig. 5.] Madagascar.

(4) *Brabatia lactea* Linné. Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. *B. modiola* Poli; *B. nucleus* Penn.; *B. perforans* Turt.; *B. Quoyi* Payr.; *B. crinita* Pult.]

(4) *Barbatia Gaimardi* Payr., pl. I, fig. 36-39. Alger (A. LETOURNEUX).

Barbatia dichotoma Desh., La Réunion (EUDEL).

Barbatia imbricata Poli., [Encycl., pl. 308.] Suez.

[Syn. *B. clathrata* Lmck.; *B. pulchella* Reeve; *B. ventricosa* Lmck., VI, 463; *B. umbonata* Lmck., VI, 462.]

Genre **Anomalocardia** Klein

[Syn. *Anadura* Gray.]

Anomalocardia diluvii Lmck., Algérie.

[Syn. *A. antiquata* Poli; *A. Weinkauffi* Crosse J. de Conchyl. 1862, p. 324.]

Anomalocardia cuneata Sowerby. La Réunion (EUDEL).

Anomalocardia antiquata Linné. [Lmck., VI, 470; Encycl., pl. 306, fig. 2.] Océan Indien.

Anomalocardia granosa Linné. [Lmck., VI, 471; Encycl., pl. 307, fig. 1.] Océan Indien.

Anomalocardia granulata Philippi. Chine (VESCO).

Genre **Senilia** Gray

Senilia senilis Linné. [Encycl., pl. 308, fig. 1; Chenu. p. 174, fig. 868.] Sénégal (ADANSON).

Genre **Scapharca** Gray.

Scapharca ovata Gmelin. [Lmck., VI, 465; Encycl., pl. 309, fig. 3.] Mer Rouge.

Genre **Cucullæa** Lmck.

Cucullæa concamerata Chemnitz. [Encycl., pl. 304, fig. 1; Chenu, p. 175, fig. 875.] Océan Indien.

[Syn. *Arca Martini* Recluz; *Cucullæa auriculifera* Lmck. VI, 454.]

Subfamille des *Axinæinæ*

Genre **Pectunculus** Lmck.

[Syn. *Axinæa* Poli; *Axinoderma* Poli; *Tuceta* Bolt.; *Glycimeris* Humph.]

SECTIONS

- (1) *Axinæa* Poli. (2) *Pectunculus* Lmck.
- (1) *Pectunculus bimaculatus* Poli, Alexandrie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *P. sculus* Reeve.]
- (1) *Pectunculus glycimeris* Linné. [Lmck., VI, 485; Encycl., pl. 310, fig. 3.] Méditerranée.
[Syn. *P. decussatus* Linné; *P. nummarius* Linné.]
- (1) *Pectunculus glycimeris* Linné, var. *pilosus*. Lmck., VI, 488 [Encycl., pl. 310, fig. 2.] La Rochelle (D'ORBIGNY père).
- (1) *Pectunculus marmoratus* Chemnitz. [Lmck., VI, 489.] Océan Atlantique.
- 1) *Pectunculus insubricus* Brocch. Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *P. lineatus* Phl.; *P. stellatus* Lmck.; *P. violascens* Lmck. VI, 492].
- (2) *Pectunculus pectiniformis* Lmck., Suez.
Pectunculus sp. Suez (A. LETOURNEUX).

Genre **Pectunculina** d'Orbigny

[Syn. *Limopsis* Sassi, *Trigonocælia* Nyst.]

Pectunculina multistriata Forsk. [Chenu, p. 177, fig. 881.] Suez (VESCO).

FAMILLE DES NUCULIDÆ

Genre **Nucula** Lmck.

[Syn. *Polyodonta* Mhlfld.; *Nuculana* Link.]

SECTIONS

- (1) *Nucula* Lmck. (2) *Acila* H. A. Ad.

- (1) *Nucula inflata* Hancock. Groënland (MÖRCH).
(1) *Nucula nitida* Sowerby. Alger (JOLY).
Nucula minuta Müller. Groënland (MÖRCH).
Nucula buccata Spglr. Groënland (MÖRCH).
Nucula nucleus Linné. [Encycl., pl. 311, fig. 3.] Le Croisic (T. LETOURNEUX), Alger (A. LETOURNEUX), Dalmatie (LE COMTE).
[Syn. *N. argentea* Cost. ; *N. margaritacea* Lmck. VI, 506 ; *N. similis* Sowerby.]

FAMILLE DES LEDIDÆ

Subfamille des *Ledinæ*

Genre **Leda** Schmch.
[Syn. *Lembulus* Riss.]

SECTIONS

- (1) *Leda* Schmch. (2) *Adrana* H. A. Ad.
(1) *Leda pernula* Müll. Kattégat (MÖRCH).
[Syn. *L. elongata* Daud. ; *L. fluviatilis* Schröt. ; *L. macilenta* Steenbuch. ; *L. Martini* Ch. ; *L. buccata* Möll. ; *L. costigera* Leach.]
(1) *Leda pella* Linné.. [Chenu, p. 178, fig. 893.] Marseille (COINDE), Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. *L. emarginata* Lmck. VI, 508 ; *L. fabula* Sowerby ; *L. rossiana* Risso.]

Genre **Yoldia** Möll.

SECTIONS

- (1) *Yoldia* Möll. (2) *Portlandia* Mörch.
(1) *Yoldia limatula* Say. [Chenu, p. 181, fig. 905.] Spitzberg (VOYAGE DE LA RECHERCHE).

FAMILLE DES PECTINIDÆ

Genre **Pecten** Müll
[Syn. *Argus* Poli.]

SECTIONS

- (1) *Pecten* Müll.
- (2) *Chlamys* Bolt.
- (3) *Pallium* Mart.
[Syn. *Dentipecten* Rüpp.;
Decadopecten Sow.]
- (4) *Pseudamussium* Klein.

- (1) *Pecten foliaceus* Quoy. [Chenu p. 183 fig. 923.] Chine
Boréale (VESCO).
- (1) *Pecten irradians* Lmck., VII, 143.; États-Unis (PETIT
DE LA SAUSSAYE).
[Syn. *P. concentricus* Say.]
- (1) *Pecten Kuhnholzii* Born. Nouvelle-Calédonie.
- (1) *Pecten senatorius* Gmelin. [Lmck., VII, 146 ; Encycl.,
pl. 211, fig. 5.] Suez (A. LETOURNEUX).
- (1) *Pecten pes-felis* Linné [Lmck., VII, 140; Encycl., pl. 211,
fig. 1 ; Chenu, p. 183, fig. 921.] Algérie (A. LETOUR-
NEUX).
[Syn. *P. elongatus* Born. ; *P. Borni* Payr.]
- (1) *Pecten imbricatus* Gmelin. [Lmck., VII, 141; Encycl.,
pl. 214, fig. 2.] Mer Rouge.
- (1) *Pecten inæquivalvis* Sowerby. Ile de la Réunion (EUEDEL).
- (1) *Pecten pallium* Linné. [Lmck., VII, 140; Encycl., pl. 210,
fig. 1 ; Chenu p. 183 fig. 919.] Suez (A. LETOUR-
NEUX).
- (1) *Pecten opercularis* Linné. [Lmck. VII, 142-143 ; Encycl.,
pl. 212, fig. 2-3.] La Rochelle (D'ORBIGNY), Loire-
Inférieure (CAILLIAUD), Alger (A. LETOURNEUX).
Méditerranée (LOBA).
[Syn. *P. Audouini* Payr. p. 77, pl. II, fig. 89 ; *P.*
daucus Reeve ; *P. dubius* Gmelin ; *P. elegans*
Lmck. ; *P. lineatus* Da Costa ; *P. pictus* Da Costa ;
P. radiatus Gmelin ; *P. sanguineus* Riss. ; *P. subru-*
fus Penn.]
- (1) *Pecten gloriosus* Reeve. Nouvelle-Calédonie (VESCO).
- (1) *Pecten tranquebaricus* Gmelin. Pondichéry.
[Syn. *P. nucleus* Dillw.]

- (1) *Pecten varius* Linné. [Lmck., VII, 147 ; Encycl., pl. 213, fig. 5]. Le Croisic, Nouvelle-Calédonie.
[Syn. *P. aculeatus* Gmelin ; *P. arzellus* Gregor. ; *P. citrinus* Linné ; *P. flammeus* Gmelin ; *P. gaperus* Gregor ; *P. incarnatus* Gmelin ; *P. muricatus* Gmelin ; *P. ochroleucus* Gmelin ; *P. punctatus* Gmelin ; *P. violaceus* Gmelin ; *P. versicolor* Gmelin.]
- (2) *Pecten Philippii* Recluz. Alger.
[Syn. *P. commutata* Monterosato ; *P. gibbus* Philippi.]
- (2) *Pecten islandicus* Müll. [Lmck., VII, 145 ; Encycl., pl. 212, fig. 1 ; Chenu, p. 184, fig. 928.] Mer du Nord.
[Syn. *P. cinnabarinus* Born. ; *P. Fabricii* Phl. ; *P. Peali* Conr.]
- (2) *Pecten pusio* Linné. Mer Méditerranée.
[Syn. *P. distortus* Da Costa ; *P. irregularis* Desh. ; *P. multistriatus* Poli ; *P. palliolum* Chemnitz ; *P. sinuosus* Lmck.]
- (2) *Pecten testæ* Bivona. Palerme (JOLY), Algérie (WEINKAUFF).
[Syn. *P. incomparabilis* Risso ; *P. vitreus* Risso.]
- (3) *Pecten plica* Linné. [Lmck., VII, 136 ; Encycl., pl. 212, fig. 5 ; Chenu, p. 184, fig. 927.] Mer Rouge (VESCO).
- (4) *Pecten flexuosus* Poli. [Lmck., VII, 144.] Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *P. flagellatus* Lamarek ; *P. polymorphus* Philippi ; *P. undulatus* Sowerby.]
- (4) *Pecten glaber* Linné. [Lmck., VII, 137 ; Encycl., pl. 213, fig. 1.] Algérie.
[Syn. *P. aurantius* Gmelin ; *P. citrinus* Riss. ; *P. depressus* Gmelin ; *P. discors* ; Chemnitz ; *P. distans* Lmck. ; *P. flavescens* Gmelin ; *P. flavidulus* Lmck. ; *P. flavus* Lmck. ; *P. griseus* Lmck. ; *P. nebulosus* Poli ; *P. rusticus* Poli ; *P. sulcatus* Born. ; *P. unicolor* Sow. ; *P. virgo* Lmck.]
- (4) *Pecten glaber* Linné, var. *proteus* Sol. Algérie.
- (4) *Pecten hyalinus* Poli. Méditerranée.
[Syn. *P. pellucidus* Lmck. ; *P. pulcherrimus* Riss. ; *P. succineus* Riss.]
- (4) *Pecten inflexus* Poli. Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *P. adpersus* Philippi ; *P. clavatus* Poli ; *P. Dumasi* Payr.]

Pecten turgidus Gmelin. [Lmck., VII, 135.] Côtes d'Amérique.

[Syn. *P. nucleus* Born.]

Pecten sp. Mer Vermeille.

Pecten sp. Suez.

Genre **Vola** Klein.

[Syn. *Pandora* Mhlfd. ; *Janira* Schmch.]

Vola maxima Linné. [Lmck., VII, 129 ; Encycl., pl. 209, fig. 1 ; Chenu, p. 185, fig. 934-35.] Loire-Inférieure (T. LETOURNEUX).

[Syn. *Vola lævis* Penn. ; *V. vulgaris* Costa]

Vola jacobæa Linné. [Lmck., VII, 130 ; Encycl., pl. 209, fig. 2.] Algérie (A. LETOURNEUX).

Vola media Lmck., Suez.

Genre **Amussium** Klein.

[Syn. *Pleuronectia* Sow.]

Amussium pleuronectes Linné. [Lmck., VII, 132 ; Encycl., pl. 208, fig. 3.] Océan Indien (LOBA).

Amussium Balloti Bernardi., [Journ. Conchyl., 1861, p. 46, pl. I, fig. 1.] Nouvelle-Calédonie (PETIT DE LA SAUSSAYE, VESCO).

Amussium japonicum Gmelin. [Lmck., VII, 133 ; Encycl., pl. 208, fig. 4 ; Chenu, p. 187, fig. 945.] Océan Indien.

FAMILLE DES RADULIDÆ

Genre **Lima** Brug.

[Syn. *Radula* Klein ; *Limaria* Link. ; *Glaucion* Oken.]

SECTIONS

(1) *Lima* Brug.

(4) *Acesta* H. A. Ad.

(2) *Ctenoides* Klein.

(5) *Limatula* Wood.

(3) *Mantellum* Bolt.

(1) *Lima paucicostata* Sow. [Journal. Conchyl., 1870, p. 169.] Suez (A. LETOURNEUX).

- (1) *Lima squamosa* Lmck., VII, 115. [Encycl., pl. 206, fig. 4 ; Chenu, p. 188, fig. 949.] Algérie (A. LETOURNEUX).
- (3) *Lima hians* Gmelin. Loire-Inférieure (BOURGAULT-DUCOUDRAY), Algérie (A. LETOURNEUX).
[Syn. *L. aperta* Sowerby ; *L. bullata* Payraudeau ; *L. fragilis* Flmmg. ; *L. lingulata* Lmck. ; *L. oblonga* Sowerby ; *L. tenera* Turt. ; *L. vitrina* Brown.]
- (3) *Lima inflata* Lmck., VII, 115. [Encycl., pl. 206, fig. 5 ; Chenu, p. 189, fig. 956.] Toulon (LOBA), Alger (A. LETOURNEUX).
[Syn. *L. fasciata* Linné ; *L. tuberculata* Oliv. ; *L. glacialis* Poli ; *L. ventricosa* Sow.]
- (5) *Lima sulcata* Leach. Groënland (MÖRCH).

FAMILLE DES SPONDYLIDÆ

Genre **Spondylus** Linné

[Syn. *Podopsis* Lmck. ; *Dianchora* Sow. ; *Pachytes* DeFr.]

Spondylus imperialis Chenu. Océan Indien.

Spondylus aculeatus Chemnitz, Alger.

Spondylus croceus Chemnitz. Océan Indien.

Spondylus sp. Suez.

Spondylus nicobaricus Chemnitz. La Réunion.

[Syn. *Sp. radians* Lmck. ; *Sp. coccineus* Reeve ?]

Genre **Plicatula** Lmck.

Plicatula complanata Desh. La Réunion.

Plicatula ramosa Lmck. Suez.

Plicatula cornucopiæ Lmck.

Genre **Pedum** Brug.

Pedum spondyloideum Gmelin. Vanikoro.

FAMILLE DES ANOMIIDÆ

Genre **Anomia** Linné

[Syn. *Echion* Poli ; *Echinoderma* Poli ; *Fenestella* Bolt. ; *Lampades* Gevers ; *Cepa* Humph.]

SECTIONS

- (1) *Anomia* Linné. (3) *Patro* Gray.
(2) *Ænigma* Koch.
(1) *Anomia ephippium* Linné. Ile de Ré.
[Syn. *An. electrica* Linné ; *An. squamula* Linné.]
(1) *Anomia ephippium* Linné, var. *cepa* Linné. Ile de Ré.
Anomia sp. Ile de Ré.

Genre **Placuna** Solander

Placuna papyracea Lmck. Océan Indien.

[Syn. *Pl. parva* Chemnitz.]

Placuna placenta Lmck. Océan Indien.

FAMILLE DES VULSELLIDÆ

Genre **Vulsella** Lmck.

[Syn. *Reniella* Sowerby.]

Vulsella lingulata Lmck. Suez.

Vulsella spongiarum Lmck. Suez.

FAMILLE DES OSTREIDÆ

Genre **Ostrea** Linné

[Syn. : *Ostreum* Adans. ; *Amphidonta* Fschr. ; *Peloris* Poli ;
Plagiostoma Sow.]

SECTIONS

- (1) *Ostrea* Linné. (2) *Lopha* Bolt.
[Syn. *Alectryonia* Fschr. ;
Dendostræa Sow.]
(1) *Ostrea cochlear* Poli. Algérie.
(2) *Ostrea cucullata* Born. Océan Indien.
[Syn. *O. cornucopiæ* Linné ; *O. Forskali* Gmelin.]
Ostrea parasitica Gmelin. Océan Indien.
[Syn. *Ostrea arborea* Chemn.]

Ostrea talienwanensis Crosse. Tchefou (Chine).

Ostrea edulis Linné. Manche, île Maurice (EUDEL).

[Syn. : *O. deformis* Lmck. ; *O. denticulata* Brocc ;
O. exalbida Gmelin ; *O. fucorum* Lmck. ; *O. hippopus* Lmck. ; *O. parasitica* Turt. ; *O. rutupina*
Jeffr. ; *O. tinctoria* Jeffr.]

Ostrea crista-galli Linné. Océan Indien.

Ostrea cucullina Desh. La Réunion (EUDEL).

CLASSE DES BRACHIOPODES

FAMILLE DES TEREBRATULIDÆ

Subfamille des *Terebratulina*

Genre **Terebratula** Lwd.

[Syn. *Epithyris* King. ; *Gryphus* Mhlfd. ; *Lampas* Humph.]

Terebratula vitrea Born. Méditerranée.

[Syn. *Terebratula minor* Philippi.]

Terebratula sp.

Genre **Terebratulina** Orb.

Terebratulina caput-serpentis Linné. Marseille.

Genre **Waldheimia** King

SECTIONS

(1) *Waldheimia* King. (2) *Eudesia* King.

(1) *Waldheimia flavescens* Lmck., Java.

[Syn. *Waldheimia australis* Quoy.]

(1) *Waldheimia dilatata* Lmck., Magellan.

[Syn. *W. Gaudichaudi* Blainv.]

FAMILLE DES TEREBRATULIDÆ

Subfamille des Magasinæ

Genre **Mergelia** King.

[Syn. *Kingena* Davids. ; *Ismenia* King.]

Megerlia truncata Linné., Algérie.

FAMILLE DES THECIDIIDÆ

Genre **Thecidea** Deifr.

Thecidea mediterranea Riss., Algérie.

FAMILLE DES RHYNCHONELLIDÆ

Genre **Rhynchonella** Fschr.

[Syn. *Hypothyris* Phl. ; *Hemithyris* Orb

Rhynchonella psittacea Fischer., Groënland.

FAMILLE DES DISCINÆ

[Syn. *Orbiculidæ*]

Genre **Discina** Lmck.

[Syn. *Orbicula* Sow. ; *Orbiculoidea* Orb. ; *Schizotreta* Kutorga.

Discina lamellosa Brod., Pérou.

FAMILLE DES LINGULIDÆ

Genre **Lingula** Brug.

[Syn. *Pharetra* Bolt. ; *Aulonotreta* Kutorga.

SECTIONS

(1) *Lingula* Brug.

(2) *Glottidia* Dall.

Lingula anatina Lmck., Iles Moluques.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

NOMS DE FAMILLES, SUBFAMILLES ET GENRES

	Pages		Pages
Achatina Lmck.....	27	Antalis Aldrov.....	137
<i>Achatinæ</i>	26	<i>Aplustridæ</i>	141
<i>Achatinidæ</i>	26	Aplysia Gmel.....	145
Aclis Loven.....	95	<i>Aplysiidæ</i>	144
Adeorbis S. Wood.....	129	Aporrhais Da Costa.....	103
Ætheria Lmck.....	51	Arca Lin.....	184
<i>Ætheridæ</i>	51	<i>Arcidæ</i>	184
Agaronia Gray.....	75	Argonauta Lin.....	55
Akera O. Müll.....	143	<i>Argonautidæ</i>	55
Alaba H. A. Ad.....	97	Asaphis Modeer.....	155
Alvania Riss.....	121	Aspergillum Lmck.....	148
<i>Amphiperasidæ</i>	109	Astarte Sow.....	176
Ampullaria Lmck.....	36	<i>Astartidæ</i>	176
<i>Ampullariidæ</i>	36	<i>Astralinæ</i>	128
Amussium Klein.....	190	Astridium Link.....	128
Anaitis Röm.....	166	Atlanta Less.....	58
Anatina Lmck.....	151	<i>Atlantidæ</i>	57
<i>Anatinidæ</i>	151	Atys Mft.....	143
Ancilla Lmck.....	77	<i>Auriculidæ</i>	28
Anodonta Cuv.....	50	<i>Auriculinæ</i>	28
Anomalocardia Klein.....	185	Auriculus Mft.....	28
Anomia Lin.....	191	Avicula Klein.....	181
<i>Anomiidæ</i>	191	<i>Aviculidæ</i>	181
Anostoma Fschr.....	5	<i>Axinæinæ</i>	186

Azara Orb.....	151	<i>Cerithiidæ</i>	111
Bankivia Bk.....	132	<i>Cerithiinae</i>	111
Barbatia Gray.....	184	<i>Cerithiopsidæ</i>	96
Barleia Clark.....	119	<i>Cerithiopsis</i> Forb.....	96
Barnea Riss.....	146	<i>Cerithium</i> Brug.....	111
Bela Gray.....	64	<i>Ceronia</i> Gray.....	162
Birostra Sow.....	110	<i>Chama</i> Lin.....	172
Bittium Leach.....	113	<i>Chamidæ</i>	172
BRACHIOPODES.....	193	<i>Chelinodura</i> A. Ad.....	144
Broderipia Gray.....	134	<i>Chemnitzia</i> Orb.....	94
<i>Buccinidæ</i>	68	<i>Chione</i> Mhlfld.....	166
<i>Buccinulus</i> Plan.....	141	<i>Chiton</i> Lin.....	140
<i>Buccinum</i> Lin.....	68	<i>Chitonidæ</i>	140
<i>Bulimidæ</i>	24	<i>Chlorostoma</i> Sow.....	132
<i>Buliminidæ</i>	28	<i>Cingula</i> Flmg.....	121
<i>Buliminus</i> Bk.....	28	<i>Circe</i> Schmch.....	164
<i>Bulimulidæ</i>	25	<i>Circulus</i> Jeffr.....	128
<i>Bulimulus</i> Leach.....	25	<i>Clanculus</i> Mft.....	130
<i>Bulimus</i> Scop.....	24	<i>Clathurella</i> Crptr.....	64
<i>Bulla</i> Klein.....	142	<i>Clathurellidæ</i>	64
<i>Bullia</i> Gray.....	68	<i>Clavella</i> Sow.....	61
<i>Bullidæ</i>	142	<i>Clementia</i> Gray.....	168
<i>Cæcella</i> Gray.....	151	<i>Cledora</i> Pér.....	56
<i>Cæcidæ</i>	123	<i>Cochlostyla</i> Fér.....	22
<i>Cæcum</i> Flmg.....	123	<i>Columbella</i> Lmck.....	84
<i>Callista</i> Poli.....	163	<i>Columbellidæ</i>	84
<i>Calpurnus</i> Mft.....	110	<i>Concholepas</i> Lmck.....	74
<i>Calyculina</i> Cless.....	42	<i>Conidæ</i>	97
<i>Calyptræa</i> Lmck.....	124	<i>Conohelix</i> Sw.....	81
<i>Calyptræidæ</i>	124	<i>Conus</i> Lin.....	97
<i>Cancellaria</i> Lmck.....	110	<i>Coralliophila</i> A. Ad.....	74
<i>Cancellariidæ</i>	110	<i>Coralliophilidæ</i>	74
<i>Cardiidæ</i>	169	<i>Corbicula</i> Meg.....	42
<i>Cardita</i> Lmck.....	177	<i>Corbis</i> Cuv.....	174
<i>Cardium</i> Lin.....	169	<i>Corbula</i> Brug.....	151
<i>Carinaria</i> Lmck.....	58	<i>Corbulidæ</i>	151
<i>Caryatis</i> Röm.....	163	<i>Corbulomya</i> Nyst.....	151
<i>Cassis</i> Lmck.....	86	<i>Crassatella</i> Lmck.....	177
<i>Cassidaria</i> Lmck.....	87	<i>Crenatula</i> Lmck.....	183
<i>Cassididæ</i>	86	<i>Crenella</i> Brown.....	179
<i>Castalia</i> Lmck.....	52	<i>Crenellinæ</i>	179
CÉPHALOPODES	55	<i>Crepidula</i> Lmck.....	124
<i>Ceratisolen</i> Forb.....	149	<i>Creseis</i> Rang.....	56
<i>Cerithidæ</i> Sow.....	115	<i>Crista</i> Röm.....	163

Crucibulum Schmch.....	124	Eburna Lmck.....	71
Cryptodon Turt.....	174	Emarginula Lmck.....	136
Cryptogramma Mörch....	166	Emmericia Brus.....	35
Cucullæa Lmck.....	185	<i>Emmericiinae</i>	35
Cultellus Schmch.....	149	Ennea H. et A. Ad.....	2
Cuvieria Rang.....	57	<i>Enneidae</i>	2
Cyclina Dsh.....	168	Ensis Schmch.....	148
<i>Cyclophorinae</i>	29	Ervilia Turt.....	162
Cyclophorus Mft.....	29	Euchelus Philippi.....	131
Cyclostoma Mft.....	29	Eulima Riss.....	95
<i>Cyclostomidae</i>	29	Eulimella Forb.....	94 95
<i>Cyclostominae</i>	29	<i>Eulimidae</i>	95
Cylichna Loven.....	142	Euthria Gray.....	62
<i>Cylichnidae</i>	142	Fasciolaria Lmck.....	78
Cyphoma Bolt.....	110	<i>Fasciolariidae</i>	78
Cypræa Lin.....	104	<i>Firolidae</i>	58
<i>Cypræidae</i>	104	Fissurella Brug.....	135
Cypricardia Lmck.....	168	<i>Fissurellidae</i>	135
Cyprina Lmck.....	169	Fissurellidæa Orb.....	136
<i>Cyprinidae</i>	169	Fistulana Brug.....	147
Cyrena Lmck.....	169	<i>Fluminicolinae</i>	36
<i>Cyrenidae</i>	42 169	Fossar Adans.....	18
Dactylina Gray.....	146	<i>Fusinae</i>	60
Daphnella Hinds.....	65	Fusus Lmck.....	62
Delphinula Lmck.....	129	Gadinia Gray.....	138
<i>Dentaliidae</i>	137	<i>Gadiniadæ</i>	138
Dentalium Lin.....	137	Galatea Brug.....	44
Diacria Gray.....	56	Galeomna Turt.....	176
Dione Gray.....	163	<i>Galeomnidae</i>	176
Diplodonta Bronn.....	175	Gastrana Schmch.....	159
Dipsaccus Klein.....	77	Gastrochæna Lmck.....	147
Discina Lmck.....	194	<i>Gastrochænidae</i>	147
<i>Discinae</i>	194	GASTROPODES.....	1, 31 57
Dolabella Lmck.....	144	Gibbula Riss.....	133
Dolabrifera Gray.....	145	Glycimeris Lmck.....	150
<i>Doliidae</i>	87	Goniobasis Leach.....	35
Dolium Lmck.....	87	Gouldia C. B. Ad.....	177
<i>Donacinae</i>	159	<i>Haliotidae</i>	134
Donax Lin.....	159	Haliotis Lin.....	134
Dosinia Scop.....	167	Haminea Leach.....	143
<i>Dosiniinae</i>	167	Harpa Lmck.....	85
Dreissensia Van Ben.....	53	<i>Harpidae</i>	85
<i>Dreissensiidae</i>	53	<i>Helicidae</i>	6
Eastonia Gray.....	155	Helix Lin.....	6

Hemicardium Cuv.....	171	<i>Limnæidæ</i>	41
Hemimactra Sow.....	154	<i>Limnæinæ</i>	41
Hemisinus Sw.....	33	Lingula Brug.....	194
Heterofusus Flmg.....	57	<i>Lingulidæ</i>	194
Hipponyx Defr.....	125	Lioconcha Mörch.....	163
Hippopus Lmck.....	173	<i>Liotinæ</i>	128
Holcostoma H. A. Ad.....	118	Lithasia Hldm.....	34
Hyalæa Lmck.....	55	Lithodomus Cuv.....	181
<i>Hyalidæ</i>	55	Lithoglyphus Mhlfd.....	36
Hyalinia Agas.....	4	<i>Lithophaginæ</i>	181
Hydatina Schmch.....	141	Litiopa Rang.....	118
Hydrobia Hrtm.....	36	Littorina Fér.....	115
<i>Hydrobiinæ</i>	36	<i>Littorinidæ</i>	115
Hyria Lmck.....	52	Livona Gray.....	129
Iphigenia Schmch.....	160	<i>Lophocercidæ</i>	144
Isocardia Lmck.....	172	Lophocercus Krohn.....	144
<i>Isocardiidæ</i>	172	Loripes Poli.....	174
Janthina Bolt.....	57	Lucina Brug.....	173
<i>Janthinæ</i>	57	<i>Lucinidæ</i>	173
Jouannetia Desml.....	146	Lucinopsis Forb.....	159
Kellia Turt.....	175	Lutraria Lmck.....	154
Lacuna Turt.....	117	<i>Lutrariinæ</i>	154
Ladas Cantr.....	57	Lyonsia Turt.....	152
Lævicardium Sow.....	171	Machæra Gld.....	149
Lamellaria Mtg.....	89	Macoma Leach.....	158
<i>Lamellariidæ</i>	89	Mactra Lin.....	153
Lampania Gray.....	114	Mactrella Gray.....	154
Lasea Leach.....	175	<i>Mactridæ</i>	153
<i>Laseidæ</i>	175	<i>Mactrinæ</i>	153
Latirus Mft.....	78	<i>Magasinæ</i>	194
Lazaria Gray.....	178	Magilus Mft.....	74
Leda Schmch.....	187	Malea Val.....	88
<i>Ledidæ</i>	187	Malleus Lmck.....	182
<i>Ledinæ</i>	187	Margarita Leach.....	133
Leiostraca H. A. Ad.....	96	Margaritana Schmch.....	49
Lepeta Gray.....	138	Marginella Lmck.....	82
Leptoconchus Rüpp.....	74	<i>Marginellidæ</i>	82
Leptoxis Rfq.....	31	Martesia Leach.....	146
Leucochroa Bk.....	5	Megerlia King.....	194
Liguus Mft.....	26	Melania Lmck.....	31
Lima Brug.....	190	<i>Melaniidæ</i>	31
<i>Limaciniidæ</i>	57	Melanopsis Fér.....	33
Limicolaria Schmch.....	26	Meleagrina Lmck.....	182
Limnæa Lmck.....	41	Menestho Möller.....	94

Mercenaria Schmch.....	166	Nucula Lmck.....	186
Meretrix Lmck.....	162	Nuculidæ.....	186
Mesodesma Desh.....	162	Obeliscus Humph.....	93
Microcondylæa West.....	49	Odostomia Flmg.....	95
Mitra Lmck.....	80	Oleacina Bolt.....	1
Mitrolumna Bucq. et Dautz	81	Oliva Brug.....	75
Modiola Lmck.....	180	Olivancillaria Orb.....	75
Modiolarca Gray.....	181	Olividæ.....	75
Modiolarcidæ.....	181	Omphalius Philippi.....	132
Moitessieria Brgt.....	34	Oniscia Sow.....	87
MOLLUSQUES FLUVIATILES.	31	Onustidæ.....	123
MOLLUSQUES MARINS.....	55	Orthalicidæ.....	26
MOLLUSQUES TERRESTRES..	55	Orthalicus Bk.....	26
Monoceros Lmck.....	73	Ostrea Lin.....	192
Monodonta Gmel.....	130	Ostreidæ.....	192
Montacuta Turt.....	176	Otopoma Gray.....	29
Murex Lin.....	58	Ovula Brug.....	109
Muricidæ.....	58	Oxystele Philippi.....	132
Muricinæ.....	58	Pachypoma Gray.....	128
Mutela Scop.....	51	Padollus Mft.....	135
Mutelidæ.....	51	Paladilhia Brgt.....	34
Mya Lin.....	150	Paludomus Sw.....	31
Myidæ.....	150	Pandora Brug.....	153
Mytilicardia Blvll.....	177	Paphia Bolt.....	161
Mytilidæ.....	178	Paphiinæ.....	161
Mytilinæ.....	179	Papyridea Sow.....	171
Mytilus Lin.....	178	Parmophorus Blvll.....	136
Nacella Schmch.....	139	Patella Lin.....	138
Nanina Gray.....	3	Patellidæ.....	138
Nassa Lmck.....	69	Patelloidea Quoy.....	137
Natica Adans.....	89	Pecten Müll.....	187
Naticidæ.....	89	PECTINIBRANCHES.....	31
Naticina Gray.....	91	Pectinidæ.....	187
Nautilidæ.....	55	Pectunculina Orb.....	186
Nautilus Lin.....	55	Pectunculus Lmck.....	186
Navicella Lmck.....	126	Pedum Brug.....	191
Næra Gray.....	153	PÉLÉCYPODES.....	42 146
Neothauma Smth.....	35	Periploma Schmch.....	152
Neptunea Bolt.....	61	Perna Brug.....	182
Nerita Lin.....	126	Persona Mft.....	67
Neritidæ.....	37 126	Petricola Lmck.....	169
Neritina Lmck.....	37	Petricolinæ.....	168
Neritopsidæ.....	125	Pharella Gray.....	149
Neritopsis Grtlp.....	125	Pharinæ.....	149

Phasianella Lmck.....	127	Pyrgula Crist. et J.....	34
<i>Phasianellinæ</i>	127	Pyrula Lmck.....	60
Philine Ascan.....	144	<i>Radulidæ</i>	190
<i>Philinidæ</i>	144	Ranella Lmck.....	67
<i>Pholadidæ</i>	146	Rangia Desml.....	154
<i>Pholadinæ</i>	146	Rapana Schmch.....	74
Pholas Lin.....	149	Rhynchonella Fschr.....	194
Phos Mft.....	69	<i>Rhynchonellidæ</i>	194
<i>Pileopsidæ</i>	125	Ricinula Lmck.....	73
Pileopsis Lmck.....	125	Ringicula Desh.....	94
Pinna Lin.....	183	Risella Gray.....	117
Pirena Lmck.....	33	Rissoa Fremvill.....	119
Pisania Biv.....	61	<i>Rissoidæ</i>	35 119
Pisidium Pfr.....	43	Rissoina Orb.....	119
Placuna Sol.....	192	<i>Rissoinæ</i>	119
<i>Planaxidæ</i>	118	<i>Rissoininæ</i>	119
Planaxis Lmck.....	118	Rostellaria Lmck.....	103
<i>Planorbiinæ</i>	41	Rotella Lmck.....	129
Planorbis Guett.....	41	<i>Rotellinæ</i>	129
<i>Pleurobranchidæ</i>	145	Sanguinolaria Lmck.....	156
<i>Pleurobranchinæ</i>	145	Saxicava Fl. de B.....	150
Pleurobranchus Cuv.....	145	<i>Saxicavidæ</i>	150
Pleurocera Rfq.....	34	Scalaria Lmck.....	92
<i>Pleuroceridæ</i>	34	<i>Scalariidæ</i>	92
Pleurotoma Lmck.....	63	Scaliola A. Ad.....	92
<i>Pleurotomidæ</i>	63	Scaphander Mft.....	143
<i>Pleurotominæ</i>	63	Scapharca Gray.....	185
Plicatula Lmck.....	191	Scrobicularia Schmch.....	160
Pliodon Conr.....	52	<i>Scrobicularinæ</i>	160
Polia Gray.....	61	<i>Scutellidæ</i>	137
Polydonta Schmch.....	130	Scutellina Gray.....	137
<i>Pomatiopsinæ</i>	122	SCUTIBRANCHES.....	37
Pomatiopsis Tryon.....	122	Senilia Gray.....	185
Potamides Brug.....	114	Septifer Rclz.....	53
<i>Potamidinæ</i>	113	Sigaretus Lmck.....	91
Prasina Desh.....	53	Simnia Riss.....	110
Psammobia Lmck.....	155	Siphonaria Sow.....	40
Pterocera Lmck.....	102	<i>Siphonariidæ</i>	40
PTÉROPODES	55	Skenea Flmg.....	122
PULMONÉS	1 40	<i>Skeneinæ</i>	122
Purpura Brug.....	71	Smaragdinella H. A. Ad...	40
Pyramidea Sow.....	130	<i>Solariidæ</i>	97
<i>Pyramidellidæ</i>	93	Solarium Lmck.....	97
Pyrazus Mft.....	114	Solecortus Blvll.....	149

Solemya Lmck.....	176	Teredo Lin.....	147
<i>Solemyadæ</i>	176	<i>Testacellidæ</i>	1
Solen Lin.....	148	Thalotia Gray.....	131
<i>Solenidæ</i>	148	Thracia Leach.....	152
<i>Soleninæ</i>	148	Thecidæa Defr.....	194
Soletellina Blvl.....	156	<i>Thecidiidæ</i>	194
Spatha Lea.....	52	Tivela Lmck.....	162
Sphærium Scop.....	42	Tornatella Lmck.....	141
Spirialis Eyd. et Soul	57	<i>Tornatellidæ</i>	141
Spirula Lmck.....	55	Tornatina A. Ad.....	142
<i>Spirulidæ</i>	55	Tridacna Costa.....	173
<i>Spondylidæ</i>	191	<i>Tridacnidæ</i>	173
Spondylus Lin.....	191	Triforis Desh.....	113
Stenogyra Shttlw.....	27	Trigonia Brug.....	183
Stomatella Lmck.....	134	<i>Trigonidæ</i>	183
<i>Stomatellinæ</i>	134	<i>Tripteridæ</i>	57
Stomatia Hilbng.....	134	Triton Mft.....	65
<i>Streptaxidæ</i>	2	<i>Tritonidæ</i>	65
Streptaxis Gray.....	2	Trivia Gray.....	108
Strigilla Turt.....	158	<i>Trochidæ</i>	127
<i>Strombidæ</i>	101	<i>Trochinæ</i>	129
Strombus Lin.....	101	Trochita Schmch.....	124
Struthiolaria Lmck.....	103	Trochocochlea Klein.....	132
Stylifer Brod.....	96	Trochomorpha Alb.....	6
<i>Styliferidæ</i>	96	Trochus Lin.....	129
<i>Sycotypidæ</i>	88	Trophon Mft.....	60
Sycotypus Brown.....	88	Turbinella Lmck.....	79
Syndosmia Rclz.....	161	<i>Turbinellidæ</i>	79
Tagelus Gray.....	150	<i>Turbininæ</i>	127
Tapes Mhlfd.....	164	Turbo Lin.....	127
Teinotis H. A. Ad.....	135	Turritella Lmck.....	122
Tectarius Valenc.....	117	<i>Turritellidæ</i>	122
Telescopium Chemn.....	144	Tympanotomus Klein....	114
Tellina Lin.....	156	Typhis Lin.....	60
<i>Tellinidæ</i>	155	Umbrella Lmck.....	145
<i>Tellininæ</i>	155	<i>Umbrellinæ</i>	145
Terebellum Lmck.....	104	Ungulina Daud.....	175
Terebra Brug.....	93	<i>Ungulinidæ</i>	175
Terebratula Lwd	193	Unio Retz	44
Terebratulina Orb.....	193	<i>Unionidæ</i>	44
<i>Terebratulidæ</i>	193	<i>Unioninæ</i>	44
<i>Terebratulina</i>	193	Utriculus Brown.....	142
<i>Terebridæ</i>	93	Vasum Bolt.....	79
<i>Teredinæ</i>	147	<i>Vitrinæ</i>	3

Vivipara Lmck.....	35	Voluta Lmck.....	79
Viviparidæ	35	Volutidæ	79
Velutina Flmg.....	88	Volvaria Lmck.....	83
Velutinidæ	88	Vulsella Lmck.....	192
Venerulæ	162	Vulsellidæ	192
Venerinæ	162	Waldheimia King.....	193
Venerupis Lmck.....	168	Woodia Desh.....	177
Vermetidæ	123	Xenophora Fschr.....	123
Vermetus Adans.....	123	Yoldia Möll.....	187
Vermiculus Lmck.....	123	Zizyphinus Leach.....	131
Vertagus Klein.....	112	Zonites Mft.....	4
Vola Klein.....	190		

Le siège de la *Société d'Études Scientifiques* est situé à Angers, ancienne Cour d'Appel, place des Halles.

Les Membres qui changent de résidence sont priés d'en prévenir le Président ou le Secrétaire.

La correspondance, *lorsqu'elle présente un caractère urgent*, devra être adressée au Président ou au Secrétaire, à leur adresse personnelle consignée dans la liste des membres de la Société, et, *dans tout autre cas*, au siège de la Société ci-dessus indiqué.

On peut se procurer la collection des Bulletins au prix de 135 francs (sauf le volume de 1873, épuisé). Ce prix est abaissé à 100 francs pour les nouveaux Sociétaires qui désireraient acquérir la collection.

Le prix du présent Bulletin est de 5 francs. Il sera fait une diminution de 1 fr. 50 à toute personne qui demandera à faire partie de la Société, soit comme membre titulaire, soit comme membre correspondant.

La Société échange son Bulletin contre celui de toute Société qui en fait la demande et contre toute publication scientifique, après approbation de l'assemblée.

La Société, désireuse d'accroître les collections publiques de la ville d'Angers, fait appel à tous ses membres et les prie de vouloir bien lui réserver les objets intéressant l'histoire naturelle locale ou régionale dont ils pourraient disposer. D'accord avec les Directeurs et les Commissions spéciales, elle se charge de déterminer ces objets et de les répartir ensuite, sous le nom de leur donateur, dans les différents Musées.

INSERTION DES TRAVAUX DANS LE BULLETIN

Les travaux proposés à l'insertion sont soumis à la Commission de publication.

Les clichés, pierres lithographiques, dessins sur papier autographique, etc., nécessaires au tirage des planches, sont à la charge des auteurs.

TIRAGES A PART

Les membres dont les communications ont une certaine étendue recevront, à titre gracieux, 15 exemplaires de leur travail, sans pagination spéciale, ni couverture imprimée.

Ils pourront faire exécuter, à leurs frais, un tirage à part, aux conditions suivantes :

Nombre d'exemplaires, papier du Bulletin (couverture non imprimée) sans ou avec pagination spéciale.

	25		50		75		100		200		500		1000	
	sans	avec	sans	avec	sans	avec	sans	avec	sans	avec	sans	avec	sans	avec
Pour 1/4 feuille, 4 pages	2 60	3 »	2 85	3 25	3 10	3 50	3 35	3 75	4 35	4 75	7 35	7 75	12 35	12 75
— 1/2 — 8 —	3 25	4 »	3 75	4 50	4 25	5 »	4 75	5 50	6 75	7 50	12 75	13 50	22 75	23 50
— 1 — 16 —	4 50	6 »	5 50	7 »	7 50	8 »	7 50	9 »	12 50	15 »	23 50	25 »	43 50	45 »

Trois quarts de feuille sont comptés comme feuille.

Couverture imprimée jusqu'à 100 exemplaires 3 francs, chaque cent en plus 0 fr 75

